

LEXICON
MEDICUM

GRÆCOLATINUM
COMPENDIOSISS.

à

BARTHOLOMÆO CASTRO

MESSANENSE
INCHOATUM:

Nunc verò

MYSTARUM APOLLINEORUM
in COMMODUM PUBLICUM,

Operâ & studio

EMMANUELIS STUPANI, Philof. &
Medic. Basileenf. ac Collegii Medicor.
p.r. Decurionis;

EX

HIPPOCR. GALEN. AVICENN.

& complurium aliorum

summè celebrium MEDICORUM

MONUMENTIS

AUCTUM, ILLUSTRATUM,

& PERFECTUM.



F.K.

BASILEÆ,
Impensis JOH. JACOBI GENATHI,
Anno MDCXXIIX,

VIRTUTI & HONORI
VIRORUM CLARISSIMORUM,
EXPERIENTISS.
IOHANNIS KÜEFFERI,
&

GEORGII BINERI,
DOCTORUM, & MEDICOR.
apud Argentoratens. celeberr.
summis quin & PRINCIPIBUS
desideratis.

FAVITOR. & AMICOR. COLENDOR.
QUALES-QUALES

HOS
LABORES SUOS, & MEDITATIONES,
AFFECTUS SUI, IN ILLOS
ILLIBATI,

&
perennaturæ amicitiae, firmissimos
ceu obsides,

INSCRIBIT, OFFERT &
COMMENDAT
EMMANUEL STUPANUS, PHILOS. &
MEDICUS BASILEENS. THEOR.
PROFESS. ORDINAR. &
MED. COLLEG. P.T.
DECURIO.

*Non sunt contemnenda tanquam parva, sine quibus
magna constare non possunt.*



EPISTOLA DE
DICATORIA.



IN æ alarum remigio volatum me-
ditatur, Viri Clarissimi. Consummatiss.
Icariū mox facturus casum, qui mor-
borum, horumq; effectum causerū,
absque cognitione corporis, quod cir-
cumferimus nobiscum, status naturalis pariter &
p.n. curam methodicam, adgredi non veretur. Is
liquidem duntaxat Medicus, ait Hippocr. in l. de arte,
qui potest dignoscere, sanare potest. Incogniti au-
tem nulla est curatio morbi. Enimvero, Iarices
genuinorum nominum & terminorū, citra expla-
nationem, materias Medicas velle cognoscere, est
tempus perdere. l. i. de m. m. c. s. Nimirum primum, &
necessariū maximè, benè definiendi, feliciter dispu-
tandi, & accuratè res quaslibet cognoscēdi, princi-
pium, ipsissima est vocum explicatio, quā neglectā,
differtationes nostræ nec de re ipsā, nec ad rem, sed
ad nomina inania, nuda, turpiter instituuntur. Arist.
l. 8. topic. c. 2. Undè (ab initio, qui parvus apparet er-
ror, in fine, ne fiat maximus. Arist. l. i. de Cal.) ἀπὸ τοῦ
ἐπιτομῆς διδασκῶν τε καὶ τὸ ἐπιτομῆς, ἀπὸ τοῦ ἐπιτομῆς
ἐπιτομῆς, ne in Disciplinarū campis, ἀπὸ τοῦ ἐπιτομῆς
ἐπιτομῆς, versari, & finè aliis, aquilæ volatum conari,
imitariq; velle dicamur. Quem in sensum Gal. l. i. de
temper. c. 3. scitè admodum dicit, Verba, rebus, quia
arctissimè nexa sunt, ideo illorum significationem

EPISTOLA

qui ante omnia nō rimantur, eos in miros labyrinthos devenire, cunctis ludibrio fieri, quin & pulcherrimas rerum scientias, tetrīs errorum tenebris hoc pacto involvi necessum est; vocabula liquidem, τῶν τεχνῶν μὲν ὄργανα διδασκαλίας καὶ διανοημάτων, τῶν ἡ πραγματικῶν διδάσκαλοι καὶ ἐκτελεῖται, προσέτι ἡ τῶν οὐτὴ ψυχῇ παθημάτων ὅτι σύμβολα. Plat. in Cratyl. Aristot. l. de Interpret. Eadem deniq; nomina disciplinarum in universum omnium fenestras velut sunt & claves, quibus ea propter non probē ante omnia trutinatis & explicatis, ad illarum possessionem pertinere licet nemini. Et profectō, quemadmodum à fastuoso turris Babylonicæ opere, homines olim dispersi, illud infectum relinquere coacti sunt, vocabula, quibus se-se mutuō loquentes, ad necessitatem intelligerent, quia non habuere: *Genes. ii.* ita præsentī seculo, Paracelsi, quod jacet, doctrina ænigmatica, quibus mysteria sua (si diis placet) involvit magis magisque, in causa sunt nomina nova, inaudita, barbara, per quæ, è Saturni velut prompta podice, turpiter illudit, nempe quod, quæ dicit, scire & intelligere vult neminem. Rectius *Gal. lib. i. m. iii. s.* ait, Artium omnium, medicinalis cumprimis, voces & terminos, vult & præcipit, ut sint perspicui, longo usu recepti, proprii, & mysteriis Medicis designandis accommodati. Quod commodum & beneficium summum utique, Dictionariorum subsidio solo consequimur. Via herclē expeditissima, quam, immenso latices pelago, committentes se-se, Ariadnæ velut filum, quorquor festantur, ad summum ejus apicem, virtute connixi deducuntur promptissimē: undē, quod de iis, qui erran-

DEDICATORIA.

erranti comiter viam monstrant, memoriæ prodidit Tullius, eos, quasi de suo lumine, lumen accendentes, facere, ut cū alteri accenderint, ipsis nihilominus adhuc luceat. Quid-ni id-ipsū de ipsis dici queat Lexicographis, qui suis in Lexicis, proprias disciplinarum dum voces, harumq; significaciones explanant, & proprietates, expeditissimam simul ad illarum perfectionem perveniendi, digito velut monstrant viam. Profectō, cū, divino Platone attestante, primi ad scientias aditus, ipsaq; disciplinarum principia obscurissima, prædensis velata sint tenebris, adeō ut, vix dum illis initiati, de internā illarum luce abditissimā desperantes, subsidiis hujusmodi, quibus ceu manu ducuntur, quoties destituuntur, easdem vel deferant protinus, vel, Andabatarum more, clausis, quod ajunt, oculis, motu vagabundo, Artium in stadio, deerent, earumque fructum, & finem ultimum nunquam assequantur. Sanē vel hinc liquet, quid de Compendiis simul & Dictionariis Medicis (totius Artis summam exprimentibus, ejusdemque elementa & principia graphicē delineantibus) judicii ferre deceat: ipsa videlicet haudquaquam, tanquam parva, contemnenda, sinē quibus magna, haud minū ac ædificia suis absque fundamentis, constare nequeunt. Hæc sola est ratio, quod unaquælibet disciplina & scientia, propria sua habeat Lexica. Hinc Lexicon Theologicum, Juridicum, Philosophicum; quid-ni Medicum etiam extaret Lexicon, quo, idoneā velut clave, latices penetrabilia, ejus magis magisque adaperirentur cultoribus? Hac verō in parte, cum alii complures Viri

EPISTOLA

omni laude dignissimi, inprimis JOH. GORRAEUS & JOH. MANARDUS defudârunt quàm plurimum, quin & BARTHOLOMÆUS CASTELLUS Messanenſis, ſuam, hæc in re, ſoboli Apollineæ, gnaviter præſtiturus operam, ſuccinctam, operoſis illorũ ex operibus, extraxit velut epitomen, & omiſſis ſimplicium medicaminũ (quippè quas materiæ Medicę ſcriptores copioſè ſuggerũt) appellationibus, affectuum p.n. cumprimis, aliorumque Medicinæ *τεχνικῶν*, & inſigniorum terminorum, definitiones, etyma, & ſignificationes illuſtriores, enucleare ſategit. Quod opusculum, ad Medicas res cognoscendas inprimis utile, quàm plurimos ante annos Patavii Anten. ſtudio Apollineo, cum vacarem adhuc, limâ, & elaboratione perfectiore, mihi, jam tunc, quàm viſum eſt digniſimũ. Quod proinde, Philiatorum petitioni, & induſtrii noſtri JOH. JACOBI GENATHII Baſil. Typographi poſtularo, annuẽs, anno ſuperiori, ad manus ſumens, Artis medicinalis propria & germana nomina, inſigniora Coi dogmata myſtica quæ deſignâr, ordine alphabetico, quàm fieri potuit diligentiffimè, & cõmodiſſimè digeſta, ex Grajo idiomate, illorum pleraque dimanent quantumvis, Latinis ſcripſi, reddidi characteribus, ac mox origine illorũ & etymo indigitato, uſitatiores crebrioresque eorundem acceptiones perſequutus, has ipſas, Hippocratis inprimis, & Galeni, ſed & aliorum celebriorum Medicorum auctoritatibus, & testimoniis illuſtrare, & declarare placuit. Prætereâ, omni orationis & ſtyli barbarie (quę opusculum hætenus non parũ obſcuravit) acriter expugnatâ, reſectis item hetero-

geneis,

DEDICATORIA.

geneis, quæ antea nec ſufficienter, nec ſatis clarè, locoque minùs cõmodo, explicata erant & tractata, ſuſius dilucidavi, & ſuo loco reſtitui, adeo ut Editio hæc, novam Inſcriptionem, & faciem priore multò venuſtiorè aſſumẽs, Iatricẽ ſtudioſis (ad quorũ ſtudia promovenda, omnia mea unicè cõparata ſunt) dubio procul exoptata futura ſint & deſiderata.

Vobis verò, Viri Clariff. Excellentiſſ., Medicum hoc Lexicon, ſummis laboribus elimatum à me, & perfectum, inſcribo: quippè quos itidem, & ad publica ſtudioſiſſimæ Juventutis Apollineæ cõmoda juvanda, quàm propenſiſſimos, & materiarum Medicarũ amore flagrantẽs, cognitione conſummatos, uſu, & experienciâ, admirabiles eſſe novi. Præſens itaque opusculum, ſummè eximias animi dotes, & virtutes veſtras eminentiſſimas admirantis, cumprimis raram illam veſtram medendi peritiã & dexteritatẽ, cum feliciffimo ſuccellũ conjunctam, micante velut in bractea fulgentem unicè ſuſpiciuntis animi mei, integerrimi ad hæc mei erga vos affectũs illibati, monumentum ut ſit, & ceuvoriva, in quâ, ſummi mei, in vos, veſtrosque omnes ſtudii ardentiffimi, ſigna depicta velut pateant, tabella; familiaritatis denique noſtræ, conſuetudinis priſtinæ, & complures ante annos hic initæ amicitie noſtræ perennaturæ, ut ſit obſes velut & artha, geſtio unicè, opto animitũs, etiam atque etiam peto.

Factum temerariũ forſan, tenue nimis, minùsque tũ ſingulari veſtrâ humanitate, tũ tantis virtutibus veſtris, & præclariffimè de Iatrice, ipſisque ægrotantibus meritis, conveniens & dignum: auxiliatrix ſiquidem veſtra manus, veſtra inquam

EPIST. DEDIC.

haud Argentinam duntaxat, & Alsatiam totam, sed & perdisita Europæ loca percrebuit medendi felicitas & industria, quo fit, ut tu cumprimis D. JOHANNES KÜEFFERE, tuaque summis à Principibus, & Dynastis, munitissimisq; ab Urbibus, harumq; capitibus, certatim jugiter sit expectata opera medica, summisq; identidem cohonestetur & deprædicetur præmiis, adeo quidem, ut ambobus vos, fastidiosus à medicationibus, & molestissimis à peregrinationibus, atq; ad externos patientes excursionibus assiduus, vix tantillum respirantes, vobis vix ac ne vix quidē quidquam, quod Theoriæ, & principiorū meditationi ulteriori, tribuatis, superet temporis. Inerim quidquid sit, Vos, Viri Clariss. Excellentiss. mihiq; amicissimi, quæ vestra est æquanimitas rarissima, quale-quale hoc munusculum, eo quo obfero, æquo bono animo suscipirote, obsecro, ipsius lectione, serios & herculeos labores vestros Medico-præcticos demulcerote, id-ipsūq; solidę eruditionis & auctoritatis vestræ fulgore, potenti ceu clypeo, sinistra adversum Sciorum judicia, & iniquissima Momulorū flagella munitore. Valete, salvere, Viri Clariss. Excell. Dabam currenti calamo, ex Musæo meo, Calendis Septembribus, Anno MDCXXIX.

VV. Excellent.

Studiofissimus

EMMANUEL STUPANUS, D.
& Professor Medic. ordinarius.

PRÆ-

PRÆFATIO

AD

REI MEDICÆ STUDIOSOS.



Nihil arduum nimis, aut laboriosius jussu, unquam existimavi, quod è re & ex usu tuo animadverti, studiose Lector: nimirum nihil mihi jucundius à primæ ætate visum est, quàm prodesse cunctis, nocere nemini; non enim nobis solis, sed posteris imprimis nascimur, & Homo Homines adjuvando, ad Deum quàm proximè accedit. Cum igitur experimento longo comprobatum sit, plerosque eos, qui rem medicam, non tam sapientia, quàm lucris studio sectantur, cum primum humaniores literas superârunt, & vix è primis Grammaticæ rudimentis emerferint, in altum Philosophiæ, & immensum Medicinæ pelagus, se ipsos ignoratis utriusque scientiæ vocibus, quæ prima elementa censeantur, infelicitèr precipitare, atq; sic, cæco ductore, in vastissimum scientiarum campum, & inextricabilem labyrinthum, citra Ariadnæ filium, (quo remeare possent) ingredi, Græcæq; literas, unde omnis scientia, tum præsertim Medicæ rei cognitio, & rerum, & vocum proprietates ortum duxerat, à primo certè limine insalutatas intermittere & præterire: unde poscè sit, ut in reliquo Medicinæ curriculo cœcucientes, nihil unquam laude dignum præstent. Propterea tanta temporis studiorumq; & studioforum calamitati consulturus, nullisq; laboribus parciturus, id oneris assumpsî, & in hoc laboravi unicè, ut mea fidei & doctrinæ commissos, primum & ante omnia Medicinæ elementa, rudimenta, principia, & Voces, Artūq; terminos insigniores sedulo edoceram, & tum demum principis hujusmodi instructos ad supremum ejusdem facultatis apicem, virtute connixos deducere, ut hinc & Medicarum vocum, & universæ Artis cognitio illis facile pateret, nec esset necessum, ut ipso in progressu in re exigua, vocum scilicet significatione, illi diutius, quàm par est, immorarentur, sed ultra ad altiora ejusdem facultatis axiomata, cognitis vocibus, possint assurgere, quamvis Græcarum literarum essent prorsus ignari. Non ignoro equidem, id laboris à Doctissimo Manardo, Joanne Gorraâ, ceterisq; nonnullis assumpsum fuisse: ab illo tamen intempestâ morte quippè sublato, opus inexplerum; ab hoc completum quidem, sed ob voces & literas Græcas ab iis saltè, qui Græci idiomatis peritissimi sunt, quorum non nisi paucissimi, perierunt, ut

intelligi posse. Noster insuper ex Galeni Hippocratiq; autoritatibus,
vorum Medicarum explicationem & significationem hauriam, ad-
duxi, sed eas, ut quisq; interpretatur, explicavit obiter. Nec in eo-
rum ego sum genere, qui ne oleus quidem in foro empturi sunt, citra
huius definitionem, neq; vocis ullius significationem admittunt,
priusquam eiusdem essentiam quiddamtrivā (ut in Scholis ajunt)
definitione percrutati fuerint. Mihi satis superq; fuit, etymon &
vocius ejusq; significatum principalissimum, ex Hippocrate, Galeno
& aliis desumptum, succincto sermone explicare, ut ii, qui accurate
vocius intelligentiam perpendere voluerint, ex iisdem Autoribus,
ad quos Lectorem remittimus, eam facile consequantur. Monitum
insuper volote, Lector amice, (ne quid in hoc opusculo desiderari
existimes) me hic simplicium & sponte nascentium è terrâ corporum
appellationes & harum significationem non attulisse, cum eorum
omnium à celeberrimo Matthiolo, voces & nomina, quæ in usu
sunt, in suo de Simplicibus volumine maximo, recensita, &
declarata fuerint. Inerim nostro hoc labore, in tuam
unius gratiam suscepto, studioq; Lector,
utere fructu feliciter.

Vale.



Ad
Excellentissimum & Experientissimum
VIRUM,

D. EMMANUELEM STUPANUM,
Philosophum ac Medicum acutissimum, Theori-
ces Professore ordinario, & p.c. Collegii Medici
apud Basileenses Decurionem spectatissi-
mum, Compatrem, & Fautorem
suum honorandum.

I.

STUPANUS ille, Præsidis qui sustinet
Nunc inter ordinem medentium vices;
Hic, quæ Camænas excitare Rauracas
APOLLO pergit carminis dulcedine,
Placere Genti semper Aesculapica
Magno labore nititur; seu pulpita
Scandit Palæstræ, sive dexteram admoveat
Docta Papyro. Testis esse LEXICON
Potest, politum durior pumice,
Videre quod vult Phæbicam nunc lampadem.
Devincit undè Paonas cunctos sibi,
Nomenq; fastis inserit perennibus.

Observantiæ testimonium

P.

JOHANNES SCRETA, Schoenovius
à Zavorzitz, Pragâ-Bohemus,
M. D.

II. HIP

HIPPOCRATES brevis est; prolixus in arte GALENUS;
Contrahis hunc; illum reddis at explicitum.

FUCHSIUS innumeris mendis navisq; seatebat;

Nec RIOLANE tuis ultima lima aderat.

Luxuriat CASTELLUS ibi; hic mox deficit idem,

Verbaq; non penitus barbariem effugiunt.

Omnibus his adhibes limam, multumq; terendo,

Sæpe revolvendo, scripta polita minus

Exposita, illustras, emendas, perficis, auges,

STUPANE, ô Medici stella corusca chori!

Luminis inde tui radios emittis ubique;

Atque novis laudes laudibus accumulas.

Pergo ita; quin nobis posthâc da plurima scripta;

Erue, quod reliquum, nare sagace animi.

Perge; Jurventutus conatus atque labores

Subleva, & erranti porriga, queso, manum.

STUPANI labor hic, STUPANUM, illud jubar ævi,

Volver ad alta Poli; volver ad alta Sali.

Huic DEUS omnipotens duplicatos Nestoris annos


Addat, ut amplifcet Pæonis Artis opes.

Debita observantia atq; gratitudinis ergo
adpos.

JOHANNES MELDER, Ulmenfis,
Medicinæ Doctor,



LEXI-



LEXICON MEDICUM,

EX

HIPPOCR., GALENI, AVICENNÆ,
ALIORUMQ; MEDICORUM
OPERIBUS
CONCINNATUM.



ABAPTISTA, sive Abaptistum, terebella est, quâ in fracturis capitis (quæ usq; ad cerebri membranam pervenerunt, & in quibus id, quod contusum est, extrahi debet) utimur: Cui terebella (ne dum Medici eam audacius tractantes, duram membranam, quæ ossi substernitur, violent) supra ejus acutam cuspidem, circum quendam sive labrum, sive supercilium, parum protruberans addidere. Vide Gal. l. 6. de m. m. c. 6. & Celsum lib. 3. c. 23. ubi monent, chirurgicum hoc terebellum, in cranii ossium perfractorum & contusorum perterebratione usurpâri solitum, ab ægeio & baptisto sic dictum, nimirum quod propter obicem, in summitate illius, quæ conspicitur, neutiquam immergi, altiùsq; desigi possit, & cerebri meningis hoc pacto intacta conserventur.

Abarticulatio, idem est quod dearticulatio, συζωσμός Græcis, est ea naturalis ossium conjunctio, quæ evidentem motum habet; sicut coarticulatio, Græcis συνάρθρωσις dicta, est ea naturalis ossium commissio, quæ exiguum &

A

obscurum aliquando, aliquando nullum motū præ se ferr.
l. 2. de artic. 8. & Hipp. l. de of.

Abdomen, ab abdendo sic dictum, communiter idem est quod imus venter, Aristoteli γαστήρ l. 1. hist. anim. 13. vocari solitus, qui superius quidem cartilagine ensiformi, ad latera costis spuris, inferius autē osibus pubis circumscribitur, ac dividitur in partem supremam, (quam in specie ἀνὰ γαστήρ nuncupant) mediam, (quæ umbilicalis est regio) & infimam seu hypogastrium. lib. 6. de us. part. cap. 4. Prestissimè autem acceptum Abdominis vocabulum, Anatomicis est ventris imi pars extima, totum illud, quod viscera naturalia integens, ex cute pinguedine, musculus octo & peritoneo compactum est. Gal. loc. cit. & 2. aph. 35.

Abductiones, quæ & abruptiones, Græcis ἀπαγωγὰς & ἀπορριπτήριαι dicuntur, fracturae sunt, quæ prope articulum, per totam osium crassitudinem, disruptæ ad instar caulis, & per medium dissectæ raphani in modū, fiunt, aded ut perfracti osis extrema, à se plurimum distent, quas recentiores affatim factas fracturas nuncupant. Gal. com. 3. in lib. Hipp. de his, quæ in medicina fiunt. 31.

Abluentia, & abstergentia medicamenta sunt, quæ succos mordicantes biliosos acres leniendo, evacuant, & intestina eluunt quasi & abstergunt, 1. de simpl. med. facul. c. 37. & lib. 2. c. 14.

Abolitionem pulsus vocamus, cum applicatis digitis motus articularum desicit, ac percipi omnino nequit. Differt interim pulsus abolitio, Græcis ἀποψία dicta, à pulsu deficiente seu intermittente: Illa enim totius functionis pulsatilis velut defectus est & privatio; Hic dimidia sate actionis est amissio. l. 2. de caus. puls. c. 3.

Abortus, est imperfecti fœtus exclusio, à quibuscunque causis

causis & utcumq; facta, quæ Hippoc. nunc ἀμβολισμός, nunc ἀπορριπτήριον vocat; & medicamenta id præstantia, ἀμβολισμικά, i. e. abortiva nuncupant. com. 1. in 6. de morb. vulg. 2.

Abrasa, ἀπορριπτήριον Græcis dicta, sunt ulcera, quæ mollem & suspensam habent cuticulam. 1. de compos. medic. per gen. cap. 1. Exponitur aliàs quoq; locus desquamatus & frustulum, in ulceribus à partu ulceratæ substantiæ abrasum.

Abrasio intestinorum, est ulceratio partium in intestinis superficiarum, quæ earundem partium ramenta educuntur. 3. de ratione vict. in morb. acut. 33.

Abruptio. Vide Abductio.

Abscedentia corpora, sive quæ abscefferunt, vocat Hippoc. omnia, quæ cum corpus secundum naturam sese habet, unita aliis partibus sunt, easq; attingunt; in præternaturali constitutione autem unionem vel contractum non amplius servant. Expansa autem vocat, quæ plurimo intervallo inter se distant: id quod duobus modis fit, vel in toto, vel in labris tantum. 2. de his, quæ in medic. fiunt. 25. Vide Apostasis.

Abcelsio apud Hippoc. generaliter sic dicta, idem est quod continuæ solutio: & membra, quæ ita affecta sunt, abscedentia vocat; tamen si certa quadam species solutæ continuæ, nempe ea propriè abscessio sit & abscessus, quam in specie apostasin & apostema nuncupant. lib. de his, quæ in medic. fiunt.

Abcessus, tumor est præter naturam suppuratus, constans pure rarenter bono, magnâ ex parte ad corruptionem quandam tendente. lib. de tumor. c. 3. Aliquando Hippoc. non eos solos abscessus vocat, qui per fluxionem fiunt, sed etiam cum transit morbus in alium. comm. 2. in 1. de morb.

vulgar. 21. Abscessus definitur aliàs, quod sit phlegmon in pus transmutatio. lib. finit. med. fol. 97.

Abscissio, Græcis Apocope, hinc morbus ex abscissione, est, qui citra declinationē soluitur, & terminatur in mortem, vel propter egrotantium imbecillitatem, vel propter morbi fortitudinem & ferociam, nimirum cum morbus supra vires exiit, quod lethaliū morborum est propriū. Gal. l. de totius morb. tempor. cap. 1. & 5.

Abstergentia. Vide Abluentia.

Abvacuatio, aliàs hypercristis, seu hypercatharsis, largissima est evacuatio, corpori plus aquo plethorico aut cacochymico conveniens, per patientem aut quamcunque aliam particulam facta. Gal. in Arte parva, c. 95.

Acamatos, media est omnium simpliciter musculorum figura, (quasi sine fatigatione dixeris, optima.) l. 2. de moru muscul. c. 1.

Acantha generaliter sic dicta, est spina indiscriminatum qualiscunque; præstius si sumatur, animalium quorundam, ut echinorum piscium, notat aculeos: in specie Galeo, dorsi est spina, seu spina apex, quem natura in spondylis dorsi est machinata, ex mediis partibus postremis, quod diens, quæ esset velut vallum quoddam tunc spinam totam oppositum, quod prius ipsum contrundi, modus, omnibus affici sit necessarium, quum ad nullum condylum noxa perveniret. 12. de usu part. cap. 15.

Accessio, aliàs paroxysmus, & invasio, est deterius tempus totius circuitus, quod est à primo insultu morbi, usque ad tempus ætuationis, sive per tertium, sive per quartum, sive quotidie fiat. 1. aph. 12.

Accidens aliquando passionem significat, & ipsam operationis lesionem. l. de differ. morb. c. 7. ubi inquit, Quæ

consti-

to 20 d'ito p. 20 p. Tac.

17 211 204 rada 204 p. 204

constitutionem partium similarium necessariū sequuntur, sanis quidem nobis accidentia, egrotantibus symptomata dicuntur. 1. meth. med. c. 9.

Accommodatum in corpore dicitur id, quod iuste sese habet ac cujuslibet partis natura est accommodatum. l. 1. de fractur. 2.

Acerbum dicitur, quod sapore pollet aded adstringente, ut lingua nostra admotum, hanc mirè afficiat, valde desiccet, contrahat, & in multam profunditatem usque, illam exasperet, sicut pyra sylvestria immatura, ab austeris solā intentione diversa. l. de simpl. medicam. facult. cap. 37.

Acetabulum, Græcis cotyle, est illud cavum osis extremi, quod capita alterius osis altius excipit. lib. de osib. in proem. Acetabula præterea dicuntur, vasorum & venarum, quæ ad matricem perveniunt, orificia, (quæ & cotylidones appellantur) quibus fœtus matri alligatur, & per quæ fœtus, ex matrice trahit spiritum & sanguinem. 15. de usu part. c. 5. Non secus ac Polypi acetabula, dicuntur extremitates vasorum, per quæ polypus nutritur. lib. de semin. cap. 7. Insuper, acetabula dicuntur vasa, per quæ singulis quibusque mensibus excrementarius sanguis in vulvam derivatur. ibid. Quamvis nonnulli homines vulvam acetabulis carere dicant. lib. de vulva dissect. cap. 10. Denique, profundos sinus, magnis superciliis circumdatos, tum Hippocr., tum alii, acetabula nuncupare consueverunt. l. de artic. 21.

Acetabulares vulvæ eminentiæ, sunt tumores vasorum uteri, ex retento menstruo distentorum prægnationis tempore evenientes, quales etiam recto intestino in hæmorrhoidibus accidunt. lib. de vulva dissect. cap. 10.

Achinesia, Græcis ἀκίνησις, i. e. immobilitas, strictissime

C sic dicta, est media quies, qua inter systolen & diastolen pulsus intercedit. 1. de differ. puls. c. 7.

Achlys circa totum nigrum oculi, a superficiali huius ulceratione facta, est cicatrix tenuissima, aëri caliginoso assimilata. lib. Introd. cap. 5.

Achoures, sunt manantia ulcera pericranii, seu cutis capitis, tenuissimis foraminibus cutem perforantia, ex quibus glutinosa effluit sanies. Huic morbo affinis est Favus, seu Cerion, in quo tamen foramina sunt, quam in illis, paulo maiora, melleum humorem continentia. lib. de remed. parat. facil. cap. 5. lib. de tumorib. cap. 15. 1. de comp. medic. loc. cap. 8. Vulgus ulcera hac vocat Tigna & Tineas; Arabes Sabafati.

Achrous, i.e. decolores homines. 4. de rat. vict. 115.

Aciam vocat Hippoc. filum per foramen acus Chirurgi tractum, quo vel partes corporis dissectas inter se committere, vel caput fascia subjectis partibus, assuere consuevimus; Nodum vero nuncupat vinclionem, qua ex fasciis inter se connexis exoritur. comm. 2. in lib. de his, qua in medic. fiunt. 7.

Acida bilis, proprie bilis atra, aut succus atrabilis, ius dicta, quid sit, exemplo ostendit Galenus; Vinum quidem dulce, (inquit) quod nondum ab uvis expressum fervet: ex eo, quem in se habet, calore, ex cuius mutatione duo proveniunt excrementa, alterum levius magisque aëreum, quod florem, alterum gravius ac magis terreum, quod facem vocant; horum alteri flavam bilem, alteri nigram assimilamus: qui succi quidem non eandem habent naturam & speciem, neque naturalem, nec prænaturalem in corporis nostri constitutione; quippe flava qua est, efficitur vitellina, ovorum vitellum tum colore, tum crassitudine similis, nigra

nigra vero longe malignior, ea quoque, qua similis ei, qua naturalis est, redditur. Nomen tali succo nullum est inscriptum, nisi quod aliqui eum vel radentem, vel acidum appellant, quoniam acris in morem aceti fit, & corpus animalis radit, terramque si supra eam effundat, fermentet veluti, ubi adventitia putredo, nigro illi succo naturaliter se habenti accesserit. Plerique talem succum naturaliter se habentem, sive supernè, sive infernè rejiciatur, facem, & limum quasi sanguinis, quin & atrum vocant succum, non autem atram bilem, quippe qua ex ustione quapiam melancholia naturalis imprimis, sed & aliorum succorum producit. Gal. lib. 2. de natur. facult. cap. 9.

Acida pituita est, qua omnino cruda est, talisque in secunda concoctione, qua in venis peragitur, facta fuit. lib. 2. de natur. facult. c. 9.

Acinosa tunica oculi. Vide Rhagois tunica.

Acinus. Vide Staphyle.

Acmaistica febris est, qua continuè crescit & intenditur: ut Epacmaistica, qua decrescit jugiter; Homotona vero, qua similem calorem ad finem usque servat. 1. 9. meth. 4.

Acmen, aμάλω, i.e. maximam exercitationis & motuum intentionem Græci vocant. 2. de sanit. tuend. c. 2. Sic etiam ætatem integram, juvenilem mediam, & summum, quod in illa viget, corporis robur significat. Inde translata est vox aμάλω tum ad alia omnia, tum ad morbos: & sic tertium totius morbi tempus, in quo summum habet vigorem, aμάλω dicitur Hippoc. 1. aph. 13. & Gal. 1. 1. de sanit. tuend. c. 2. & 1. 6. de sanit. tuend. c. 6.

Acopa medicamēta, ἀκρότης, i.e. lassitudine ex multo vehementique motu corporibus vel totis, vel huius particulis obortam tollunt, appellamus. Dicuntur etiam

acopa pharmaca, qua dolorem diuturnum in alto corporis latentem, vel motum difficilem, vel particule duritiem, vel tensionem, vel tumorem scirrhosum tollere apta sunt. lib. 7. de compos. med. per gen. cap. 11. & lib. 7. de compos. med. loc. cap. 1.

Acor, est ructus quidam acidus ex presentia ciborum corruptorum in ventriculo. 5. de usu part. c. 4.

Acordius homo, i.e. secors, iis duntaxat, qui principatum Anima in corde statuunt, dicitur. lib. 3. de placit. Hippocr. & Plat. cap. 4.

Acosmia. Vide Ataxia.

Actisæ vocabulum ab Hippocr. dupliciter usurpatur, vel cum omnino nullum, aut pravam iudicium futurum est. comm. 2. in 1. de morb. vulg. 46.

Acrochordon, verrucarum genus dolens, cujus exortus orbicularis, angustam obtinens basin. lib. Introd. fol. 97. Id ipsum Galenus vocat pensilem verrucam, 2. meth. med. 2. Acrochordon Aëtius & Celsus definit, quod sit verruca sub cute, durior, asperior, callosa, & plerumque teres, cuti concolor, infra tenuis, ad cutem latior, juniores maxime infestans, sic dicta, vel quod vertice suo similis sit resectæ chordæ, secundum extremitatem, vel quod in imo aded angustia, ut pendere videatur.

Acromia, vel Acromion, proprie est summus humerus, humerive pars summa, exterior & prominens, brachioque hærrens; notat insuper eam compactionem, quâ os scapulae, à spina tenue inchoatum, paulatimque plenius effectum, ad Acromii locum pervenit, & brachio connectitur. Alii præter hæc ambo, quæ conjunguntur, tertium os esse inquirunt, quod in hominibus solum deprehenditur, idque Cataclida & Acromion appellant, l. de ossib. c. 14. & l. 13. de usu part. c. 10.

Actio-

Actiones, Prisci omnes activos motus nominant, sicuti omnes motus, qui naturaliter se habent, nisi activi sint, pathemata, i.e. passionem, Græci vocant. 2. meth. cap. 3.

Actu aliquid tale esse, ex adverso est ei, quod est & dicitur esse potentia. 1. de simpl. med. facult. c. 9. Rursum verò quod energiâ sive actu calidum, frigidum, humidum, siccum esse dicitur, tale est, vel quod summam habet ejusmodi qualitatem, vel vincentem qualitates contrarias, sive ad cognati generis mediocre aliquid, sive ad unumquodlibet aliud, à nobis collatum. 3. de temp. c. 5.

Acuta exercitatio est, cujus celeres motus sunt. 5. de sanit. tuend. cap. 3.

Acutus morbus est, qui ob sui magnitudinem, & symptomatum vehementiam, ad summum vigorem celeriter properat, & cum agri periculo tempora sua celerrime percurrit. 2. aph. 23.

Acutus simpliciter morbus est, qui intra quartumdecimum diem integrè judicatur; Acutus verò ex decidentia, sive ex delapsu, usque ad quadragesimum diem sese extendit, & ulterius. 2. aph. 23. Peracutus verò morbus, qui ad septimum usque diem se extendit: Qui autem longius procedit, (sicut modò dictum) is dicitur simpliciter acutus: uti qui quartum diem attingit, exactè peracutus vocatur. 2. de dieb. decret. c. 12. Hippocrates acutum ex delapsu, morbum vocat adanctum, & acutum ex conversione. 3. progn. 10. & 1. prog. 25. Acutas etiâ simpliciter appellat eas febres, quæ maximâ ex parte continuæ sunt. 2. de cris. 12.

Adedentes, i.e. phagedena. lib. de aër. aq. & loc. cap. 2. Vide Phagedenæ.

Aden, i.e. glandula, convolutio quadam est sicca, & carnosa, vel carnosa conglomeratio. lib. finit. Medic. fol. 97.

A 5

impressione Veneta. Eundem adenem, corpus carnosum vocat, quod utiq; velut cuneus quidam, vasorum divisionibus prepositum fulcimentum ipsis tutum suggerit, ut à nullo violento casu afficiantur, 4. de us. part. cap. 20. quem adenem Thymum vocat, 6. de usu part. cap. 4. Insuper, adenam, seu glandulas, vocat carnosas partes raras, & spongiosas, quæ in alis, inguine, & collo sunt, 13. meth. cap. 5.

Adeps, qui & axungia, & sævum, Græcis γράσι dicitur, differt à pinguedine, quod ille crassior sit, animantibusq; natura terrestris sibi provenit, velut humidiorib; pinguedo. Insuper, hæc liquefit facili, coalescit difficulter; econtra autem adeps concrevit promptius, sed non nisi ægerrimè funditur, ut docetur lib. 2. de part. anim. cap. 17. & Gal. lib. 11. de simpl. med. facult. c. 17.

Adiapneustia, i.e. impedita perspiratio, 11. meth. 10.

Adjutorii os, Hippocrati dicitur os humeri, quod maximum omnium est, femore excepto, lib. de osib; cap. 16.

Adnata tunica, quæ & agnata. Vide Rhagois.

Aegilops, Anchirops, Arabibus Algaras, Barbaris abscessus est, ad angulum oculi, qui naribus propior est; pus continens, quod acrimoniam suam, temporis decursu os exedit, & usq; ad nares destillat. lib. Introd. cap. 15. & 5. de compos. medic. loc. cap. 2. & lib. de remed. paratis facil. cap. 12. Id ipsum ulcus, si neglectum fueris, in fistulam desinit. lib. de oculis, cap. 9.

Aequalis & temperata ad pondus temperatura, est in omnibus animalibus & stirpibus ea, quæ ex pari, quoad fieri potest, elementorum commixtorum spectatur mole: sicuti econtra æqualis temperatura ad justiciam, est, quæ tum animalis, tum stirpis natura convenit; (convenit enim aliis, ut humidum sicco, aliis, ut frigidum calido preponderet:)

deret: & quæ non tam potere & mensurâ, sed ex eo, quod unicuiq; pro dignitate convenit, æqualitatem explorat; animalia enim, & stirpes, optimam mediamq; habere in suo genere temperiem dicimus, non utiq; quasi paritas exacta contrariorum in eis sit, sed quod talis mediocritas, quæ cujuslibet mixti naturæ accommodata est, iisdem adsit. 1. 2. de temp. cap. 3.

Æqualis inæqualitas dicitur, non in pulsibus modo, sed aliis prope omnibus, quæ pristinam naturam immutant, sive magnitudine, sive qualitate aequalia capiunt incrementa aut decremента: nam quatenus æqualitatem primamq; naturam commutant, inæqualia vocantur; sed quatenus æqualem & patem semper mutatione assequuntur, æqualiter dicuntur mutari, & æqualiter inæqualia vocantur. lib. 1. de differ. puls. cap. 11.

Æqualis morbus est, qui æquales motus, symptomata similia, parilemq; ad finem ferè usq; obtinentes magnitudinem, perpetuo sibi constant; cum econtra inæquales morbi aliquot diebus vehementiores fuerint, postea sine aliqua significatione torpent, mox rursus ad augmenti continuitatem accipiunt: quo argumento ab Hippocr. dictum est, Continuorum morborum & æqualium acutiem non posse ultra diem decimum-quartum protendi. 2. aph. 23.

Æqualis pulsus est, cum omnes ictus æqualem inter se servant proportionem, ita ut secundus respondeat primo, & tertius secundo. 1. de differ. puls. cap. 10.

Æquivoca sunt, quæ non sunt unius generis: quæcumq; enim nomina unam speciem multis singularibus communem significant, univocè de ipsis dicuntur; quæ verd de multis differentibus specie dicuntur, æquivoca nuncupantur: uti inprimis res, quæ ipsis subijciuntur, ab ipsisq; significantur.

ficantur, equivoca sunt. *comm. 3. in lib. de his, quæ in medic. fiunt. 24.*

Aëroſis, quaſi Aëratiō, vel ſanguinis attenuatiō, & in halitus ſolutio, eſt ſanguinis portio maximè aërea, vapoſa, aëri, qui per inſpirationem attrahitur, permixta, ex qua ſpiritus generantur pariter, & inſtaurantur. Quin & diſſolutus, idem eſt, quod cuſtodia vel conſervatio, vel reſtauratio ſpiritus deperditi ex reſpiratione & tranſpiratione, & qui ex ſanguine attollitur, vapore. *11. meth. 3.*

Aeruginofa bilis, qua ærugini ſimulatur. Vide Bilis pallida.

Aethiologia, ſive Pathologia, Medicina pars eſt, in qua ea, quæ præter naturam ſunt, inquirimus, morborum genera, ſymptomata, utrorumq; horū cauſas, & accidentium concurſus, &c. *lib. Introd. c. 7.*

Affectio ſanguiflua, eſt idem quod αιμαρροια, in qua plurimum ſanguinis profunditur. *comm. 2. in 6. de morb. vulg. 14.*

Affectus magnus & gravis dicitur, aut propter præcellentiā partis laborantis, aut propter affectus magnitudinē, aut propter ipſius cacoethiam. *4. meth. c. 6.* Spectatur enim affectus magnitudo tripliciter; ex leſa actionis præſtantia, ex propria affectus eſſentia, & ex leſa facultate, quæ leſum corpus gubernat. *7. meth. c. 12.*

Affectus ſtatuofus præcordialis & melancholicus eſt, quo, iis maximè, qui inclinante ætate plurimā Venere utuntur, ſub autumnum maximè, inflatur & tumeſcit venter. *comm. 3. in 6. de morb. vulg. 12.*

Affectus implicatus eſt, in quo multa ſunt affecta partes, à diverſis tum morbis, tum cauſis morbidis obſeſſæ: nam poteſt idem homo non ſolum laborare ex thorace, ſed

ETIAN

etiā ſimul & eodem tempore ex pulmone, capite, ex imo ventre, & ex jecinore decumbere. *comm. 2. in 3. de morb. vulg. in argum.*

Affectus, qui & χεῖρος dicitur, eſt dubia & incerta, minimèq; firma corporis diſpoſitio; is verd, qui firmus & certus eſt, & quaſi habitus; χεῖς dicitur & διαβῆς. *8. meth. cap. 3.*

Affectus, quos Græci παθῶνες vocant, paſiones ſunt, quæ in corporibus noſtris ſiunt præter naturam. *com. 2. in 1. de morb. vulg. 23.* Dicitur verd affectus ſive affectio ab afficiendo, & de multis quidem effertur rebus; in Medicina verd reſeſſus in ſtatum præter naturam, qualescunq; ii fuerint, affectus ſive affectiones nuncupantur. *lib. de cur. rat. per ſang. miſſ. cap. 3.*

Affectus puerilis. Vide Comitialis morbus.

Affuſio nutrimenti, Græci parenchyma dicitur, *lib. Introd. cap. 9.* Vide Parenchyma.

Agathon ſignificat apud Hippoc. idem quod idoneum, natura noſtra congruum, certum item, ſtabile, verum, & perpetuum, ut auctor eſt Galenus *com. 2. in lib. de fract.* Idem verd reſtatum reliquit in *com. lib. 2. de articulis*, Agathon apud veteres id omne dici ſolere, quod in ſuo genere primum eſt, & perfectum.

Ageraſia, i. e. inſeſcencia. *lib. de marcere, cap. 2.*

Agglutinatiō. Vide Proſtheſis.

Agitatiō. Vide Vibratiō.

Agnata tunica, ſive adnata. Vide Ophthalmia.

Agonia, eſt inæqualis motus, ex timore & ira compoſitus, timore intro & ad vita principii, ipſum cor, tum ſanguinem, tum ſpiritu unā cum refrigeratione eorum, quæ in ſummo corpore ſunt, abducente, & contrahente, irā verd forās

foras agente, & fundente calore, simul spiritum, & sanguinem lib. 2. de sympt. caus. cap. 5.

Agrestis lichene, i.e. imperigo. 6. de compos. med. per genera, cap. 2. Vide Impetigo.

Agrypnia, i.e. vigilia. 2. meth. 2.

Apathia, impatibilitas, uti e contra ἀπάθεια est perpetua passibilitas. lib. art. med. c. 8.

Alæ aurium. Vide Aurea. Vide etiam lib. Introd. c. 10.

Alæ narium, sunt tenuia cartilaginea, corpuscula utriusque, nasi lateri à parte inferiori adnata, lib. de ossib. c. 4. quæ etiam pinnulas vocant, lib. Introd. c. 10. Vocant adhuc & pinnas, 2. de loc. affect. c. 2.

Alaria ossa. Vide Sphenois.

Ala etiam dicitur superhumeralis, Græcis ἐπ' οὐρῖς, i.e. superior humeri pars, quæ ad collum vergit; nam humerus totum id, quod in dearticulatione hac apparet, & quod inter duas juncturas humeri & cubiti intercedit, vocatur. Vbi rursum advertendum, id, quod non apparet à posteriore parte, os scapula; ab inferiore verò parte, id, quod dum totum brachium attollitur, manifestum fit, in specie etiam alam nuncupari. 1. de artic. 4.

Alba vitiligo. Vide Leuce, & Vitiligo.

Albam pituitam Medici aqua inter cutem speciem, leucophlegmatian, nominant, quod in ea pituita sit alba, & propter mixtionem aliorum humorum, verum mutet colorem. 7. aph. 29.

Albaras. Vide Aegilops.

Albugineus oculi humor, similis albumini ovi, aliàs & aqueus, opposita parte vitrei humoris exterius, ante crystallinum positus, non concretus ut alii humores, sed liquidus, in foramine tunica vrea collocatus, superfluitas est crystal-

crystallini humoris aquea, ad ipsum, visibilibus aduersum vehementiam defendendum, suâ humiditate. lib. de anat. vivor. Vide Hyaloides, & Crystallinus.

Albugo, cicatrix est crassa, & profunda, ulceri (oculi Iridem quod obsidet) inducta. lib. finit. Medic. lib. Introd. cap. 17.

Albulam, vocant aquas aluminosas: quin & Rhatia montem, nivibus jugiter obsitam. 8. meth. 2.

Alexipharmaca medicamenta sunt, quæ deleteria, i.e. lethalia venena, intrus assumpta evacuant, obrundunt, & fugant. 5. de simpl. med. fac. cap. 18. & 1. de semin. cap. 16.

Alexiteria medicamenta sunt, quæ venenatarum bestiarum morsus & ictus, ipsaq; venena sanant. 5. de simpl. med. facult. cap. 18.

Alhacab, est illud ligamentum, quod ad muscolum non extenditur, sed ab osse uno natum, continuatur inter duo extrema ossium, aut inter alia duo membra, annectendo unum alteri, firmiter subsistit. lib. de anat. vivor.

Alica, ex genere tritici est. 1. de alim. facult. cap. 6.

Alienam caliditatem vocat Aristoteles externam, non insitam, neq; nativam in quocumq; rerum genere; nam hac coquere apta est, extrema autem & externa corrumpere solet & putrefacere. lib. 2. de differ. febr. cap. 9.

Allantoides. Vide Chorion.

Alopecia, capillorum destitutum est, propter vitiatos humores sic appellata, quod vulpibus frequenter accidit: 1. de compos. med. loc. cap. 2. & in qua locus affectus apparet scaber, colore prorsus exanguis. de remed. pat. facult. c. 6. Eandem aliqui vocabulo specialiori etiam areas vocant. 2. meth. c. 2.

Alphi, i.e. vitilignes, ex humorum vitiositate, qua in cute

cute sunt, quemadmodum etiam de Lepra planum est, oriuntur. lib. de humor. com. 3. Vide Vitiligo.

Alteratio, est alimenti concoctio, usque-quod in similitudinem partis, quæ nutritur, transmutatur. 8. de compos. med. loc. cap. 6.

Alvus liquida appellatur, in qua liquida dejiciuntur. comm. 2. in 1. prorrh. 3.

Amara bilis, ea & pallida, & flava dicitur. 2. de differ. febr. cap. 1. Vide Bilis pallida, & Picra.

Amaraufis, est totius in oculo lucis impedimentum, visio obscura & tenebrosa, visus hebes & obtusus, acutis morbis accedens, & imbecillis facultatis animalis signum. comm. 2. in 1. prorrh. 11. 20.

Ambas. Vide Ambonæ.

Ambotica .i.e. abortiva medicamenta. Vide Abortus.

Amblyopia, est visus hebetudo, in qua oculi nec phlegmone tenentur, nec influxu torquentur, nec ulcerari sunt, nec aliud quidvis mali aliàs perpetiuntur. lib. 5. de simpl. med. facult. cap. 23.

Ambonæ, sunt margines, sive labra, & supercilia coryllarum, & cavitatum, 2. de usu part. cap. 17. quas quidam etiam ambas appellant. 1. de artic. 10.

Ambusta sunt, quæ igne, vel ardenti, aut regiâ aquâ comburuntur, ita ut bullas aliquando excitent, 9. de simpl. med. fac. quæ etiam ambustiones vocantur. 11. de simpl. med. fac. Constat autem, si quis in aqua ferventi ustus fuerit, hunc etiam affectum Pyricauton, .i.e. ambustum igne, nominari. 1. de compos. med. per gen. c. 4.

Amentia. Vide Anœa.

Ametria, est à justa temperie recessus. 2. meth. c. 4.

Amni-

Ammata, fascias Græci vocant, quibus venter, pectus, costæ, lumbiq; alligantur. 3. de sanit. tuend. c. 2.

Amniculum. Vide Chorion.

Amnium. Vide Chorion.

Amolynta, .i.e. non inquinantia medicamenta, similia his, quæ propriè epithemata dicuntur. 7. de comp. med. per gen. cap. 11.

Amphiblestroides, .i.e. retiformis seu verrucalis tunica, quæ à cerebro ad oculos profecta, vitreum & crystallinum humorem ambit; cujus tunica figura, in latum diffusi, atq; expansi nervi verriculo similis apparet: ut est lib. 3. de placit. cap. 5. Vocant tunicam retiformem, quod figura quidem reti sit similis, cæterum nullo pacto est tunica, neq; colore, neq; substantiâ nervum referens, sed si exemplam ipsam reposueris, cerebri portio quedam, aut potius quoddam quasi illius videbitur excrementum. 10. de usu part. cap. 2. Vide Choroides.

Amphimerina febris est, quæ singulis diebus accenditur, atq; intermissione finitur. Idem planè, quod quotidianæ simplex; eam enim, quæ intermissionem non habet, non Cathemerinam, ut quidam, sed Quotidianam continuam vocat Gal. 1. 2. de differ. febr. c. 7.

Amphisimela, est instrumenti genus, quo Anatomici secant corpora. 6. de Anatom. adm. cap. 10.

Amuleta medicamenta, quæ Græci *ἀμύλῃα* vocant, sic appellantur, quod de collo suspendantur, aut alicui corporis parti alligantur, lib. de remed. par. fac. cap. 1. eademq; qualitatis familiaritate, seu potius totius essentia similitudine venena trahere & juvare creduntur. Gal. lib. 5. de simpl. cap. 18.

Amygdalæ. Vide Paristhmia.

B

Amylum, ex tritico cibus. 1. de alim. fac. cap. 8.

Anabrosis, quæ & Diabrosis dicitur, est solutio con-
tinitatis, in osse, vel in vase aliquo, ex erosione ab humo-
ribus mordacibus introducta. §. loc. aff. §. Vide Diabrosis.

Anacollemata, medicamenta sunt fluxiones oculo-
rum restringentia, de remed. par. fac. cap. 10. qua fronti, &
temporibus imponuntur. 11. de simplic. med. fac.

Anadiplosis, est. accessionum reduplicatio. lib. de Ty-
pis, cap. 4.

Anadosis, est nutrimenti per venas transitus ad hepar, idemq; est ac digestio, seu distributio. Differt à Diadosi, quod sit translatio, traditio, vel porrectio nutrimenti in invisibilem nervorū, arteriarum, extimarumq; partium substantiam intimam, nutrimento à lateribus illorum vasorum attracto & translato. 2. de nat. fac. 6.

Analeptice, renutritoria refectoriaq; vocata, est victus ratio. 7. meth. 6. Unde Analepsis, i.e. resumptio. lib. de marcore, cap. 9.

Analogismus, est comparatio & perceptio causarum
inordinatarum, praesidiarumq; juvantium, per similitudines.
ad Thrasib. cap. 11. Sive, Analogismus est ratio, qua ab evi-
denti auspiciata in rei obscura cognitionem nos inducit.
1. progn. 6.

Anaplerotica medicamenta sunt, quæ cicatrices
crassant, & alta profundaq; vulnera in carne complent &
ad cicatricem perducunt. lib. de Dynamid.

Anasarca, quæ & Catasarca, Hypofarcidium, & Epifarcidium dicitur, Hydrops species est prima, minutissima, in qua cruditates copiosissima in tota inferiore thoracis regione acervantur, habitusq; totus pituita plenus redditur. 4. de rar. vict. iii. Diciturq; Anasarca, & aqua inter

*inter cutem, quod per carnem ille humor pituitosus crudus
fluat. lib. finit. med.*

Anastoechiosis, quasi reelementationem dixeris, est colligatio, seu resolutio, seu dissolutio, aliquando totius corporis substantiæ, aliquando succorum, qui in venis sunt, duntaxat: quod autem ex ea colligatione provenit, alias ad ventrem confluit, alias ad urinas, alias ad sudores pellitur. 3. de sympt. caus. cap. 2.

Anastomatica, i.e. aperientia medicamentis, quæ ung-
uæ fori oscula aperire apta sunt; id quod rursum præstat
extergendo, incidendo, obstructions tollendo, & dividen-
do: differuntq; à rarefacientibus, sive diaphoreticis, quippe
quæ cutis tantum meatus referando, sudores, aut
ἰατρικὰ ὀρεῖα ἀναπνεύειν promouent. s. de simpl. med. fac. c. 14.

Anastomosis. *Vide* Osculorum apertio.

Anatafis. *Vide* Caratafis.

Anatome, est humani corporis totius, abditarumq³
cumprius eius partium, dissectione, & speculatio, ut sensibus,
qua in iis delirescunt, patefiant, pleniorq³ & facilior ea-
rundem instruat curatio. lib. finit. med.

Anatrypsin, i.e. refractionem veteres Græci solent appellare, non eam duntaxat, quæ ab inferiore parte sursum ducitur, sed absolute omnem quomodocumq; factam frictionem, seu fricationem. comm. 3. lib. de his, quæ in medic. fiunt. 25.

Anchilops. *Vide* Aegilops.

Anchoralis processus. *Vide* Ancyroides.

Anchyle. *Vide* Ancylye.

Ancon, *ἀνκων*, communiter, totus est gibbi cubitus, propriè magis gibberi medium, cui innitimur, seu brachii flexum notat, & manus curvaturam : dicitur quin imò

Ancon, alterum majus cubiti os, quod & Olecranon vocat Hippoc. 2. de usu part. cap. 2. Vide Brachium.

Ancos, sive Galianconas, ἀνός γαλῶν, i.e. à felibus aut aliunde deducto nomine, eos vocat Gal. & Hippocr., qui brevibus sunt lacertis, aut quibus, cum auferentur eorum corpora, ex luxatione brachii, in alam, os brachii brevius evasit. 3. de artic. 88.

Ancyle, sunt poplitis flexura & curvatura, uti & ejusdem poplitis partes retrorsum post genua spectantes. lib. Introd. cap. 10. Unde Ancylas sive etiam Ancyllas, vocat difficiles artuum motus, & ligationem nervorum, articulorumque contractiones. 7. de comp. med. per gen. c. 6. Vide Poples.

Ancyroides, processus acutus exiguusque, est in interiori parte, ossis cervicis, & scapula, qui cum anchoram, vel corvinum rostrum referat, Anchoralis, & à nonnullis Cera-coides nuncupatur; quandoquidem extrema ejus pars, uti cornicula rostrum, ad exteriora inclinat. lib. de ossib. c. 14. 1. de artic. 2.

Aneurisina, est arteriarum, & partium, quibus illa implantantur, tumor p. n. pugni interdum magnitudine, pulsus edens velut arteria magnus, & molestus, qui cum premitur, ex parte refugit, sed mox iterum erumpit: causa antecedens, est arteriarum substantie nimia dilatatio, orificiisque earundem apertio; proxima, est sanguis arteriosus tenuis, ex arteria erumpens sub cutē, eam in tumorem attollit, illicque sinum sibi efformat, in quem arteria sese exonerat. Galenus ait: Ore autem in arteria facto, aneurisina vocatur. Fit autem, vulnerata arteria, cum ad cicatricem pervenerit, qua ei adjacet cutis, manente interim arteria ulcere, eademque, neque conglutinata, neque ad cicatricem simul perducta, neque à carne obstructa; quo fit, ut arteria

teria sanguinem jaculetur, qui contineri non potest. lib. de tumor. cap. 11. Ubi etiam hac addit: Dignoscuntur porro aneurisinata, arteriarum haud solum pulsibus, sed & quoddum premuntur, omnis tumor delitescat, recurrente in arterias sanguine, qui illum fecit, tenui spirituofo, &c.

Angina, ab angendo, quoddam angat guttur, viamque spiritui praecludat, in genere dicitur omnis faucium & gutturis affectus p. n. in quo respiratio quoquo modo fit deterior; proprie est phlegmone, aliàs extra collum sitarum partium, aliàs intra tonsillas reconditarum inflammatio talis, quā simul partes quoque, afficiuntur respirationis, & egra spiratio sequitur. lib. finit. med. Vel brevius, est tumor ad fauces & venas jugulares modò à glutinosa frigidaque fluxione, quam pituitosam vocant, modò à calida & acri, quam picrocholam biliosamque, appellaverit, quae & Cynanche dicitur, 4. de rat. vict. 30. Aliis Synanche, aliis Paracynanche, aliis Parasyanche appellatur. 4. de loc. aff. 3.

Angor, est cordis nativi caloris quadā quasi contractio, & in centrum retractio, ad quam sequitur ejusdem cordis dolor, palpitatio, & tristitia; pessimusque, est signum, si in principio acutarum febrium advenerit. 1. de humor. com. 1. 4. de diff. puls. cap. 3. & com. 2. in 1. de morb. vulg. 75.

Anguli oculi, sunt interiores oculi termini, ubi palpebra coalescunt, alter juxta nasum, juxta tempora alter, hic parvus, ille magnus dicitur: uterque autem Canthus, i.e. angulus, appellatur, lib. Introd. c. 10. Dicuntur & Hirque oculorum, lib. de vena sect. contra Erasistr. c. 6.

Angustus pulsus. Vide Pulsus lacus.

Anhelosi sunt, qui densum spiritum habent, & simul thoracem multum distendunt: quod contingit in affectionibus, multum à inspiratione indigentibus; ut, à cursu, aut vo-

hementi exercitatione, & ardentibus febribus. 3. de diffic. respir. cap. 11. Propriissime, anhelationes, asthmata vocat Gal. 1. 8. de simpl. Quando, inquit, qui citra febrem dense respirant, qualiter faciunt, qui velociter cucurrerunt, ab accessione hac, Medicis Græcis, asthmatici, Latinis anhelosi appellantur; eosdem etiam ab alia accessione, orthopnoicos vocant, quod totum corpus rectum habere & cervice erectâ spirare coguntur ob timorem suffocationis, & proin stratum circa supernas partes, ad quas thorax reclinatur, sibi ipsis erectius faciunt, ne dormientes strangulentur. 7. de compos. med. loc. cap. 6. & 3. aph. 26. & comm. 2. in 3. de morb. vulg. 4.

Anima (apud Galenum) aut temperamentum activarum qualitatum est, aut illud, quod temperamento alteratur & organo veluti in operando utitur. 3. de loc. aff. cap. 7. & comm. 5. in 6. de morb. vulg. 5. Vide Calor nativus.

Animalis motus est, qui animantium corporibus, cum sana sunt, pro arbitrio & voluntate, impetu nervorum, musculorumque ministerio fit, quem Medici voluntariam actionem, sive animalem appellare solent. lib. de trem. & palp. cap. 2.

Animalis virtus est, quæ ex cerebro originem ducit, quæque ex motuum voluntariorum vigore aut imbecillitate deprehenditur; perinde ut virtus, quam ex corde prodeuntem, vitalem nuncupamus; ex pulsum debilitate, atque ex hepate quæ orta, naturalis dicitur, ex sanguineus egessionibus ab initio aquosis atque tenuibus, postmodum vero crassis ad modum facis. 1. ad Glau. 14.

Annotatio, quam *ἐπισημείωσις* vocant, est accessionis principium. 2. aph. 1. Dicitur etiam annotatio, sive significatio,

ficatio, sive *σημείωσις*, i. e. morborum dignotio ex similibus ac dissimilibus consideratione. 1. de his, quæ in medic. sunt. 1.

Annotatio incompressa, hecticarum febrium proprium indicium est, cum pulsus major statim, ac velocior à cibo efficitur, sine ullo interim horrore, dormitatione, pigritia, frigefactione extremorum, aut inequalitate pulsus, aut frigiditatis caliditatisve sensu: ut dicitur lib. 1. de diff. febr. cap. 9. Vide Febris.

Anodyna, i. e. dolorem sedantia, sopientia, & narcotica medicamenta, 12. meth. 1. quoniam sensum animale sopiendo, dolores sedant, non tamè dispositiones penitus sanant, sed vim sentiendi obtorpescere faciunt. 1. 2. ad Glau. 6. ait, Anodyna dolorem sedantia sunt, sed facultas anodyna alia reverà talis est, alia improprie *ἀνωδύνα* dicitur, eo sensu, ac si quispiam hominè mortuū dicat *ἀνωδύνα*, quia dolore vacet. Caterum, vera anodyna facultas est eorum, quæ primo ordine calefaciunt, & sunt essentia tenuis; at facultas eorum, quæ dicuntur anodyna quidem, sed reverà non sunt, frigida est & aquea, quæ absoluto utentia frigore, partem obstupefaciunt; unde & narcotica, i. e. stupefacientia dicuntur. 5. de simpl. med. fac. cap. 9.

Anœa, Græcis *ἀνοία*, i. e. amentia, est ratiocinatricis functionis veluti paralytis, & abolitio. lib. de symptom. differ. cap. 3.

Anomæomeres, membrum est, quod ex dissimilibus partibus est conflatum. 7. meth. 6.

Anorexia, i. e. inappetentia, idem significat quod Astia, & Apositia, i. e. abstinentia à cibo. 4. aphor. 17. Vide Apositia.

Antegressa causa, quæ & antecedens, Procatarectica, anticipans denique, procataxhon dicitur, est, quæ

extra corpus posita, eas, quæ in corpore dispositiones sunt, antegreditur, ac corpus nostrum subiens, id ipsum vehementer & violenter alterat, l. 5. de caus. puls. cap. 1. quascunq; dispositiones, vel motus in ipso animali præter naturam, morborum præcedentes causas nominat; quæ verò extrinsecus adveniunt, & alterant corpus, atq; naturam vehementer transmutant, præincipientes appellat, in lib. de caus. morb. cap. 2. Eadem primitiva, & initiatrix dicitur, 6. de loc. aff. 4. quin & prophasis, & occasio appellatur, com. 3. in 1. de morb. vulg. 19.

Antheridæ, i. e. florida appellata compositiones. 5. de comp. med. loc.

Antiadæ, sunt glandula, quæ sibi ex adverso in oris termino utrinq; jacent, & ex fluxione in tumorem attolluntur. 3. de caus. sympt. cap. 4.

Anticardion, dicitur cavum illud, quod sub pectore est, carneum molleq;, ad os ventris pertingens: vocatur etiã Sphage. Rufus verò, cavitatem eam pectoris, quæ est ad claviculas, tradit ab Homero dici Leucaricon, à Medicis verò Anticardion & Sphagen.

Anticipans morbus est, qui cum diversis horis semper accedat & remittat, prævenit quidem continuò, citiusq; horas persolvit, unde anticipans dicitur, sive prolepticus; qui verò tardat, hystericus sive posterius veniens nuncupatur. lib. de Typis, cap. 3. Vide Antegressa.

Anticnemion. Vide Gastrocnemion, Sura, & Tibia.

Antichir, est magnus digitus manus, qui & pollex, & promanus dicitur. lib. de muscul. dissect. cap. 22.

Antidixis, contraindicatio, sive indicationum contradi-

tradictio: indicationes autem, sunt auxiliorum inventiones. 2. meth. cap. 7. Vide Endixis.

Antidorus, medicamentum est, quod non extrinsecus impositum, sed intus assumptum malignas, cœcas & latentes corporis affectiones sanat. 1. de antidotis, cap. 1. Mos est junioribus Medicis, antidotos appellare, non modò quæ adversus mortifera medicamenta, quæq; ad morsus istiusq; venenosos exhibent, sed etiam quæ contra malas corporis affectiones, præsertimq; diutinas valent, ex aliquo ulcere aut abscessu consurgentes. 2. de antid. cap. 6.

Antispasis, i. e. ad contrarium revulsio; avertitur enim sanguis, atq; ad alia membra convertitur, tum ad proxima derivatus, tum ad contraria revulsus: illud Parocheusius, hoc Antispasin Græci vocant. 5. meth. cap. 3. Vide Revulsio.

Antispaticion, i. e. auxilium in diversa revellens. 13. meth. 11.

Anthrax, i. e. carbo, seu ulcus escarosum, iis, quæ exusta sunt, quàm similitimum; cui adjungitur partium circumstantium inflamen. 6. aph. 45.

Anticasis est, cum quæ disident ossa, ad hoc, ut è directo admoveantur, prius retrorsum trahuntur: osium hæc ad oppositum tractio, Anticasis dicitur, 6. meth. 5.

Anulus, est recti intestini orificium sphinctere musculo donatum, per sedem prodians, quo excretionem, cum lubet, aliquandiu retinemus; sic dictus à figura: ab officio verò strictor dicitur. lib. Introd. cap. 10.

Anus, seu vetula. Vide Umbilicus. Dicitur etiam anus, inferior corporis pars, quæ excrementa redduntur. 3. de usu part.

Apagma, Medicorum appellatio propria est, quoties

osis finis, quâ parte maximè cum alio committitur, caulum disruptorum ad-invicem abruptus est. 6. meth. 5. Vide Abductiones.

Apanthismos, est subtilissima linea, quæ agrè videri potest, quasi tu exolecentem lineolam diceret; cui similia sunt, venarum quadam propages, filorum araneæ, aut capillorum modo angustæ, & extensæ, quæ venæ capillares dicuntur. lib. de dissect. venar. & arter. cap. 8.

Aparachyton vinum, i.e. vinum meracissimum, purum & originale, cui marina aqua non est admixta. 4. de compos. medic. per gen. cap. 7.

Apechema, diremptio est osis superficiaria, vel etiam profunda in partibus ictui oppositis. lib. finit. medic.

Apepsia, i.e. cruditas. 2. meth. 2. Vide Concoctio.

Apepta phymata, solitus est Hippoc. nominare cruda tubera, seu tumores præter naturam, nervosa corpora, vertebriis ipsis atq; spinali medulla insita, extendentia: causam nempe gibborum effectricem. 4. de loc. aff. c. 3.

Aperientia. Vide Anastomata.

Aperistaron, i.e. cavum ulcus apertum. 2. de compos. medic. per gen. cap. 1.

Aphonia, i.e. obmutescencia, seu vocis carentia, quæ agris solet accidere, haud laesis duntaxat iis, quæ voci efformanda subserviunt, instrumentis, sed etiam iis, quæ respiratori deputavit natura; quin etiam ob recentem quandam exsolutionem, & afflictionem virtutis animalis, & sensorii communis, cerebri affectus. 4. de rat. vict. 23.

Aphorismus, quam nervosissimus sermo, & succincta oratio, quæ omnes rei proprietates brevissimis verbis circumscribit. 1. aph. 1. Quin & aphorismos definitiones appellat. 3. de his, quæ in medicina fiunt. 32.

Aphthæ,

Aphthæ, sunt ulcera, puerorum summam oris partem occupantia, ob summam molliem maximè facta earum partium, quæ neq; tactum, neq; qualitatem lactis sustinent, quod non parvam in se serosam cōtineant partem, 3. aph. 24. ex quo etiā habent aliquid igneæ caliditatis. 6. de compos. med. loc. cap. 4. & com. 3. in 3. de morb. vulg. 12.

Apices matricis, sunt processus quidam mamillares, utring, ad latera matricis, ad ilia inclinantes, à Grecis cornua matricis appellantur, per quæ cornua semen à propriis testiculis, vulva attrahit, ut virile per collum. l. de coecl. vulva. & l. 2. de semin.

Apios, cibus & potus est omnis qualitatis, quæ sensu deprehendi potest, expers, qui neq; adstrictionem, neq; acrimoniam, aut aliam insignem facultatem obrinet, qualis inter humidas substantias, est aqua. l. 1. de aliment. fac. 8.

Apnœa, i.e. ablata spiratio. l. 2. de rat. vict. 43.

Apoclastmata. Vide Abductiones.

Apocope. Vide Abscisio.

Apocrustica, i.e. reprimentia & repellentia medicamenta, quæ adstringendi vim obtinent. 11. meth. 15.

Apodacrytica, i.e. delacrimativa, & repercussoria lacrimarum. 4. de compos. medic. loc. cap. 5.

Apoplepsia. Vide Interceptiones venarum.

Apomeli, mellis decoctum intelligo, quod conficitur ex aceto cum melle commisto, tantisper tamen simul decocto, quoad utrorumq; qualitates inter se uniantur, & aceti vis retundatur. 3. fract. 49.

Aponeurosas, sunt tendones, quos muscoli generant, qui ad aruum fines pertinent. 3. aliment. fac. 5. Dicuntur autem Aponeuroses, quasi denervationes & nerveæ musculorum extremitates, l. de anat. adm. c. 5. quoniam muscoli in

in eos desinunt. 1. de motu muscul. c. 1. Vide Nervus, Tendonnes, Denervationes.

Apophlegmatismus, medicamentum, quod ore coluitur, aut dentibus manditur, cujusmodi pharmata omnia, unâ nomenclaturâ comprehendentes, apophlegmatizonta nominant, ac eorum facultates, apophlegmaticas. 5. de simpl. 20. Rectius autem Apophlegmatismus est medicamentum, quod pituitam per os ex capite, aut thorace educit. 6. de sanit. tuend. c. 10.

Apophthora. Vide Aborsus.

Apophysis, est extranea ossis pars, seu adnata, Latinis appendix. lib. de ossib. in proem.

Apoplexia, est ablatio sensus, & motus in toto animalis corpore. 3. de loc. aff. 10. & 2. aph. 42. Vide Caros, & Paraplegia.

Apoplecticæ venæ, aliis Sphagitides, & Jugulares externæ, seu superficiariæ, Arabibus Guidez manifestæ vocantur, sunt quæ infernè ad aures utring, singula feruntur, à quibus superficiaria fere omnes, cum collis, cum capitis partes nutriuntur. 6. de usu part. & initio secundi de rat. vict. Apoplecticæ vocantur, quod harum ex interceptione, & obstructione, apoplexia oriatur.

Aposcemata, i. e. humorum decubitus, vocantur, cum, qui prius unum membrum infestant humores, eo relicto, ad alterum transeunt. 2. ad Glau. 7.

Aposceparnismus, abscessio est ossis, cum ejus pars per vulnerantia decussa fuerit, fractura species. lib. finit. med.

Apositi, more antiquorum Græcorum, ii appellantur, qui appetentiâ carent. com. 3. in 3. de morb. vulg. 72.

Apositia. Vide Anorexia.

Apospasmata, avulsa omnia nominantur, lib. de constit.

lit. art. cap. 6. Quæ verò continui solutiones, apospasmata, i. e. avulsiones vocantur, instrumentariorum tantummodò partium propria sunt passionis. 1. de diff. morb. cap. 11. Vide Rhegma.

Aposphagma. Vide Unionis solutio.

Apostasis, generaliter loquendo, Galeno qualibet est continuitatis dissolutio: ita enim (ait Gal.) ego totum hoc genus soleo appellare; at Hippoc. abscedentia corpora, quæ ita affecta sunt, vocat, & affectionem ipsam, abscessionem nominat: tamen si una quædam species generis hujus sit, quam propriè abscessione, & abscessum, i. e. apostalin & apostema nuncupant. 3. de his, quæ in med. fiunt. initio. Apostasis, & Metastasis differunt, quod Apostasis, i. e. abscessus, judicatione infert, egrumq; à molestis omnibus liberat; Metastasis autem, i. e. commutatio, aliarum habet principium accessionum, ut & aliud exigat tempus ad coctionem mali, aliumq; corporis locum, ad quem instantium humorum facta est translatio. 4. de rat. vict. 68.

Apostema. Vide Apostasis.

Aposymata. Vide Abrasa.

Apothetrapia, nunc pro postrema parte omnis probe peractæ exercitationis sumitur, nunc pro ea Medicina parte, quæ lassitudinem, ex immodico exercitio obortam, submover. 3. de sanit. tuend. cap. 2.

Apothermus, Sapa, Siræon, Hepséma, nomina synonyma, significant mustum plurimum coctum. lib. 1. de alim. fac. cap. 13. de attenuante vict. rat. 12.

Appetitus caninus, vehemens est comedendi desiderium, quo & plurima edunt, & maxime gravati, assumpta inalterata paulò potè revomunt. 7. de compos. med. loc. c. 2. & 1. de sympt. caus. 7.

Appo-

Appositio, qua & **Adjunctio**, & **Prosthesis** dicitur, naturalis est actio, per quam, vi tractrice, attractum nutrimentum singulis partibus apponitur assimilandum. l. 3. de natur. fac. c. 1.

Apſychia, i.e. animi deliquium. comm. 2. in i. prorrh. 20. & 1. aph. 23.

Apryſtus, i.e. morbus sine ſputo, praesertim morbus lteralis, cum pars dolens exquisitè angusta, in se ipsa, universum fluxum cohibuerit, nec per ſputum sese exonerarit. 2. de crif. c. 10.

Aqua inter cutem, **Hydrops** species est prima. lib. 5. de loc. aff. 7. & 4. aph. 11.

Aqualiculus, qui & **Pubes**, & **Epifion** dicitur, est ea trunci pars, in quem thorax finitur, ubi & masculorum pudenda constituta sunt, quin & foeminarum, ad femoris utriusq; exortum, ut sub hoc occultentur. lib. Introd. c. 10.

Aqueus humor, qui & **Albugineus** dicitur. Vide **Crystallinus**.

Aquosa urina, qua & **cruda** dicitur, est ea, qua est alba, & tenuis. l. de crif. c. 5.

Aquosus hydrops, **Hydrops** species ea est, quam **Asciten** vocant, cujus proxima causa, aquosus humor est, partim à jecinore manans, partim à tota carne corporis, veluti in aquam resoluta: à quo aquoso humore totum abdomen distenditur, colligiturq; inter peritoneum & intestina, veluti in utre quodam, unde illi nomen dedit; opposita alteri **Hydrops** speciei, quam Hipp. vocat siccum **Hydropem**, qui & **Tympanias** dicitur. Vide **Ascites**, **Hydrops**.

Arachnoides pulsus, aranea speciem referens, sive aranealis, parvus est, ac brevis aura agitati movetur. lib. finit. med.

Aræo-

Aræotica, i.e. rarefacientia. 5. de simplic. cap. 14. Vide **Anastomatica**, & **Rarefacientia**.

Aranea tela, est oculi tunica, qua cum Rhetina, per se tam spheram efficit, circumdantem crystallinum humorem; diciturq; aranea, quia ad modum tela aranea subtilis est, ne impediat lumen ingrediens ad crystallinum & albugineum humorem. lib. de Anatom. viv. Vide **Rhagois**.

Arcuatus morbus. Vide **Arquatus**.

Ardens febris. Vide **Synocha**.

Aræa. Vide **Alopecia**.

Argemon, sive **Argemus**, est oculi hulusculi, quod in iridis circulo nascitur, partem aliquam candidi, partem etiam nigri comprehendens: quo vitio qui laborant, encephalius vocat Gal. lib. finit. med.

Argyrite, terra est, qua pluribus parvis terra particulis, plures parvas argenti mistas habet particulas. 9. simpl.

Ariditas, est summorum pilorum lanuginosa superficies, pulvere conspersis adsimilis. lib. finit. med.

Aritænoide, est cartilago laryngis, cum ordine, tum positione, tum magnitudine tertia, in suprema innominata cartilaginis parte sita, gutturnis, infundibulisq; quas Aritenas appellant, non ab similibus. lib. vocal. instr. diss. cap. 4. Unde aliqui eam Aritenam vocant, & guttalem. 7. de usu part. c. 11. Vide **Cricoide**.

Armatura conceptus, ab Arabibus **Abgas**, tunica est postrema tenuis, toti foetui undiq; circumjecta, ipsius velut sudorem excipiens; quasi agninum, à mollitie deducto nomine; **Amnion** Graecis appellata. 15. de usu part.

Arquatus morbus, qui & **Regius**, & **Icteros**, & **Auriginosus**, & **Arcuatus** dicitur, est bilis in summam totius corporis habitus cutim effusio, cum febre acuta, cum inte-

interiorum adustione, & stomachi vitio. lib. Introd. & 5. de loc. aff. 7. ubi paulo clarius loquens ait. flava bilis, quando servans naturam, una cum sanguine per totum corpus deferatur, morbum facit, qui Icterus, i. e. Regius appellatur. sincera verò, & ab aliis succis quando secreta in aliquo membro consistit, herpetem concitat. 2. ad Glau. 1.

Arteria, est commune vas, ortum habens à corde, concavum, ut per ejus concavitatem, spiritus vitalis ad omnes corporis partes deferatur. lib. de anat. viv. Differt autem à vena, quod vena sit vas sanguinem continens, nec pulsans; sed arteria vas est pulsans. lib. de caus. morb. cap. 3. Quondam nec-dum eas, quæ similiter ut cor pulsant, arterias, (in solam eam, quæ ex pulmone in laryngem emergit arteriam, arteria nomen inferentes) sed venas appellabāt, in totum velut alias, quæ non pulsant, sic etiam pulsantes, postea verò consuetudine obtinente, arteria appellationem vasibus pulsantibus solis propter equivocationem tribuere, aspera nomen addentes; illi, quæ ex larynge in pulmonem descendit, arteria, asperam arteriam appellāunt, quam ipsam etiam Bronchum vocant; quoniam cartilaginosa corpuscula, quæ plurima ejus pars sunt, Bronchia appellāt. 7. de compos. med. loc. cap. 1. Aspera autem arteria dicitur, quæ in pulmones divisa sunt; quæ verò toto insunt corpore, quæq; ex asperis arteriis contracto corde, spiritum transsumunt, læves. 7. de anat. adm. 4. & 7. de usu part. c. 9. Vide Alpera arteria.

Arteria crassa. Vide Arteria aorta.

Arteria magna. Vide Arteria aorta.

Arteria aorta, magna, maxima, crassa, synonyma sunt, significantia unum omnium arteriarum tanquam caudicem, à sinistro cordis ventriculo propagatum, quæ omnes

omnes tūm sibi invicem, tūm eorum pulsandi modo respondent. 7. de anat. adm. c. 1.

Arteria venosa, est vas, à sinistro cordis ventriculo ad pulmonē procedens quod arteria vocatur, quia pulsat: venosa autem, quia vena tunicā vestitur: quæ verò ex dextro cordis ventriculo oborta est, vena arteriosa dicitur; vena quidem, ab usu; arteriosa autem, quoniam arteria corpus est duplici rectum tunicā. 7. de anat. adm. c. 4.

Arteriæ emulgentes, sunt duæ propagines magnæ, à maxima arteria, quæ spina incumbit, profectæ, non aliter, quam duæ vena magnæ, quæ in renes inferuntur, & quibus renes, urinam a sanguine secernunt & trahunt, venæ emulgentes appellantur. lib. de dissect. ven. 5. 14. & 16. de usu part.

Arteria aspera. Vide Arteria.

Arteriæ carotides, quæ & soporariæ, & apoplecticæ, & subjectæ dicuntur, sunt, quæ infernè, à corde, ad jugulum, recta tendunt, atq; ad partes collo superiores distribuuntur. de dissect. art. & 16. de usu part.

Arteriæ læves. Vide Arteria.

Arteriam conjugem vocant, non eam arteriam, quæ vena est per membranas conjuncta, sed eam, quæ alteri, ad eundem usum comparata vena, aut arteria, adjuncta est. 16. de usu part. cap. 13. Nusquam enim vena ab arteria relinquitur, sed ubi vas arteriosum videris, ibi necesse est venam etiam esse. 16. de usu part. cap. 14. & 16.

Arteriæ, & Venæ umbilicales sunt, quæ acerbulis uteri adhaerescunt, quibus fœtus in utero alligatur, & alimentum trahit. 14. & 15. de usu part.

Arteriaca præsidia, i. e. arteria pharmaca, quidam Eclecta nominant pharmaca; alii penitus nullum disci-

men ipsis adscripserunt; aliqui verò rard addiderunt; alii ad vocem interceptam; alii adhuc generalius ad vocem lasam; sunt qui & ad exasperatam arteriam, & ad exulceratam eandem, huiusmodi accommodata esse scribant. 7. de comp. med. loc. cap. 1.

Arteria trachea. Vide Aspera arteria.

Arteria coronalis. Vide Stephanicea.

Arteriosa vena. Vide Arteria venosa.

Arthritis, sive morbus articularis, & artuum vitium, 11. meth. 20. Sunt & ex genere Arthritis, Ischias, & Podagra. Quod enim in omnibus articulis, Arthritis est, hoc in uno, juxta coxendicum quidem, Ischiada, h. e. coxendicum morbum appellant, juxta pedem autem, Podagram. 10. de comp. med. loc. cap. 2. Unde Arthriticos vocant, qui hoc articulari vitio laborant. 11. meth. 20.

Arthrodia, per oppositam sibi articulationis speciem, Enarthrosin, clarius intelligitur; utraq; enim est species Diarthroseos, i. e. de articulatione: sed Enarthrosis est, cum excipiens cavum, admodum altum est, caputq;, quod in id inferitur, oblongum; Arthrodia verò, quæ cavum leve, superficiali, capitulumq;, depressum habet. lib. de ossib. in proem.

Articulus, est naturalis ossium compositio, vel per diarthrosin, i. e. de articulatione, quæ est ossium structura, quorum motus est evidens; vel per synarthrosin, quæ est ossium manifestum motum non habentium compositio. lib. de ossib. in proem. Sed rectius: Articulus est, cum duo ossa ita invicem cœunt, ut alterum quidem ipsorum sit, quod movetur, alterum, velut sedes quadam, ei, quod movetur, & firmamentum, ut in ostiorum cardinibus apparet; unde manenti, cavitatis, (quæ glene, i. e. pupilla, & Coryle) ei, quod

quod movetur, convexitas (quæ Condylus dicitur) inest. 1. de motu muscul. cap. 9.

Articularis morbus. Vide Arthritis.

Artomel, i. e. jusculum ex pane & melle. 10. meth. 6.

Artus, extrema & compositissima corporis partes sunt; crura scilicet, pedes, & manus.

Arythmus, pulsus est, non is, qui absolutam abolitionem significat, omniq; rythmo orbatu est, sed is, qui nativo rythmo caret: cui opponitur pulsus, qui Eurythmus dicitur. 1. de differ. puls. cap. 9.

Asaphya, est vocis obscuritas, vel propter vocem efformantium organorum offensam, (quam ex nervorum vitio contraxerunt) vel propter mentis lationem. comm. 2. in 1. prorrhet. 3.

Ascarides, & Elminthes, sunt tenues lumbrici, in parte præcipue inferiore, crassi intestini progeniti, rotundi verò sive teretes lumbrici, sunt vermes, qui in superioribus magis intestinis generantur, adeo ut ad ipsum quoq; ventriculum quandoq; ascendunt; latus est, qui & longissimus est, & per tota sæpe extenditur intestina. 3. aph. 26.

Ascensus morbi, augmentum, incrementum, synonyma sunt, significantia totius morbi, sive paroxysmi secundum tempus. 1. de cris. 3. ait. Ubicunq; accenditur atq; augetur caliditas præter naturam, istuc ab aliis partibus sanguinem solere confluere, quo verò tempore confluit, illas quidem partes mandantes, refrigerari, privatas sanguine, est necessarium; quod verò patitur membrum gravari, ac distendi, & sanguinem ipsum confluentem alterari, tum quia aliis, quæ jam putruerunt, superfluitatibus permiscetur, tum quia intrusum diffilari non potest; atq; hoc tempus accessionis principium nuncupatur. Cum verò jam cæ-

linitas materiam convicerit, tunc hoc tempus & ascensus, & augmentum vocatur: in hoc verò usque adeo calor augetur, ut non modò locum exurat, qui est quodammodò putredinis focus, sed etiam continuatim per totum corpus dispergatur, ac cùm jam ad summum fervoris devenerint humores accensi, id accessionis tempus Consistentia appellatur; tunc verò universum laborantis corpus, igneum videtur, extensà per totum corpus aqualiter caliditate. l. 2. de differ. febr. 11. 12.

Afcia, est revolutio fascia, quæ cùm paràm à recto declinet, in obliquum tamè non dum vergit insigniter; à fabricorum afcia, quæ paululùm à recto abiens, in summitate decurvat, sic dicta. 3. de fract. 21.

Afcites, Hydropis species est, in qua in membrana abdominis interiore, peritoneo Græcè dicta, aut potius inter peritoneum & omentum, humor aquosus, veluti in utre quodam, continetur; undè eam vocat Hipp. aquosum Hydropem. Contrà Tympanias, (quam siccum Hydropem vocat) est, in qua abdomen percussum, talem sonum edit, qualè percussa tympana, quoniam in his per cutem extensam, subjectus aer percutitur, quemadmodum aer in hoc morbi genere, qui in profundo abdominis conclusus coërcetur. 4. aph. 11. Afcitem etiam urricularum Hydropem vocant, lib. finit. med.

Afelloe. Vide Axes.

Afema crisis est, quæcumq; à nullo dierum indicantiū antea fuerit indicata, undè sine signo dicitur, 3. de cris. 10.

Afitia, i.e. ciborum abstinentia, aliquando etiam vasorum inanitio, nomine generis, afitia dicitur. 2. de rat. vi<. 47.

Alpera arteria, est arteriarum in animalis corpore alia-

aliarum omnium durissima, solo osse mollior, quam Græci χόνδρον, i.e. cartilaginem vocat, quam ipsam rat. Natura in exactam circuli circumferentiam cōtorfit, circulorum, multà serie, continuà longitudine compositorum, à pharynge ad pulmonem usq; pertingens, sanguine vacua. 7. de usu part. cap. 3. Eademq; prout corpus est ex cartilaginibus (ut instrumentis vocis) & ex vinculis membranosis (ut instrumentis respirationis) compositum, trachea arteria dicitur, ibid. cap. 6. quam Bronchon nominant. ibid. cap. 11. Alperæ arteriæ etiam dicuntur, cùm eversa sanguinolentiores apparēt, & magis aspera carnosaq; & sicut acinis similes, lib. Introd. cap. 13.

Asphyxia, i.e. pulsus privatio, cùm non percipitur nostro tactu motus, atq; hoc per totum animal accidat, ut nulla usquam arteria moveri videatur, quod tamen, si ad veritatem exigas, in corpus vivum nunquam cadit, i. de prasag. ex puls. cap. 3. quam Hipp. vocat spirituum interceptionem, 4. de rat. vi<. 26.

Aspreo oculi, est durities & asperitas inæqualis, quæ intra genas oritur. lib. finit. med.

Asia, i.e. stomachi fastidium & nausea. 4. de san. tuend. cap. 4.

Asidentia signa, quæ & mox apparentia, Græcis οὐκ ἀσθενήσασα dicuntur, distinguuntur à pathognomonicis, seu passionem infallibiliter & firmissimè significativis signis: exemplo morbi lateralis, in quo acuta febris spirandi difficultas, tussis, pungens dolor lateris, passionis significativa sunt: quod autem dolor ad hypochondrium, aut ad clavim perveniat, aut quod facilius in latus patiens, quàm in alterum, eger decumbat, asidentia signa sunt. 1. aph. 12.

Assimilatio, & assimilatrix facultas, est, quæ ab

actione ipsa, generaliter alteratrix, in specie verò assimilatix dicitur, quâ id, quod nutrit, alteratur, & ei, quod nutritur, simile fit. 3. de nat. fac. cap. 1. Naturalium actionum prima, ac propemodum maximè necessaria, nutritio est, quæ alteratricis actionis quadam est species; est enim & concoctio, quæ in ventre peragitur, alteratio, non secus autem & quæ in venis: quibus accedit ea, quæ in quaq; est particula. Hisce aliqui addunt quartam, quam assimilationem vocant, nomine quidem a nutritione disidens, re autem non disidens. 3. de caus. sympt. c. 2.

Afsistentes, sive Astites glandulosi. Vide Glandulosi.

Asthma, i.e. anhelatio, affectus est, in quo propter angustiam, organorû spiritus & bronchiorum oppilationem summe usq; ad opera scoptula & scapulas thorax, citra febrem, motu celeri denso movetur; uti etiam in us, qui velociter cucurrerunt, quiq; respirando, pinnas narium movent, quas in spirando contrahunt, exspirando dilatant. com. 2. in 3. de morb. vulg. 4. Vide Anhelosi.

Astites. Vide Glandulosi afsistentes, & Parastatæ.

Astragalus, i.e. talus, (os ballista vulgò) 3. de usu part. cap. 6. est principalissimum osium, quæ ad pedes movendos pertinent, in circumferentias quasdam desinens, magnum quidem & maximis superius osibus dearticulatum, in medio tibia & calcanei locatum. ibid. cap. 8. Est & Astragalus furicellus exiguus. 6. de simpl. med. fac.

Astrictio, est densitas cutis, & necessariorum excrementorum suppressio. ad Thrasib. cap. 27.

Ataxia, & Acoſmia, est ordo decretorius, dierum sebrilium, perturbatus, & interruptus. 3. progn. 7.

Ater

Ater succus, est melancholia, quartus naturalis humor, frigidus & siccus, sanguinis limus velut & sæx, quem humore, cum ex unctione ac putrescentia acidam & radentem qualitatem contraxit, atram bilem nuncupant, sive radentem. 2. de nat. fac. c. 9. Vide Acida bilis, & Melancholicus humor.

Athera. Vide Atheromata.

Atheromata, Steatomata, & Melicerides, alii quidem inter abscessus reponunt, alii verò ad aliud genus referunt; omnes tamen tumores præter naturam sunt, quorum natura ex ipsis nominibus patet; pulicula enim quid simile in ipsis atheromatibus invenitur, melli verò in ipsis meliceridibus, sævo autem in ipsis steatomatibus. lib. de tum. c. 5. Ipsum verò atheroma Græci ἀθήρω vocant. 14. meth. c. 14.

Athymia, i.e. animi dejectio. 6. de loc. aff. c. 1.

Atra bilis. Vide Acida bilis, & Ater succus.

Athroos, est secretio & alteratio p. n. subito facta, violenta, dolorosa, in ipso dividendum genere, videturq; in omnibus sensibus, ex secretionem, ac divisionem, continui uniusq; corporis, cum sensoria, vel universa, vel magnis portionibus, & celeriter (quod Græci ἀθροῶς vocant) dividuntur, aut alias affatim corruptivè alterantur, dolor excitari. 1. de sympt. caus. c. 6.

Atrophia est, cum partes corporis vel diminutè alimentum attrahunt, vel non trahunt, vel perperam trahunt, unde corpus non nutritur, sive id quidem, quod nutrit, & quantum & quale esse oportet, suppeditetur, sive non. Caterùm, symptoma aliquod in retentrice facultate incidit simile his, quæ in ventre sunt dicta, quod nutritionem tollit. Atrophia quoq; excreticis vitio accidit, cum plus, quam opus est, vacuatur. de sympt. differ. c. 4. & 1. meth. 9.

C 4

Est adhuc Atrophia quædam in oculo, cum ex longa imbecillitate, vel aliâ quâdam latente causa, paululum quasi propulsus, deinde cavatus ad radicem, cum dolore minor evadit, obscuréq³, aut nihil omnino, videt. lib. Introd. c. 15.

Atrophusæ, i.e. corporis particula, quæ ex nutrimento fructum non sentiunt. 2. meth. c. 7.

Attonitus morbus, i.e. Apoplexia. 2. aph. 19. quem & morbum stupidum vocant, 8. de placit. c. 6.

Attrahens virtus est, quæ peculiares & familiares parti succos, alendi ipsam gratiâ, & appetere, & attrahere potest; altera, quæ generatim alteratrix dicitur, quâ succus attractus similis evadit parti, quæ alitur, quæ ipsa membratim in hepate, sanguificativa dicitur: Retentrix, quâ pars attractum succum retinet, donec in suam ipsius naturam eum mutaverit: Expultrix, quæ a concoctis, quod inutile est, secernit, idq³ excrementum vocatur, 5. de loc. aff. cap. 7.

Attrahens, sive Attrahentia, sive Epispastica facultas est, quæ ex alto vehementius attrahit, propter essentiam calidam, & tenuium partium, sive talis essentia sponte nata sit, sive ex putrefactione acescente generationem sortita, directe opposita est repercutienti & adstringenti virtuti, quæ, in altum, occurrentes sibi succos repellit. 5. de simpl. cap. 17.

Auditorius meatus, est rotundum foramen, quod ad aures pertinens, non solum usq³ ad cerebri membranam pertinet, sed etiam nervum auditorium contingit, qui in ipsum à cerebro descendit, 6. meth. 6. quod & cæcum foramen dicitur, lib. de nervor. dissect. cap. 6. Græcè τρυπαν. Vide Aures.

Auditus gravitas. Vide Obauditus.

Augment-

Augmentum morbi. Vide Ascensus.

Aures, quæ frons ad tempora porrigitur, in ipsius terminis sitæ sunt; quarum pars aperta Ala dicitur, resicta ab interiori, in posterius, ipsis summitatibus inflexis, Cubiformis, sub qua femicirculus rotundus, in mucronem exsurgens, Græcè ὠτὴς appellatur, hujus acumini concavum quod subjacet, Conchula, in cujus medio quod conspicitur rotundum foramen, meatus auditorius nuncupatur. lib. Introd. cap. 10.

Aures cordis, sunt duo sinu cordis, concavi, nigriores, nervosiores & magis cuticulares, membranosioreq³, corde, in utraq³ hujus parte, sinistra & dexterâ collocata, ad similitudinem aurium. 7. de anatom. adm. c. 9. Nominata autem porro ita sunt, non ab utilitate, aut actione aliquâ, sed à parva similitudine, quod uring³ cordi ipsi, ut Animalis capiri, aures adiaceant. 6. de usu part. c. 15.

Aurigo, & Auriginosus. Vide Arquatus.

Autopsia, est eorum observatio & memoria, quæ proprio intuitu unusquisq³ inspexit. de part. art. med. cap. 2.

Autopyrus, qui & Syncomistus dicitur, panis genus est, quod ex farinâ universâ comportata, confusa veluti & permistâ, non discussus furfuribus, constat. lib. de ren. aff. dignor. cap. 6. Syncomistum panem vocant, qui mediùs est inter exquisitè purum, & furfuraceum. Vocat autem nonnulli eundem panem Autopyrum, quoniam ad puri panis confectionem, farinam, non qualis naturâ est, talem ad conficiendum panem assumunt, sed prius purgantes furfur excernunt; contrâ autè in furfuraceo prius adimunt eam farinâ partem, quæ purissima est: panis autem, qui Autopyrus appellatur, qualem habet ex natura farinâ, triticum, talem etiam servat. 2. ad Glauc. 7.

C 5

Avulsa. Vide Avulsio, & Apospasmata.

Avulio est, cum ossa, quæ membrum colligant, divulsa dicuntur. *com. 3. in lib. Hippoc. de his, quæ in medic. fiunt. 37. Vide Unionis solutio.*

Axes ipsas, Asinos appellare consuevit Hippocrates; & parvos axes, Asellos, quas etiam Succulas vocat. *2. fract. 48.*

Axillaris vena est, quæ per axillam percurrens, major humerali, per totum brachium in ramos scinditur duos, superiorem, inferiorem, externum, internum, ille vena hepatica, *3. de anat. adm. cap. 5. hic subalaris, basilica, & vena cubiti interna appellatur, lib. de anat. viv. & contra Erasistr. cap. 6.*

Axiomata; propositiones indemonstrabiles vocant. *1. meth. 4.*

Axungiam, omnes soliti sunt vocare adipem suillum veterem. *1. de comp. med. per gen. cap. 4. Vide Adeps.*

Azygos vena, est propago, ex vena cava superiori trunco exorients, parte dextra, & octo costis inferioribus inserta, quam sub corde oriri semper a se observatum fuisse testatur Gal. *1. 5. de loc. aff. 2. & initio secundi de vict. rat. & 3. de usu part. in iis videlicet corporibus, in quibus thorax longior erat; nostro vero seculo, propter thoracis brevitatem, supra cor, & pericardium exoritur, ad quintam pleurung, thoracis vertebra, & per ejusdem ramulorum orificia aperta, materia pleuritica inter pleuram, & pleuram effunditur.*

Azymus panis, i. e. fermenti expers. *1. de alim. facult. cap. 2.*

B

BALLISTÆ OS. Vide Astragalus.

Barycoia, sive Obauditus, sive Obauditio, est audi-

auditus gravitas & difficultas, proportionem respondens Amblyopia, quæ est visus heberudo, sive diminuta visio. *1. de caus. sympr. cap. 4.*

Basilare os, quod & os palati, os Cunei, os Sphe-nois dicitur, est os, quod toti calvarie substernitur, quod nonnullis inter capitis, ab aliis inter maxilla superioris ossa (cum inter utrumque sit medium) numeratur. *cap. 1. lib. de ossib. & in fine lib. 11. de usu part.*

Basilica vena. Vide Axillaris.

Basis cordis, quam alii caput visceris appellant, est vertex cordis, figurâ turbinata, *7. de anat. adm. 6. 3. quam & mucronem appellant, 2. de placit. 6. 4.*

Bathmides, sunt brachii concavitates, in quas extendentibus totam manum, & flectentibus, cubiti ipsius coronæ ingrediuntur, *2. de usu part. cap. 15. Alibi inquit: Bathmides sunt bases quedam, & sinus, in brachii sive humeri osse, utring, singula, in quas, quum extenditur flectiturq, tota manus, ipsius ulna, coronæ sive processus ingrediuntur.*

Bechica medicamenta sunt, quæ tuſsim sedant, & expectorant. *1. de simpl. 6. 1.*

Belenoides os. Vide Graphoides, & Lithoides.

Beneolentia dicuntur, quorum vapores, à corporibus defluentes, ambienti permisti, ac per nares inter inspirandum in cerebrum delati, familiares sunt cerebri naturæ, & animalibus spiritibus, proportionem quâdam iis respondentem, quæ lingua sunt dulcia. *4. de simpl. 22.*

Berenicium, est nitrum, vel spuma nitri. *6. de compos. med. loc. 6. 1.*

Bilis, simpliciter si proferatur, sive biliosus humor, audimus pallidam & amaram, non acidam & nigram; hanc enim semper cum adjectione nominamus, ibi e contra appel-

appellatione solâ bilis, humoris colorem annuentes. lib. de tumor. cap. 9. Bilis appellatio per se sola flavam & amarâ significat, sed cum adiectione, Bilis atra, humorum melancholicum. 7. aph. 32. & 1. de nat. hum. 27. & corn. 5. in 6. de morb. vulg. 14.

Bilis acida. Vide Acida bilis.

Bilis æruginosa. Vide Bilis pallida.

Bilis amara. Vide Bilis.

Bilis atra. Vide Bilis.

Bilis flava. Vide Bilis pallida.

Bilis Isarodes. Vide Bilis pallida.

Bilis nigra. Vide Nigra bilis.

Bilis pallida est, quæ ex bili sincera, & tenui aquosa, serosaq; humiditate (quæ ex urina etiâ sudorq; provenit) constat. Flava verò, quæ & Vitellina dicitur, colore pallidior, tenui humiditate constans, sed crassiori quàm pallida, crudo vitello ovorum & colore & consistentiâ simili, in vasis genita. Porracea verò in ventriculo genita, porrorum colori similis: Aeruginosa, quæ ærugini assimilatur: Isarodes autem bilis, quæ ab Isatide, cæsium colorem referente, dicta est. Sic etiam & Rubram nonnulli bilem nominarunt, quæ consistentiâ ad tenuem sanguinem proximè accedit, sed quoniam non concrevit, idcirco bilem eam nominant, lib. de atra bile, cap. 2.

Bilis porracea. Vide Bilis pallida.

Bilis radens. Vide Acida bilis.

Bilis rubra. Vide Bilis pallida.

Bilis vitellina. Vide Bilis pallida.

Bis feriens pulsus. Vide Dicrotus pulsus.

Blæsum corpus est, cuius pectus pronum, in partem anteriorem redditur; Rhæbum autem, cum posteriore

partem

partes, quæ ad spinam pertinent, gibba redduntur. lib. de caus. morb. cap. 7.

Blena, sive mucus, est humor per palatum & nares defluens, concoctus, adeoq; crassior, minuscq; acris, & mordax, propterea & crassior pituita ab Hippocr. vocatur, lib. de totius morb. temper. cap. 3. & 2. de semin. cap. 6. Vide Phlegma.

Boriborgmos, est sonus, vel murmur, in crasis intestinis factum à flatibus, cum excrementis sunt vacua, humidum excrementum denunciâns. 3. de symptom. caus. cap. 2. Vide Physis.

Bochor. Vide Exanthemata.

Bothria. Vide Phathnia.

Bothrion, propriè scrobs, sive parva fovea, unde ductâ similitudine, dentis alveolus & sinus, in quem ille reconditur, sic vocatur. Quin & Bôθειον est ulcus cavum oculi, tunica cornea, parvum, angustum, puncturis rotundis simile, ulcusculo alius. lib. Introd. cap. 15.

Brachiale, quod Græci ραχίον dicunt, Arabibus Rasietra, est prima pars palme manus, octo constans ossibus, in superficie leniter gibbis, sinuatis intrinsecus, lib. de ossib. c. 18. cuius inferior pars quatuor ossibus (quæ quasi postbrachiale, vel metacarpium dixerit) colligatur. ibid. cap. 16.

Brachichronius. Vide Polychronius.

Brachium, totius manus pars maxima, cuius termini infernè, sunt articulus, qui in curvatura cubiti est, quem Anchona, sive Cubitum, cui innitimur, vocamus; supernè autem rursus, humeri articulus. lib. 2. de motu musc. cap. 2. Brachium insuper appellatur, quod inter duas juncturas humeri & cubiti intercedit, totius brachii pars; Superhumeralis verò, i. e. Epomis, superior humeri pars est, quæ ad

ad collum vergit. Nam humerus, totum id, quod in dearticulatione hac apparet, vocatur; quod autē non apparet, & posteriori parte, est os scapula, ab inferiori est id, quod, dum totum brachium attollitur, manifestum fit, & Ala nominatur. 1. de artic. 4.

Bradypepsia. Vide Concoctio.

Branchus, aliās Raucedo, Destillatio, & Coryza. 5. de sanit. tuend. cap. 8. Qualis in ventge, diarrhoea, passio, ex mala concoctione, fit, tale παχύμα est in cerebro catarrhus & coryza. Catarrhus scilicet est, cum, quod supervacuum est, in os diffluit; Coryza, cum in nares; Branchos autem, sive raucitas catarrhis superveniens, fit faucibus humore imbutis. Quod si in Gargarionem fluxio procumbit, aut (quam ex similitudine Graci γαργαλις, i.e. acinum vocant) in uvulam, hanc in tumorem attollit; at si in glandulas, quae sibi ex adverso, in oris termino utringque jacent, Antiadas; si autem in ea, quae iis proxima sunt, humorum fiat decubitus, oriuntur Paristhmia. 3. de sympt. caus. cap. 4.

Bregmata, Latinis synciput, sunt duo syncipitis ossa, utringque quatuor rectis lineis circumscripta, una quidem per suturam in longum porrectam, sagittalem, utringque ossi communem, posterius autem lambdoidis sutura lateribus, anterieus vero coronaria vocata, utringque autem parte, squamosis commissuris determinantur. comment. 3. in 6. de morbis vulgar. 1. ubi inquit, Bregmata, vulgo parietalia ossa appellantur. Vide Pregmatitis ossa.

Brevis pulsus. Vide Pulsus latus.

Bronchia, sunt aspera arteriae cartilagines, litere & figuram referentes. 4. loc. aff. c. 8. Vide Arteria.

Bron-

Bronchocele, i.e. gutturis tumor. 2. de comp. med. loc. cap. 17.

Bronchon, i.e. trachea arteria. 7. de usu part. cap. 11. Vide Aspera arteria.

Bubo, est tumor, praeter naturam, in collo, secus aures, vel in inguinibus, emissariis veluti communibusque, quibus in collo, capite, vel aliquā vicinā parte, vel prope magnam arteriam aut cavam venam, ulcus est natū, aut quae aliās naturae insensis plurimisque scarent superfluitatibus, obortus. 13. herb. cap. 5. Vide Struma.

Bubonecele, est tumor mollis, in inguine factus, peritonaeo plus nimis dilatato, vulnerato, aut rupto, & postea non conglutinato, diciturque ramex in inguine: quod si umbilico hoc accidat, dicitur Exomphalos. lib. de tumor. cap. 16.

Bulimos, est vehemens esuricio, ex indigentia simul, imbecillitate, & refrigeratione oris ventriculi, orta. 1. de caus. sympt. cap. 7. Dissert autem Bulimos à canina appetentia, quod ille sit casus potentiae naturalis appetitivae, tractricis & concoctricis, ex frigida exteriorē, qui à fame quidem inchoavit, sed non habet eam amplius adiunctam; Caninus autem appetitus fieri consuevit, vel propter solam intemperaturam frigidiorē, vel propter humores melancholicos, acidos, lancinantes, & venarum sudioni similem sensum inferentes, quos exorbuat os ventriculi. 2. aph. 21.

Bulla, i.e. pustula oculis nata. 9. de simplic. med. fac.

Bursa testium, est communis tunicarum, utringque testem cooperientium, rugosus sinus, utringque testiculo circumdatus, Oscheon Gracis, Latinis Scortum, aliis Scrotum dicitur. lib. de dissect. vulva. & in Introd.

C CA-

CACHEXIA, pravus corporis habitus est. 1. meth. 9. Inde Cachecticus, i.e. mali habitus homo. lib. de cur. rat. per sang. c. 19. Vide Habitus.

Cacochymia, vitiosorum succorum est redundancia. Vide Plethora.

Cacoëthe ulcera, ex dyspepularis clarius intelliguntur, quæ enim ex humorum confluxu, vel multorum, vel acrimuruntur, ita, ut locus affectus talem dispositionem, quæ id, quod influit, bonum sit licet, tamen ipsum corrumpat, non habeat, Dyspepula nomina: quæ verò dictam dispositionem jam obtinent, præcipuo vocabulo cacoëthe, i.e. maligna, appello. 1. de compos. med. per gen. cap. 18. Sed generalius: Quæ ulcera omnibus vitè decenterq; factis non sanantur, ea Medici cacoëthe, i.e. maligna, contumacia, rebelliaq; dicimus. 4. meth. 5. Adhuc generalius: Cacoëthes morbos, i.e. malignos appellamus, quicunq; periculum minantes, spem salutis interim non adimunt; nam quod summè perniciosum existit symptoma, non cacoëthe, sed mortiferum dicitur. com. 1. in 1. prorrh. 14.

Cacophonia, i.e. vitiosa vox. lib. de symptom. differ. cap. 3.

Cacosphyxia, i.e. vitiosus pulsus. ibid. c. 4.

Cacotrophia, i.e. vitiosa nutritio. ibid.

Calchoidea ossa, sunt tria ossa parva circa calcaneum posita, quæ certis nominibus carent, inferiori naviformis ossi per synarthrosin copulata, cum quibus etiam exterior ex parte, Cyboides pariter connectitur. 3. de usu part. & de ossib. c. 24.

Calcaneus, seu os calcis, quod Græci Pterion vocant, maximum & principalissimum est pedis os, ad firm. ratione per-

perinens, quod Astragalo subest. 3. de usu part. & lib. de ossib. cap. 2. 4. 6.

Calcis os. Vide Calcaneus.

Calculus, sive calculosus inorbus est, ubi in renibus ex collecta crassorum humorum copia, à calore immoderato calculi generantur. lib. finit. med.

Calefcere, & Calefactum esse, non parùm refert dicere, exemplo lebetis, & aqua calida: Fervens enim aqua, in frigidum lebetem injecta, vel Fervens lebes aquam frigidam excipiens, illic quidem aqua calefacta est, & lebes calefit, juxta Typum putridarum febrium, hic lebes calefactus, aqua calefit, ad morem febrium hecticarum. lib. 1. de differ. febr. c. 1.

Calidum, hoc ipsum verbum aliquando transferimus ad qualitatem, cujus proprium nomen est caliditas, aliquando denominativè totum corpus dicimus calidum, à caliditate; estq; hic modus loquendi plurimus in omni vitæ. 1. aph. 14. Communiter Hipp. à qualitatibus nominat elementa: Calidum E. G. appellat, neq; solam qualitatem, neq; quod ab ejus exuperantia dicitur, sed τὸ πᾶν τοῦ βίου & βιούτου, corpus, quod summam participat qualitatem, ut Ignem. 1. de element. cap. 8.

Callicreon, sive Pancreon, caro glandulosa est, substrata arteriis, venisq; ventriculi, quæ eâ parte in ramos capillares finduntur. lib. de ven. & artic. dissect. cap. 1. Vide Pancreas.

Callosum corpus, i. e. calli naturam referens, regio quadam in cerebro est, in quâ naturalis concavitas esse videtur, quæ ex superjacentibus, & circumdati corporibus, portionem alimenti non perfectè elaborati (peritroma, sive recrementum vocant) recipit, 9. de anatom. adm. cap. 3.

quod recrementum ab Aristotele excrementum dicitur, lib. de instrum. odor.

Callus, idem quod Clavus, Græc. κῶλ & 6. simpliciter. Dicitur etiam Tophus, ex crudo humore, qui crassus est, ad similitudinem puris crassioris. 10. de comp. med. loc. c. 2. Vide Myrmeciae, & Tylosis.

Calvaria, sive cranium, os capitis appellatur, lib. de osib. cap. 1. Vide Cranium.

Calvata, ferramenta appellat Hippoc. quæ rotunditatem quandam levem in extremis partibus habent, cuiusmodi sunt specillorum capitula, & quæ Nucleata appellantur, & spatularia. Oblonga verò his contraria nuncupantur, quorum extrema minime sunt rotunda, sed mucronata, ad suffusionem & cataractam punctione tollendam accommodata instrumenta quodammodo similia. lib. 1. de artic. cap. 43.

Calvities, est capillorum defluvium, propter humorum, ex quibus nutriri consueverunt, inopiam; si verò propter eorundem humorum vitium, corrumpantur, & cadant, non Calvities, sed Alopecia, Area, & Ophiasis dicitur. 1. de comp. med. loc. cap. 2. Vide Madarosis. Capitis sane cutis, pueris, mulieribus, & eunuchis humida est, sed calvis immodicè arida, cerebrum in juvenibus molle cum sit atq; humidum, calvariam tangere, omnemq; interiorem mantentiam complere, in senibus verò siccescens subsidensq; à calvaria distare, sapius in animalium dissectionibus conspicimus, in quibus calvescentibus syncipitis ossa fistulosa alia, & molliora ac superincumbentia ob cerebri (cum ad ipsa usq; non pertingat, neq; ea attingere possit, subsidet enim, in suamq; ac ipsius basin depressum cadit) distantiam, exarescunt, & consequenter, osibus istis resiccat. & ipsi

ipsis obtenta cutis inarescit, atq; ipsi sensui valde sicca, in calvis apparet, ut rationali demonstratione non egeat. com. 3. in 6. de morb. vulg. 2.

Calx, est totius pedis posterior pars. lib. Introd. cap. 10. Clarius in lib. de osib. c. 25. ait, Calx est os pedis maximum, osi scaphoidi subjectum, quod & rotundas ex talo partes recipit, & geminos, quos habet, processus in sinum ejus inserit, parte, quâ ingredimur, leviter rotundâ, & latiusculâ.

Camarion, sive Plallioides corpus, est pars cerebri, quæ supra communem cavitatem (quæ cerebrum cerebello suâ perforatione committitur) velut domus tectum quoddam in sphaera superficiem concavam circumactum, ad similitudinem testudinis, & fornicum, quibus archu ectorum utuntur. 8. de usu part. cap. 11. Vide Fornices.

Camarosis, est osis perrupio, cum ex alterutrâ refectum parte, similem camera figuram acceperit. lib. finit. med. Unde recentiorum nonnulli vehementissimas fracturas, Camaromata, & Engosomata vocant: Engosomata quidem, quæ in medio sui membrana innituntur; Camaromata verò, quæ eandem ipsam partem exaltatam habent. Caterum, quâ primum ab integris fractura partibus, diduci agra capere, intrò magis recedunt, ac membrana innituntur. 6. meth. 6.

Camisia fœtus. Vide Chorion.

Campylon. Vide Helosis.

Cancer, est tumor præter naturam, fuscus & lividi coloris, in quo venula quedâ exaltata primò occulta, (quando & Cancrum latentem vocant, lib. de atrab. cap. 4.) deinde manifesta, à crasso & nigriore sanguine, faci vini assimilata, sunt oppleta, canceri effigiem exhibens. 14. meth. 9.

Canina cupiditas, est prava dispositio oris ventriculi

superioris, multa impetuosè ingredientis, nec potentis deydæatorum pondus sustinere, sed eadem inalterata supernè, vel infernè excernentis, similis renum diabetica passioni, ubi tanta serosa humiditatis cupiditas adest cum virium imbecillitate, ut & humiditatem affatim attrahere, ac eam deinde in vesicam confestim renes impellere coguntur. 6. loc. aff. 3. Vide Bulimos.

Canini dentes, quos Græci *κυνόδοξας* vocant, sunt duo utring, utriq; mandibula, superiori, & inferiori, inherentes dentes, qui canum dentibus quàm similimi, inferiore basi lati, parte supernâ acuti, quibus singula quoq; radices longissime insunt, ut si quid propter duritiem ab incisforibus dentibus scindi minus potuit, id frangere possint. lib. de osib. cap. 5. Vide Dentes.

Canities, est pilorum ante legitimam aetatem, in album commutatio. lib. finit. med.

Canthus oculi. Vide Anguli oculi.

Capillaris vena. Vide Apanthismus.

Capillitium. Vide Trichiasis.

Capistratio. Vide Phymosis.

Capitis vena, & Cephalica, & humeraria, & externa dicitur, est, quæ ex jugularibus externis jam divaricatis, quibus cum radicem habet communem, utring, extra thoracem ascendit, & per humerum in externam brachii regionem declivis excurrit. initio secundi de rat. vict. Vide Axillaris vena.

Capreolaris sive hederarius anfractus, est arteriarum & venarum, ad utrumq; testiculum descendendum, non recto itinere, sed instar capreoli, aut hedera, variis modis involutarum, connexus. 1. de semin. cap. 12. Vide Glandulosi asis istentes.

Capri-

Caprizans pulsus est, ubi motum arteria interpellat velut & interruptit, ita ut motus à quiete alter, celerior primo, & vehementior sit. 1. de diff. puls. c. 29.

Capula cordis, i. e. Pericardium. Vide Membrana Pericardios.

Caput, est suprema corporis pars, quam nonnulli ventrem superiorem nominant, collo terminatur, & partes animales continet.

Caput cordis, est ampla, & orbicularis, ejus pars superna, & basis. 6. de usu part. cap. 7.

Caput ossis, est extrema ossium pars, crassior, & orbiculata. lib. de osib. in proem.

Caput-purgia, sunt medicamenta omnia, quæ capitis purgandi gratia induntur naribus, & dicuntur Erchina, sive intra os sumpta, partim colluendo, partim mandendo per spiritum caput purgent, & vocantur apophlegmatizantia. 5. de simpl. cap. 20.

Carbo qui & Carbunculus dicitur, cum melancholicus humor, in cutem decumbens simul cum febre, exanthemata per cutem crassescens siccescensq; concitat, assatum sanguinem indicantia. lib. de atrab. cap. 4. Carbunculus ulcus est, crustam citò, cum inflammatione totius partis vicina validâ, ut & febres vehementes, & extrema pericula, inferens, 5. de compos. med. per gen. cap. 15. cujus crusta nigra est, & cinerulenta, aliter quàm quæ sanguine suffusa sunt, aut quæ algore frigent; non enim vehementer lividus, ut in illis, tumor est, sed habet aliquid splendens, ut bitumen & pix: talis autem est, exactè atra bilis. lib. de tum. cap. 6.

Carbunculus. Vide Carbo.

Carcharacontra, dicuntur animalia, quæ serratis

sunt dentibus, ut Ursus, Leo. 9. de anatom. admin. cap. 1.

Carcinoma, in utero est tumor, sine ulceratione, inaequalis, & verrucosus, lib. finit. med. quem etiam à cancro animali Carcinon vocant. ibid.

Carcinos. Vide Carcinoma.

Cardia, i.e. cor, quod non solum visceri, vitæ principalissimo, quod sui natura palpitat, nomen fuit apud antiquos, sed etiam ori ventriculi superiori. 4. aph. 65.

Cardiaca dispositio, est innati roboris labefactatio, & languor; fit plerumque, confluctante ore ventriculi & stomacho, cum sudorum immodica vi. Sunt qui Cardiam, cordis phlegmonem statuunt, atque ab hac exortam virium exolutionem Cardiacam, vel dispositionem, vel syncopen nominant. 1. de caus. sympt. cap. 7. & lib. finit. med.

Cardiacus morbus. Vide Cardialgia.

Cardialgia, i.e. cordis, seu oris ventriculi dolor, & morbus, qui & Cardiogmos dicitur, à forti ventriculi aestu, flavâ bile in ipsius tunicis ebulliente, quin & à pituitâ impensissime frigida, & flatuoso spiritu frigido, genitus. 4. aph. 65. Dicitur etiam Cardiacus morbus. lib. Introd. cap. 13. & 8. de comp. med. loc. cap. 1.

Cardiogmos. Vide Cardialgia.

Carnosa cutis. Vide Musculus cuticulosus, aut Panficulus carnosus.

Caro, propriè vocatur tantum ea, quæ in musculo est; reliquarum partium nullam, homines carnem vocant, præterquam admodum pauci, sed quæ in visceribus, seu jecinore, renibus, liene, pulmone, visuntur carnes, eas parenchymata (quasi effusiones dixeris) Græci vocant, quæ in intestinis, ventriculo, stomacho, & utero sunt, sine nomine relinquunt. 11. meth. 11. Parenchymata autem eas partes vocant.

vocant, non carnes, propterea quod ex venis effusus sanguis circum vasa omnia concreascit. 11. de simpl. in initio.

Caros, sive Sopor, est deperditio sensus, & moris, in toto animalis corpore, illas à manere spirandi facultate, ex lassa anteriore cerebri parte, & temporum musculis: si verò spirationem adeo vehementer opprimat, ut quis vel magno conatu vix spirare possit, eorum exemplo, qui per gravem somnum stertere solent, Apoplexia tunc affectio nominatur. 4. de loc. affect. cap. 2. & 13. meth. 21. & com. 2. in 1. pro-rhet. 29.

Carotides, i.e. soporaria arteria, sunt duæ illæ, quæ ab arteria magna, à sinistro cordis ventriculo emergentes, rectâ ad caput feruntur, omnibus, quæ sunt supra cor, paribus distributæ. 16. de usu part. cap. 12. & 1. de placit. cap. 7. Soporaria autem nuncupantur, quia soporem, affectionem dilatarum arteriarum propriam esse autumat. 1. 5. de placit. cap. 7. Vide Soporariæ.

Carpon, & Carpos. Vide Brachiale.

Carunculæ, nunc substantiæ intestinorum portiones dicuntur, quæ in difficultate intestinorum excernuntur, adeo magnæ, ut possimus eas carnes nominare, 4. aph. 26. nunc verò carnosam quandam particulam, in summo ore pendentem, quam & columellam vocant, significant. 6. de comp. med. loc. cap. 3. Vide Gargareon, & Difficultas Intestinorum.

Casus, alias signa, & symptomata mox apparentia dicuntur. 1. aph. 12. Vide Judicatoria signa.

Cataclida, sive Subclavium dixeris, primam thoracis costam parvam significat. lib. de musc. dissect. cap. 12.

Catagma, i.e. ossis fractura. 2. meth. cap. 2.

Catagmatica emplastra, quæ & cephalica vocant,

sunt, quæ calvaria fracturis accommodantur, habentq; abstergendi, digerendi, & siccandi potestatem. 2. de comp. med. per gen. cap. 16. Dicuntur & Catagmatica ligamenta, quibus fasciarum instar, ossis ruptura deligantur. 1. de comp. med. per gen. c. 4. Vide Cephalica emplastra.

Cataleptis, est deperditio sensus visus, apertis palpebris, servatâ tamen secundum naturam spiratione, in quâ posteriora cerebri potius, & nervorum exortus intemperie frigida sicca, unde etiam affectus hic Nervorum exortus dicitur, afficiuntur, 4. de loc. aff. cap. 2. licet alibi Cataleptin dicat esse spiritus cohibitionem, lib. de musc. diss. cap. 26. Et alibi dicit, Cataleptin fieri, refrigerato primo sensorio, i. e. cerebro ipso: quæ refrigeratio cum fortis fuerit, mista humiditati, facit lethargicas passionem; cum siccitate verd eas, quæ à Grecis νάρκησις, i. e. deprehensiones dicuntur. 2. aph. 3. Eundem affectum Catoche & Catobon vocant. 4. de caus. puls. cap. 16. Vide Catoche.

Catalorica medicamenta sunt, quæ cicatrices grossas aquant, & limpidant. lib. de Dynamid.

Cataphora, i. e. veteriosa affectio, lib. 1. prorrh. quâ agri sopori gravi simile quid obvenit, fiuntq; cum omni sensus, cum vocis expertes. 1. de dieb. decret. cap. 4.

Cataplasma, compositio est humida, pulvi similis, ex farinis floribus, & humidis unctuosiss. 3. de compos. med. per gen. cap. 2.

Cataporia, i. e. pilula. de remed. par. fac. cap. 6. Vide Pilulæ.

Caraptosis, morbus non est, sed symptoma Comitialium, attonitam concidentiam repentinam significans. lib. de tor. morb. temp. cap. 4.

Cataracta, sive Suffusio, alias Hypochyma, est puita

tuita inter uveam, & crystallinū humorē coagulata, prohibens spiritus visibilis tum commineatum in oculum, tum effluvium ex oculo. lib. de ocul. par. 4. c. 12. Vel, Suffusio est, cum cernendi facultas deperditur, sive apparente, sive non apparente in oculis malo aliquo, & aut propriâ affectione molestaris, aut oris ventriculi, cerebriq; ex cognatione, & consensu, iudem afflictis. 4. de loc. aff. cap. 3. & 5. de loc. aff. cap. 6.

Catafarca. Vide Anasarca.

Catasthefis, dispositio est, quæ faciliè discutitur: opponitur hæctica dispositioni illi, quæ tenaciter inhaeret, & habituata est fixa firma. 3. de loc. aff. cap. 2.

Catastasis. Vide Diathesis.

Catataxis, est corporum ad inferna loca tractio, quæ obitur partim organis tentorii, è regione oppositis, partim transsumptione in contrarium, nempe transmissis per rotulas principis, quæ retentionem moliantur, ac superius adnexis. Opposita huic est Anataxis, quæ est tractio ad loca superna per traductionem. lib. finit. med. Vide Anataxis.

Catarrhus, seu defluxus, est multorum humorum delatio ex cerebro, per palati foramina & nares, quæ in exitu unâ cum statu egrediente strepitum quandam faciunt. lib. finit. med. Vide Coryza.

Cathartica, seu purgans facultas, vel medicamenta, duo significant: 1. Omnia ea, quæ quovis modo animalis excrementa expurgant. 2. Id saltem, quod per excellentiam tantum, aut per vomitum, aut per ventris defectionem purgat; neq; ejusdem est generis cum iis, quæ per nares, aut vulvæ, adnota, expurgant. 5. de simplic. med. fac. cap. 20.

Cathemerina febris, i. e. quotidiana: ita enim con-

sueverunt vocare eam febrem, quæ singulis diebus accenditur, neque ullam habet intermissionem; ego verò (inquit Gal.) solitus sum eandem febrem Amphimerinam continuam appellare: nam vocabulū Cathemerinon nusquam apud Græcos usurpatū invenitur; omnem verò rem, quæ quotidie eodem modo fit, Amphimerinam vocant: vocetur itaque, quæ singulis diebus accenditur & finitur febris, Amphimerina, i.e. quotidiana simpliciter; quæ verò non nō intermittit, quotidiana continua. 2. de diff. febr. cap. 7.

Cathæretica medicamenta sunt, quæ excrecentem carnem in ulceribus absument, 5. de simpl. cap. 2. eisdemque cicatricem inducunt. ibid. cap. 15. Vide Septa.

Catheter, est fistula cannulæ urinaria, cujus extremum aliquo linimento, oleo aut cataplasmate illinimus, & ad removendam urinam suppressionē, virgæ immittimus. ad Thrasib. cap. 23. Vide Syphones.

Catixin, seu secundum rectitudinem eruptio sanguinis est, cum sanguis è directo loci affecti effluit, & emititur. lib. de cur. rat. per sang. miss. 15.

Caroche, qui & Catochus, vigilans sopor est, 3. de loc. aff. cap. 5. estque solius cerebri affectus, veluti & per totum corpus convulsiones. com. 3. in 1. prorrh. 69. Est quoque Catochus fasciæ longior, quæ in orbem faciei & capiti circumdatur, ut operculum comprehendat. lib. de fasciis. Vide Cataleptis.

Catheterica medicamenta, quæ & cathartica Græci dicuntur, sunt medicamenta dejectoria, quibus renes, vesica, & gibba hepatis, à vitiosis succis expurgantur per urinas, ut Cava jecinoris & intestina, dejectione. 7. meth. 13.

Cava vena (sic appellata, quòd venarū omnium, quæ

per

corpus animalis disseminatur, latissima sit & capacissima, 4. de rat. vict. 27.) est vena magna à gibba hepatis parte orta, lib. de ven. & arter. dissect. cap. 2. per quam hepar, ex ventriculo per mesaraas venas attractum alimentum, & in ipsa hepatis substantiâ elaboratum, in omnes superiores corporis partes distribuit, 4. de usu part. cap. 13. quæ à convexis jecoris partibus orta, cum cava, propter sui magnitudinem; cum jecoraria, à viscere, undè egreditur, nominatur. 8. de placit. cap. 1. Nec verò à jecinore solum hæc vena, quæ à gibbis hepatis egreditur, sed alia etiam, quæ à simis & concavâ ipsius parte, quam portas vocant, (undè & vena portæ appellatur) promanat. 4. de usu part. cap. 13.

Cauda. Vide Coccyx.

Cavernosa ossa, foraminulenta, Ichmoidea, & spongiosa, seu spongoidea, sunt ossa quedam parva supra nasi radicem, ante meningas, in meatu olfactorio posita; à cribri, vel spongie similitudine sic dicta. 8. de us. part. cap. 7. Vide Ossâ Ichmoidea.

Cavernosum nervum appellant Penis colem, à quo Penem, & ipsum totum, nervosum dicunt. Coles enim in marium genitalibus, & uteri cervix, quoniam extendi, & in seipsam rursus retrahi, & subsidere videntur, nervosum proinde dicunt, com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. diciturque flatusosus, & fistulosus, 6. de loc. aff. 6.

Cauleon, est species fracti ossis, quæ per transversum fit, in qua fracti ossis partes ita à se disident, ut è directo non jaceant. 6. meth. 5. Vide Schidacedon.

Caulis, i.e. pudendum virile. 14. de usu part. cap. 12.

Causa morbi, est id, quo presente afficimur, & quo sublato statim cessat affectus. 1. de loc. aff. cap. 2. Aut, quod ei, qui fit, morbo, aliquam generationis partem tribuit.

Cau-

Causæ præcedentes. Vide Febres putridæ.

Causæ præincipientes. Vide Febres putridæ.

Causodes febres, i.e. incipientes, 1. aph. 12. quas etiam

Causonas vocant, i.e. febres ardentes. 1. de crif. cap. 4. Vide Continua febris.

Causon. Vide Causodes, Continua, & Synocha. Causon legitimus dicitur, qui ex redundante flavâ bile fit, in vasibus majoribus circa cor putrescente; nothus verò, qui ex putrescente crassâ pituitâ. 4. de rat. vict. 13.

Cautifica, h.e. urentia medicamenta sunt, quæ & vehementer calida sunt, & consistentia crassa, quæq; ignis instar, corpus colliquant, & sæpe escharas, h.e. crustas efficiunt, 5. de simpl. cap. 15. Inde & affectiones causticæ, & caustica excrementa, i.e. urentia appellantur, quarum virtus est, morbum & acutum, & periculosum, & velocis judicationis reddere. com. 2. in 1. prorrhet. 60.

Cedmata (νέκρωτα) vocat Hippoc. fluxiones in crura decumbentes, & ex iis, eas maxime, quæ primum articulum, ubi coxendix est, occupant. comm. 5. in 6. de morb. vulg. 22. Significat quoq; affectus ex diuturnis illis, quæ sequuntur, defluxionibus tum pleriq; aliis in articulis, tum verò præcipue circa coxendicem.

Celas, Hernias, Ramices, Circocelas, significant omnes testiculorum tumores, lib. de tumor. cap. 15. Barbaram sectantes medicinam, Rupturam vocant. Hæc variis fit modis, variisq; à parte affectâ, affectûsq; hujus causâ conjunctâ, appellationes accipit: si enim peritoneo rupto, intestina in scrotum descendunt, Enterocèle Græcis, Ramex intestinorum Latinis appellatur; ubi verò intestina supra in inguinibus hærent, Bubonocèle, h.e. Ramex inguinalis vocatur; si humor aliquis aquosus in

scroto

scroto colligitur, Hydrocele, i.e. Ramex aquosus nuncupatur; quum autem caro dura intra testium tunicas concreverit, Sarcocèle, h.e. Ramex carnosus dicitur. In summa, nomen semper à rebus opulentibus, & in tumorem sublatâ à parte, accipiunt. Proinde, si omentum in scrotum devolvatur, Epiplocele, h.e. Ramex omenti nominatur; sic ubi vena ultra modum repleta ac dilatata glomerantur, Cirrocele, i.e. varicosus Ramex vocatur. Vide Hernias.

Celer pulsus est is, cum celeriter & brevi tempore arteria distenditur. 1. de diff. puls. cap. 7.

Cenchria, alterum est herpetum genus, quod à similitudine, quam habet cum milio, (quod Græcis κένχρη dicitur) Cenchriam vocant, humores mista facultatis bilem scilicet, & pituitam, continens, quæ non protinus ulcus faciunt, quemadmodum bilis sincera, sed admodum exiguas pustulas ad speciem milii, quæ tamen & ipsæ decursu temporis in ulcus transeunt: dicitur & Herpes miliaris, 14. meth. 17. Vide Herpes.

Ceneangia proprie & primum vasorum inanitionem significat, atq; ob id xortias, i.e. ciborum abstinentia perhibetur symptoma. 2. de rat. vict. 47.

Ceneon. Vide Ile.

Cephalæa, cerebri morborum symptoma, est capitis diuturnus dolor, difficulter solubilis, qui a parva occasione, vehementes habet accessiones, ita ut neq; voces, aut motum tolerare possit infirmus, sed tranquillitatem, obscurumq; cubiculum querat, ob doloris vehementiam; cum nonnulli veluti malleo se percuti, alii caput sibi contundi distendiq; sentiant, non paucis ad oculorum radices dolor extendatur, suis intermissionibus circumacti, non secus ac qui Cepha-

pha-

phalalgia laborat, sed in Cephalæa, affecta partes redduntur multo debiliores, quam in Cephalalgia. 3. de loc. affect. cap. 9.

Cephalalgia, *ὀλὸν ἀλγῶν τῆς κεφαλῆς*, est dolor capitis promiscue qualicumq. lib. 2. de comp. med. loc. cap. 2. Vide Cephalæa.

Cephalica emplastra, capitis fracturarum, quæ usq. ad crassæ meningis duplicaturam pervenerunt, accommodata sunt pharmaca, quorum virtus est, ut osium squamam sursum trahant, & in pristinum locum revocent, & fragmenta ex capite, ut & aliis ex corporis ossibus, educant. Nonnulli communi genere hac etiam vocant Catagmatica, propriè verò nuncupata fortiora sunt, siquidem ex alto, non ossa modò, sed his multò quoq. magis, humorem aliquem crassum, & viscosum, vel omnino depravatū suā caliditate attrahunt. 2. de comp. med. per gen. cap. 18. Deniq. medicamenta carnem producentia, Cephalica vocant, 3. meth. 2.

Cephalica vena, quæ & Humeralis, sive Humeraria dicitur, ramus est vena cavæ ad jugulum ascendentis, ubi ad furculas divisa, altera pars humero superposita ad manum tendit; unde & Cephalica dicitur. lib. de anat. viv. Vide Humeraria.

Cerææ, mulieres sunt, quarum uterus propriis ex morbis, [illius sive in processibus supernis & lateribus, (Ceraæ Græci vocant) sive in collo aut fundo consistant,] quandoq. plura, quam prius, quandoq. pauciora, vel nulla, vel male emittit menstrua. 3. de sympt. caus. cap. 4.

Ceratoides, cornea, seu corniformis tunica oculi est, quæ à durâ meninge orsa (tunicam choroidem complectens) crassa admodum, parte ejus mediâ interim densissimâ,

simâ, & splendida ad splendorem recipiendum, & transmittendum, cornibus admodum extenuatis similis; unde eam à cornu similitudine Ceratoidem, Corneam, & Corniformem appellant, 10. de usu part. c. 3. Vide Rhagois tunica.

Ceratomalagmata, nomine à sola consistentia desumpto, vocant medicamenta, quæ corpori imponuntur, non omnino quidem humida, siccitatem verò tantam necdum consequuta, quantam emplastra possident. 7. de comp. med. loc. cap. 11. 13.

Cerchis. Vide Cubitus.

Cerchnos, est exiguus quidam ad tussendum impetus, & conatus, non tussis, sed veluri nausæ vomitiones præcedūt, ita tussim hoc symptoma. Atq. ut nonnulli nasearunt quidem, non tamen vomuerunt, ita nonnullis Cerchnos incidit, nec tamen tussis propter causâ parvitatem est secuta. 2. de sympt. caus. cap. 4.

Cerebellum, posterior est cerebri pars, quæ à nonnullis Encranion, vel Parencephalis, vel posterius Cerebrum dicitur, 9. de anat. adm. cap. 2. estq. spinalis medullæ principium, & nervorum omnium, qui in toto animali sunt activi, fons & origo. lib. de ossib. cap. 11. Vide Parencephalis.

Cerebrum, quod Græci à situ Encephalon appellant, (nam nominatur ita, quod ἐν τῇ κεφαλῇ, h. e. in capite situm habet) animæ ratio, occurrat est domicilium, nervorum & sensus omnis, motusq. voluntarii principium, substantiâ nervis simillimum, nisi quod mollius; nam id illi conveniebat, ut quod sensus quidem omnes recipit, omnesq. imaginationes, atq. mentis notiones complectitur. 9. meth. & 8. de usu part. Substantia ipsius glandularis est alba, veluri

veluti è spumâ quâdam concreta, & humida. lib. finit. med.
Cerelæon, compositio est ex cerâ & oleo. 7. de compos.
med. per gen. cap. 2.

Cerion, i.e. favus, ulcus parvum in capite est cum tu-
more, ex cuius foraminibus crassior sanies, & mellis essen-
tiam referens, profluit. lib. de tumor. cap. 15. & 1. de compos.
med. loc. cap. 8. Vide Helminthes.

Certatoriâ, h.e. agonisticâ aquâ frigidâ uti illi dicun-
tur, quibus ea & assatim & frigidissima exhibetur. lib. de
marcore, cap. 8.

Cervix. Vide Spina. Dicitur & Cervix, tenuis ossium
processus. lib. de ossib. in proem.

Chalastica, i.e. relaxantia, seu remittentia vocantur,
qua modicè calefaciunt, quorum usus est, ut conniventis
adstrictaq; corporis laxent flatuosum spiritum tenuent, &
phlegmones materiam digerant. 13. meth. 5. Induratorum
corporum medicamina, qua ipsorum solvunt duritiem.
Malactica, h. e. emollientia dicuntur; qua autem ten-
sioni medentur, Chalastica appellantur. 7. de comp. med.
per gen. cap. 9. Vide Relaxantia.

Chalazia, à Græco ὁ χάλαια, i.e. grando, sunt tuber-
cula instar grandinis, pellucida, aut per cutim sparsa, aut
palpebras maxime infestantia. Græci Posthias vocant. 4. de
comp. med. loc. cap. 7. ubi dicit, Chalazia est morbus, ex vi-
tiis, qua oculos infestant, cum toto genere præter naturam
aliquid peccat, 14. meth. 19. Sic etiam nominatur vitium
quoddam in suis ore, sub linguâ. Ath. l. 3. Deniq; in ovorum
quoq; luteo χάλαια dicuntur, à grandinis formâ & colore.
Arist. 3. de hist. anim. c. 2.

Cartilago, quam Græci χόνδρος vocant, est par-
ticipula simplex in animalis corpore, qua aliarum quidem
omnium

omnium est durissima, toto autem esse est mollior. 7. de usu
part. cap. 3.

Cartilago ensiformis, Græcis Chondros Xiphoides,
6. de usu part. c. 3. Eadem dicitur mucronata, lib. de ven.
& art. dist. c. 5. Aliqui sunt, qui ensiformem cartilagi-
nem dicunt esse, totam pectoralis ossis figuram, (non autem
eam tantum, qua in imo ejus est,) quia gladii similitudinē
representat. l. de ossib. c. 13. Vulgus malum punicum, seu
granatum vocat; pectoris autem ossis, quod στέρον vocant,
pars extrema est, cui τὸ σόμα & γαστήρ proximè subjicitur.

Cartilago innominata, est secunda laryngis carti-
lago, qua nomine caret, in internis partibus, qua Oesopha-
gus est, positionem habens. 7. de usu part.

Cartilago peltalis, est imperfectus circulus in prin-
cipio aspera arteria collocatus, ad modum peltæ, cujus gib-
bositas apparet in gutture, ac Adami pomum appella-
tur; ejus verò defectus est versus gulam, undè cartilago
peltalis dicitur; cujus defectum supplet quadam cartila-
go supposita isti inferius, faciens etiam circulum imperfe-
ctum, sed contrario situ cum superiori, quia ejus gibbositas
interius est versus gulam, defectus exterius, versus guttur,
diciturq; cartilago cymbalaris, vel coopertoria. l. de
anat. viv.

Chemosis, morbus oculi est, quando album oculi tu-
mesactum, adeo circulum Iridis excedit, ut & nigrum oculi
concavum videatur. lib. de anat. ocul. Alibi, Chemosis ex
vehementi inflammatione, utraq; palpebras in exterio-
rem partem detorquet, ita ut totus oculus integri nequeat.
lib. introd. cap. 15.

Chemicidas, instrumenta quadam vocant, quibus in
calvaria fracturis urimur. 6. meth. 6.

Cheros, i. e. tempus, seu ætas morborum. lib. de morb. temp. cap. 1.

Chion. Vide Cioh, & Staphyle.

Chironia, & Telephia, χερώνια sive χερσίον ἰλν, sunt species ulcerum malignorum, oras habens duras, callosas, & tumentes. lib. de tumor. cap. 13. Tria tantum ulcera propriam habuere appellationem, Anthrax, Phagedæna, Herpes, cætera omnia communibus deteriora, per se ipsa solebant antiqui simpliciter ulcera nominare Chironia, quæ in longum tempus protrahuntur, cum ne quidem longo tempore fuerint ad cicatricem producta, rursusq; influente in illo Ichore, ex osse corrupto, in partem penitiorē inflammantur, & pus generant pessimum, corruptissimum, à quo cicatrix eroditur, & caro exulceratur. 6. aph. 45. Invetrata ulcera, & dyspepultura, h. e. cicatricem ægrè ducentia, itidem Chironia nominant, 4. de compos. medic. per gen. Dicuntur (ait) Chironia partim ab eo, qui primum ea sanavit, partim ab ipsis, qui iudem sunt affecti, ut Telephium. 2. meth. 2.

Chirurgia, i. e. manualis operatio. 6. meth. 6. Indd Chirurgice ea est Medicina pars, quæ manu medetur. 3. de comp. med. per gen. cap. 2.

Chloron, i. e. pallidus & eruginosus color. 2. progn. 20. Hinc Chlorosis, quæ partim de morbo febre pallidâ, utriusque vasorum oppletione partim de symptomatica discoloratione universi corporis habitus virginû nubiliunt, ex utero egrotantium usurpatur.

Choana, χόαν sive χόανον, à χέω, i. e. liquefacio, difundo, vas est ex argillâ, quo argentarii & chymici utuntur, infundendis ac liquefaciendis metallis: alias Infundibulum, Scypho, Pelvis, Pyelos, significat cavita-

rem

tem quandam, in quam meatus cerebrum expurgantes in palatum desinunt. 9. de usu part. c. 3. Alias Choana vulgo lacuna dicitur.

Cheeras, ή χοίρας ἀδ, porcula, scrofula, struma, vel à petris, quæ χοίρας δας dicuntur, vel ἀπό τ χοίρων, à porcis, in quorum gutture frequenter ejusmodi tumores reperiuntur, sic dicta. Fit autem struma sæpè propter ulcus, quod in manûs aut pedis digito est, glandula in inguinibus, & aliis, tum intumescunt, tum phlegmone occupantur, quin etiâ in collo, & secus aures, sæpè glandula (in quibus in collo, capite, vel aliquâ vicinâ parte, ulcus est narum) intumescunt: nominant autem ipsos adenæ, cum sic intumescunt, Bubones; quod si scirrhorior earum partium phlegmone aliquando fuerit, hæc & ægrè sanabilis redditur, & Cheeras, i. e. Struma dicitur. 13. meth. 5.

Cheiras, Græcis ή χερας ἀδ, ἀπό τ χερών, fissura sunt, in manibus præcipuè, sed & pedibus & testibus.

Cholagoga, i. e. bilis eductiva medicamenta. 4. aph. 2.

Choledocos, i. e. vesica bilis receptiva, quam etiam jecoris vesicam nominant, lib. 6. de anat. adm. c. 2. Eandem etiam cystim bilis, i. e. vesicam bilis susceptricem vocant, 4. de usu part. cap. 12. ut & felle folliculum, 5. de loc. aff. cap. 7.

Cholera, i. e. biliaris, morbus est acutus, cum vomitibus multis, alviq; defectionibus biliosis, suris quoq; se contrahentibus, ac frigescentibus extremitatibus: fiuntq; in his ægris pulsus minores, & obscuriores. Nomen habet non tam à χολῶ, quàm à χολας, i. e. intestinum, per quod materia ex ventre egeritur. Cholera duplex est apud Hippocratem: altera humida, in qua, ut omnes nôrunt, vehemens est excretio bilis, supra infraq; erumpentis, intestina

E

graviter torquentur, accedunt convulsiones, sæpè etiam crurum sura contrahuntur; alteram liccam choleram vocat Hippoc. ab eadem proveniente causâ, ac circa eadem consistentem, at citra ventris fluorem, & vomitum. lib. finit. med.

Chondros, i.e. cartilago. 7. de usu part. cap. 3.

Chondrofyndelmus, i.e. cartilagineum ligamentum, 1. de temp. cap. 9. Hinc & οὐρὸνδεσμός, unio osium, cartilaginis interventu facta.

Choræ, i.e. regiones oculorum, seu cavitates, quæ superciliis subjacent. 8. de usu part. cap. 6.

Chorion, Græcis χορίον & χορίον, i.e. secundina, extrema foetus, hunc totum tam in brutis, quam in homine involvens, est membrana, vulvæ prægnantis mulieris adhaerens, multarum venarum & artiarum contextu, inter valla membranæ obducta habens. (Undè αἰὼν & χορὸν dicta, quod in eo vasa, veluti in choro disposita sunt; quamquam τὸ χορίον à χορίω, quod foetus velut domicilium, unâ cum illo, in partu prolaturus.) Eidem duæ aliae membranae interius adnascuntur: altera, quæ Amnium, i.e. Amiculum dicitur, toti foetui circumjecta; altera, quæ Allantoïdes, i.e. Intestinalis, eminentibus tantum partibus, capiti, naribus, pedibus, duplex superjecta, lib. de vulvæ diss. cap. 10. quæ Arabicis Abgas, Camisia foetus, & profundatio sudoris dicitur. lib. de Anatom. viv.

Choroides plexus (qui & Retiformes, & Reticulares dicuntur, Vide Plexus retiformis.) sunt convolutiones membranarum cerebri, ex multis venis, & arteriis, secundarum instar effigiatæ, nomine à Choriis, i.e. membranæ diducto, quæ foetus extrinsecus in orbem ambiunt. 9. de anat. adm. cap. 3. Constituitur autem prope me-

medium cerebri ventriculorum. 9. de usu part. cap. 7. Dicitur adhuc & tenuis cerebri membrana Choroides, i.e. secundiformis meninx. 8. de usu part. cap. 9. Dicitur & Choroides oculi tunica, corpus quoddam retiforme, quasi tunica, (Amphiblestroïde dicta) humorem vitreum oculi ambiens, quod ex portione tenuis meningis & ipsius quasi cerebri supernè descendente, atque amplificatâ, est constitutum, reti simile, quod retiforme corpus, à choroïde, i.e. tenui meninge, quæ illi supernè committitur, continetur, undè tunica oculi choroides dicitur. 10. de usu part. cap. 2.

Chorda, ἡ χορδή, dicitur aut intestinum, aut ex hoc contorto, quod sit musicorum chorda, fides, aut tendo, sive musculorum extremitas, ad similitudinem chordæ arcus. 6. aph. 49. & lib. de anat. viv.

Chordapsus, Ileos, seu Volvulus, est tumor eminens in tenuium intestinorum parte internâ, talis, quo videatur intestinum ad similitudinem chordæ obvolutum, vel ab inflammatione, vel obstructione aridi stercoris, graviter agros vomitionibus crucians, aded, ut nonnulli stercus quoque, vomere conspiciantur. Hinc stercoraria etiâ dicitur vomitio, & Miserere mei Domine. 6. de loc. affect. 2. Vide Ileos.

Chronicæ ægritudines, i.e. longæ. de part. art. med. cap. 7. Vide Polychronius.

Chrysite, terra est aurea, in quâ, parvis terræ particulis, immista sunt parva auri partes. 5. de simpl.

Chylus, est hordei lactisve cremori analogus succus albicans ex assumptis cibis, vi nativâ calor elaboratus, partim tenuioribus portionibus, partim crassioribus constans, ex ventriculo per mesaraas in jecur, ut ibi sanguinis formâ consequatur, transmittitur. lib. de atra bile. cap. 3.

Chymethla, i.e. *perniones*. 6. *simpl.* Vide *Perniones*.
Chymosis (qua & *Chemosis*) est utriusq. palpebra distortio, ex inflammatione orta. 4. de compos. med. loc. c. 4. Est item Chymosis, carnosae corneae oculi pellicula inflammatio. lib. de rem. par. fac. Vide *Chemosis*.

Chymus, est nutrimentum, seu humor ad nutrimentum animalis in hepate preparatus, & ab excrementis separatus. 4. de usu part. Atqui Antiqui saporem vocaverunt Chymum, i.e. liquorem. lib. de ocul. par. 2. cap. 1.

Chymi autem appellatio apud Hippocr. semper humoribus corporis destinata est, ex quibus nos constituimur, nutritur, & fovetur, sanguini inquam, pituita, & duplici bili flava & nigra. Apud Platonem verd. & Aristotelem, gustabilis qualitas quavis nobis insita, Chymus, i.e. sapor, nominatur. lib. finis. med.

Chyphosis, i.e. gibbositas, (quam etiam *Ghyrtosis*, i.e. incurvationem dicunt) est distortio spinae in posteriorem partem, sicuti in anteriorem partem retractio, *Lordosis* nuncupatur. Gal. lib. 3. de sania. tuand. 13.

Chyrtosis. Vide *Chyphosis*.

Cicatrix, Graeci *κλῆ*, ab Hipp. nunc sumitur pro ipsius ulceribus, nunc pro consolidatione ulcerum, caro callosa, pro cure ducta, ubi vulneris, quod jam coivit, hiatus fuerat. 1. de artic. 56. Particularim autem Cicatrix oculi appellatur, ubi nigro oculi ex alto ulcere, membrana crassities supervenit, & color albius apparet: quae cicatrix, si sit & major, & crassior ex ulcere Iridis nata, dicitur *Albugo*. lib. Introd. cap. 15. Vide *Albugo*.

Cilia, extrema illa palpebrarum partes sunt, quae in somnis, clausis oculis simul committuntur. Cilia etiam *Tarsi* nominantur, lib. Introd.

Cin

Cingentes, sive *succingentes*, *membrana*, *simplices* quaedam tunicae sunt, telae araneorum similes, quae totam utramq. thoracis regionem internam subcingunt, vocanturq. in costis *Cingentes*, Graeci *Ηπεξοχότες*: ubi verd. recta ad jugulum perferuntur, *Intercipientes*, Graeci *Διαπεπλῆστες*, (medium thoracem in latera duo distrahentes) ubi pulmonem circumbarefcent, huius operimentum sunt; quarum basis, supernis partibus septi transversi objicitur; inferioribus autem, alia quaedam membrana, huic persimilis substrata, quae *Peritonaei* vertex, & principium jure optimo nuncupatur. 6. de anat. adm. cap. 8.

Cinumenus, *κινῦμενος*, i.e. qui movetur & diversis horis semper accedit ac remittit. Contrarii huic sunt affectus *εἰσῆτες*, iisdem horis subinde accedentes, & remittentes. Illius species duae: *Anticipans*, & longius *Emanens*, *προδυνῖνος ἢ ὑστερῖνος*. Ille, qui praevent, citiusq. horas persolvit, *Prolepticus*, sive *Anticipans* dicitur; qui tardat, *Hystericus*, i.e. posterius invadens. lib. de Typis, c. 3.

Cion, Vide *Gargareon*, & *Staphyle*.

Cionides, Vide *Staphyle*.

Circuitus, sive *Periodus*, est tempus intentionum, & remissionum, in morbis quae fiunt: ut, *Typus* est ordo earundem intentionum & remissionum, lib. de Typis, cap. 2. Vel, *Circuitus*, sive *Periodus*, est similis ab eode ad idem reditus. 1. aph. 12.

Circumcisio, vel *circumsectio*, est ablatio cutis glandem conegentis in virili pudendo, quae cutis *preputium* dicitur. lib. finis. med.

Circumnuens. Vide *Innuens*.

Circumocularis tunica oculi est, quae à crassa meningē orta, toti oculo substernitur, *circumrangs*, & cir-

cuminduens osseam oculi orbitam, ne huic oculus indatur nudus. *lib. de anatom. viv.*

Circumossalis membrana, quasi ossium involucrem dixeris, est, quæ singulis ossibus in longitudine circumjicitur. *1. de sem. c. 10. Quam in capite, Pericranion dicimus, lib. de anat. oculi. In costis autem, aliisq, ossibus ferè cunctis, Periostion. 8. de anatom. adm. cap. 10.*

Cirros. *Vide Cornua vulvæ.*

Cirfocele. *Vide Celas.*

Cirfos, i.e. varices, aliàs quoq, venas omnes dilatatas Antiqui sic nominabant. *lib. de tumor. c. 16. Vide Varices.*

Citræ. *Vide Cirtosa.*

Cirtosa, i.e. vitiosi cibi appetentia, qualis gravidis conringit, *6. de sanit. tuend. cap. 9. Dicitur etiam niosæ, & nirta, Cirta, Pica, & Picatio. 1. de sympt. caus. c. 3. & c. 7.*

Claves, sive Jugulum, dicuntur aliàs duæ primæ costæ prope guttur, inter os pectoris, ac spina finem, *13. de us. part. cap. 11. Claviculas etiam aliàs vocant, lib. de musc. dist. cap. 12. quas vulgo dicunt furculas, quarum una superior, altera inferior nuncupatur. Recentioribus autem, elatiore in thoracis sine, & quidem in anteriori parte Claves existunt, sic dictæ, quod sterno, Omoplatas, i.e. humerum firment; is autem finis vulgo furcula superior dicitur; cavitates sub his clavibus summo in thorace quæ conspiciuntur, appellantur Sphage, i.e. juguli, ut sint duæ claves, & juguli toridem, dexter, & sinister.*

Clavus, sive Gomphos, est oculi morbus, cum uveæ locum suum egrediens, pelliculas superficiei tenuis operit, unde ejus forma fit quasi clavus. *lib. de ocul. cap. 11. Vide Gomphus, & Myrmecia.*

Clunes. *Vide Coxa.*

Cly-

Clydones, symptoma est retentricis facultatis ventriculi, cibos vel non complectentis, vel diminutæ, vel vitiosæ, unde flatulentia, & fluctuationes cum sonitu succedunt: flatulentia quidè, ubi & cibi flatuosi sunt, & ventriculus non admodum frigidus; fluctuationes cum sonitu, cum vel nihil in eo continetur, quod ventri in flatum possit, vel vehementer fuerit refrigeratus. *3. de sympt. caus. cap. 2.*

Clyster, κλύστρος, Latinis idem est quod lavamen, seu ablutio, à verbo κλύειν, quod & lavare significat. Alio nomine Græcis ἰνιγία dicitur, quæ vox Latinis injectionem significat. Medici hujus temporis, Clysteris, & Enematis Græcis vocibus potius quam Latinis malunt uti. Dicitur etiam Clyisma: unde Diaclyisma, i.e. lavatio ad ulcera, & dentes tirubantes, infirmosq, Dicitur adhuc & Clysmus, de medic. fac. par. cap. 16.

Cnimi, Græcis νῆμιν, i.e. tibia, seu alterum ex duobus ossibus tibia eodem cum toto membro nomine, alterū verò Perone, seu fibula dicitur. *3. de usu part. c. 9. Vide Crura.*

Coadjutrix causa est, quæ solâ suâ virtute morbum efficere nō potest, sed alteri auxiliatur, ut, Venus immoderata articulare morbum promovet, & sanguinis eruptionem remigatio. *lib. Introd. cap. 8.*

Coarticulatio. *Vide Abarticulatio, & Dearticulatio.*

Coccyx (vulgo Cauda) i.e. Cuculus, est os, quod subest ossi sacro. *lib. de ossib. cap. 12. & 3. de artic. 104.*

Coctio, quid sit, hinc nosces, cum facultates quatuor sint, atque inter eas non minimè valeat alteratrix, per quam natura alimentum assimilât, coctio nuncupatur nutritivæ substantiæ permutatio, secundum qualitatem. *4. de nat. viat. 44. Perfecta urinæ coctio est, quando in uri-*

nus subfederit aliquid album, & lave, & equale, & continuum: Debilis autem coctio est, quando ex aquosa mediocriter subpallida facta fuerit; & quidem si turbulenta apparuerit, & talis permanserit, hac quoque imminuit & debilis coctionis est signum, & rufa etiam ac tenuis, ex eodem genere est. 1. de cris. cap. 27.

Coctionis signa sunt, quae hominis salutem, non tamē semper per crisin, futuram ostendunt; quo distinguuntur à Decretoriis, quae salutem hominis futuram, per crisin ostendunt. Coctionis, quae in spirandi sit instrumentis, sputa; ejus, quae in venis, urinæ; illius, quae in ventre, alvi excrementa, indicia, & characteres, statuere oportet. In febribus igitur (quoniam venosi generis sunt passionēs, nam & arterias in hoc genere comprehendimus) ad urinas praecipue attendere oportet. 1. de cris. cap. 7.

Cœcum foramen, est angustius illud auxēū foramen, quod ex duobus inaequalibus foraminibus, quibus quintæ nervorum conjugatio à cerebro excipitur, oritur, cui subditur labyrinthus quidam, quē natura effecit, musculus temporalibus consulens, nervum durum eis simul & labiis immissens. 9. de usu part. cap. 13. Vide Meatus auditorius.

Cœcum intestinum, sive orbem, sive monoculum, est quartum intestinum in ordine, primum locum inter crassa obtinens. lib. de anat. viv. Quidam illud saccum nominant.

Cœlia, apud Græcos noxia, sine adjectione omnem ventrem seu cavitatem signifi. ut 6. aph. 20. Apud Aristotelem in specie dicitur Cœlia, ventriculus, seu illa tantum corporis partis cavitās, in quā cibis devoratur, & in qua prima concoctio peragitur, sed apud Hipp. nunc cum adjectione superior, & inferior venter significantur, ut superior
sit

sit ventriculus, inferior, omne, quod sub diaphragmate est, spatium latius.

Cœliaca, i. e. ventralis dispositio, communis morbus est ventriculo, & intestinis, in quo materia, nō mordaces, egeruntur, intestinorum ob imbecillitatem, quae retinere, contenta, ne exiguo quidem tempore possunt, sed ea illico excernunt, perinde ac si grave aliquod onus deponerent, nec secus, quam in stranguriā, vesicā (in quā ob acrimoniam & vellicationem hac jugiter, quicquid ad eam pervenerit, excernit) contentorum molem ne quidem exiguam sustinere valet. 6. de loc. aff. cap. 2. Vide Lienteria.

Cœli status, i. e. ambientis nos aëris, temporisq; praesentis constitutio. 9. meth. 5.

Cœlomata, sunt rotunda & cava ulcera, botbrii latiora, quae in oculis, circa Irim nascuntur. lib. Introd. c. 15.

Cœlum, more vulgi, appellat Hipp. aërem, 1. de morb. vulg. 1. qui supra nos est, usq; ad nubium regionem. com. 1. in 1. de morb. vulg. 4. Quamquam verò Cœli etiam nomine, omnis cavitās designari potest, tamē specialiter, Cœlum vocatur superioris palpebrae superficies; sicut Hypocœlum pars inferior, quae ei responderet: utrumq; rûm in Aqua inter cutem, tum in alterius generis malis habitibus, in diuturnis insuper hemorrhoidibus, longis ad-hac in mulierum profluvii, atq; inchoantibus ophthalmiis intumescit. Sunt qui cœlum oculorum interpretantur cavitates, quae sub oculis & utrâq; nasi parte cernuntur, quae tamen Canthi dicuntur.

Cœrulea oculi tunica, eadem est cum Rhagoide, uveâ, & uviformi, procul dubio, ob versicolore inter-nam hujus superficiem sic dicta. 10. de usu part. cap. 4. Vide Rhagois.

Coincidentia, sive Intercidentia, Græcis *παραπύσις*, est, cum aliunde in aliud vas humor fluit. 7. de anat. adm. cap. 16. In oculo autem coincidentia est, ubi in meatum, porumve opticū, qui à basi cerebri veniens, oculo videndi facultatem tribuit, humor morbidus ad aperto vel rupto vase incidit, eumq; aded obturat, ut visiva virtus in oculū prohibito commeatu, animanti, hac ratione, cum dolore visus eripiat. lib. Introd. cap. 15.

Coindicantia, Græcis *συνεικνύουσα*, sunt, quæ propter proprias cujusq; morbi indicationes, ægri ad-hac virtutem, naturam, ætatem, anni tempus, regionem, consuetudinem, & si quæ sunt id genus alia, considerant, ac à primis indicantibus indigitata præsidia approbant & confirmant. 13. meth. 16.

Cola, dicuntur in homine longiora majoraq; membra, à thorace separata, & quasi dependentia, ut Brachia & Manus, Latinis dicuntur Artus, 3. de usu part. cap. 1. Dicuntur & Cola, ossa narium, cribrosa illa minutissimis foraminibus pertusa, ut in seqq. dicitur. Vide Ichmoidea.

Colatoria ossa, sunt narium foraminulenta & cavernosa ossa, quæ à cribri similitudine, Ichmoidea, vel à spongiâ, Spongoidea appellantur; varia enim habent foramina, quo modo & spongia: neq; ea habent recta ut cribra, quod per ea superflua cerebri excrementa transcolantur, & odoratarum rerum species ad processus mammillares rectâ adscendunt. 8. de usu part.

Coles, est particula corporis insignis, ad extremitatem colli vesica sita, quâ mares feminas exuperat. Hanc ipsam Græci *πενή*, *πενή*, Latini Penem, Colem, Mericulam, Virgam, & Pudendum virile nominant. 5. de usu part. cap. 15.

Co-

Colica dispositio, est morbus plenioris intestini diuturnus, in quo cruciatus intolerabiles, difficultates spirandi sudores perspirationesq; suboriuntur. lib. finit. med. Suntq; Colicus & Volvulus intestinorum etiam inflammationes, quorum alter, tenuioris intestini affectus est, alter plenioris, quare dejectiones includuntur, & status intestinis involuti, eo quod exitum non habeant, dolores vehementes, & tormenta concitant, lib. Introd. cap. 13. & 2. de loc. aff. 5. Indè Colica medicamenta sunt, quæ ad sedandum coli dolorem sunt comparata, quæ quidem etsi anodyna sunt, à communi tamen anodynorum formâ differunt, quod propriè Colica sic dicta, aromatibus odoratis, ac urinam cientibus seminibus permiscentur; & quanquā Colica vocentur, non tamen ad Colicos tantum, sed ad omnem dolorem, in quacumq; corporis parte factum, sedandum admoveantur: quo factum est, (inquit Gal. initio libri sexti de loc. aff.) ut antidotos omnes dolorem sedantes, veteres Colicos nuncupaverint. Vide Narcotica.

Collectiva medicamenti facultas est, quæ ulcera, & vulnera glutinat. 5. de simplic. cap. 2.

Collectiva inæqualitas pulsuum est, quæ ex inæqualitate plurium pulsuum est constata. 1. de differ. puls. cap. 30. quæ & Systematica dicitur. Vide Systematica.

Colliculum, idem est quod Nympha, nimirum caruncula membranosa, ad fissuram colli matricis exorta, quæ, dum virgo defloratur, rumpitur: quam ipsam, quod multo promineat, Aegyptii in virginibus excidere consueverunt. lib. Introd. c. 10. Atqui plures ex antiquis Anatomicis, tum præsertim Avicenna, dicunt, iis, quæ nondum Venerem sunt experta, circa medium colli uteri panniculum, virginalem dictum, esse, qui hymen, alius hymenæon, vocatur, & ut ajunt,

ajunt, in primâ coitione rumpitur; quod verisimile non videtur, nam in dissectione virginum non apparet, nec usquam, quod legerim, meminit Galenus; sed potius credendum est, collum ipsum, quod musculosum sit, & nervosum, in iisdem virginibus tantummodò connivere, & angustum esse. Nympha verò est annata Epiphysis, & appendix cutacea, lata, intra pudendum muliebre, supra alarum commissuram, ad urinarium meatum sita: gemina autem est, utring, scilicet una, data est à naturâ, cum ornâmentis causâ, (nam quod peni virili præputium est, & uva Pharyngi, id Nympha utero:) cum etiâ, ut uterum à pulvere, frigore, & aliis externis injuriis tueatur. 15. de usu part.

Colliquatio, Vide Anastæchiosis.

Collisio, & Contusio, est, cum exterior superficies percussæ corporis, continuitatem servat, multa verò exigua divisiones in profundo apparuerint; at cum cavitas aliqua forinsecus apparet, quam rei collisa percussor impresserit, tunc Illisio, Græci θλάσις dicitur. lib. de sympt. caus. cap. 11.

Collum uteri, sive os uteri, est illud, quod intus est, ubi uterus desinit, collum verò incipit; quod magis propriè os uteri diceretur: nam altera colli extremitas, quæ mulieris pudendo conjungitur, non uteri, sed ipsius colli os non sine ratione diceretur. 5. aph. 46.

Collyria, Latinis Medicamenta vocantur, quæ oculis admoventur, Græci ὀφθαλμικά nominant: hæc verò duobus generum sunt; quædam enim liquida sunt, & passim collyria nominantur; quædam arida, & hæc barbarâ voce dicuntur sief: Græci hæc vocant ἑγγονάδεα; illa verò ὀζονάδεα. lib. 9. simpl. & 4. de comp. med. loc. cap. 5.

Colobomata, Græci vocant partes, quæ in labiis aut

narium

narium alii, aut auribus deficiunt, & decurritur. 14. meth. cap. 16. Alias curta vocantur, & mutila.

Colon, intestinum quintum in ordine, secundum autem ex crassis. 6. de anat. adm. cap. 9. Dicitur verò Colon, i.e. laxius intestinum, quod excrementa ex chylo segregata, suscipit, lib. Introd. c. 11. quod & pingue intestinum appellat Galenus, 2. de sympt. caus. cap. 5. Unde propter sui latitudinem id ipsum solum, quidam ventrem inferiore appellant. 4. de rat. vi. 112.

Columella, sive Uva, & Columna, sive Gargareon, & Uva, γαρύγι, caruncula est membranosa, in fine palati, à faucibus dependens, vocis instrumentum, quod hiante ore conficitur. lib. finit. med. Vide Gargareon, & Staphyle.

Coma, i.e. sopor, sive propensio & delatio in somnum, est, cum vigilare agri nequeunt, habentes oculos conniventes, & alto somno detinentur. com. 1. in 3. de morb. vulg. 7. Vide Caros. Hippocrates verò Cataphoram, omnem ad somnum propensionem, Coma appellat; est enim in somnum delatio, nequeuntibus infirmis, vigilantium munia obire, sed tunc palpebras claudere cupientibus, cum dormire sperantibus: cum autem agri clausis palpebris dormire nequeunt, sed plurimum vigilant, Coma ἀγρυπνῶδες, i.e. pervigil & non somnulosum vocat. com. 1. in 1. prorrhet. 1. Aliquando Coma pro marcore sumitur, 4. de san. tuend. cap. 4. Marcere enim, torpere significat, atq. languore & inertia teneri. Unde Celsus, de Lethargo, dicit: Marcore est & inexpugnabilis dormiendi necessitas, & comatosos proin, somnolentos, & inertes appellat. Vide Sopor.

Comitialis morbus, est omnium corporis partium, ex temporum intervallis facta convulsio, cum mentis ac

sen-

sensuum oblesione: aliàs Epilepsia dicitur. 3. de loc. aff. & de differ. morb. cap. 5. Quin etiam morbus magnus, morbus facer, affectus puerilis, & Hercules dicitur. Puerilis quidem, quoniam pueritia tempore sevit; Hercules, non quod Hercules eo vexatus fuerit, sed quidam morbi sevitiam exprimere volentes, nomen hoc magnitudinem significans, Herculeam effinxerunt. com. 6. in 6. de morb. vulg. 7. Dicitur quoque puerilis, cum à pueritia incipiens, fere semper consenescat. Latini Comitalem dixerunt, quod in comitiis, & hominum frequentia maxime, egros corripit.

Commisura, quæ & Sutura dicitur, Synarthrosis species est, & osium compositio, ad consuturam rerum similitudinem, quæ & serrata dicitur, cum, serræ modo, contrario occurſu congregiuntur, ubi dentata alterius partes, in alterius sinus committuntur. lib. de osib. in proem.

Communis, sive universalis morbus, Græcis πᾶσι νόσος, est, qui multos in communi invadit: cui oppositus est morbus, qui dispersus, sive Sporadicus dicitur, qui aliquos separatim tantum invadit. Inter communes, alii sunt publici, quos vocat Endemios, sive collactaneos, & vernaculares, in quo genere Scorbutus est; alii vulgares, seu publice grassantes, quos Epidemos, seu Epidemios vocant, ut est Pestilentia. com. 1. in 1. de morb. vulg. in argumento. Vide fusiùs in verbis, Pandemus, & Epidemus.

Communis, sive media cubiti vena, est, quæ communis ei, quæ humeralis nominatur, & ei, quæ per axillam ad manum fertur, 2. de loc. aff. cap. 7. quæ & mediana, & corporalis, & purpurea, & nigra dicitur. lib. de anat. viv. Vide Media.

Com

Compages, capitũ sunt sutura, quæ parte ossa capitũ inter se mutuo cõpacta, coaptantur. Calvaria enim ossa aded exquisitè inter se conjunguntur & coaptantur, ut ipsorum conjunctio per harmoniam facta, merito sutura, ex pannorum, qui consuuntur similitudine, dicatur. com. 3. in lib. de iis, quæ in medic. sunt. 36.

Complexio febrium est, quando duæ febres simul ægrotum corripientes, horis differentibus invadunt: confusio autem, quando eodem tempore inceperint. 2. de differ. feb. cap. 8.

Compositus morbus est, qui ex pluribus accessionibus, & remissionibus, sive ejusdem generis, ut duarum vel plurium tertianarum, quotidianarum, vel quartanarum; sive diversi generis, ut unius tertiana cum quotidiana, vel cum quartana, constat: cui oppositus est morbus simplex, unam genere intensionem & remissionem faciens. lib. de Typis, cap. 3.

Compressio, est laterum cujusque, vasis adstrictio, & angustatio per coalitum, 1. de caus. sympt. cap. 5. differens ab obstructione, (quæ & oppilatio dicitur, 2. de caus. puls. cap. 1.) quippe hac est meatuum nostri corporis interclusio, ex aliquo tumore, vel corpore interposito, non per coalitum, lib. de diff. morb. c. 7. Illa autem imprimis ab externis oritur causis. E. G. Compresso extrinsecus nervo, angustia meatui ejus contingit. 1. de sympt. caus. cap. 5. & de differ. morb. cap. 5.

Compunctio, est perforatio, quæ acutis suffusis. 10. de usu part. cap. 6.

Concava vena, est vena porta. 5. de loc. aff. cap. 3. Vide Vena porta.

Conceptio, sive seminis comprehensio, motus est

F

quidam contractionis uteri, dum semen in se ipsum ejaculatum, avidissime manu veluti quādam amplectitur. lib. An animal sit id, quod utero geritur? cap. 2.

Concoctio, est ciborum à ventriculo, in convenientem & familiarem animali qualitatem alteratio: quā concoctio, si tarda, & agere, longiorq; iusto tempore fiat, Bradypepsia; si autem in alterā qualitatem, nec in eam, quā sit secundum naturam, fiat mutatio, Dyspepsia; si verò nulla fiat alteratio, sed quales sunt assumpti cibi, tales in omni qualitate manent, & dejiciuntur, dicitur Apepsia. lib. de sympt. diff. cap. 4. Alteratio ipsa, usque-quod alimentum, in similitudinem partis, quā nutritur, transmutatur, concoctio; ubi verò jam parti apponitur, nutritio dicitur. 8. de compos. medic. loc. cap. 6. Concoctio eorum, quā prater naturam sunt, est ipsa maturatio morbi; at ipsa concoctio, in coquentis substantiam deductio quādam est ejus, quod concoquitur. com. 2. in 1. de morb. vulg. 44.

Condensantia medicamenta omnia, frigida sunt, & aquea, quare poros cutis, & meatus, in unoquoq; corpore condensant, & contrahunt. Caterum, instrumentum undiq; totum constringere nequeunt, unde & Pycnotica dicuntur; differuntq; à siccantibus, quod frigida & sicca sint; ab obstruentibus, quod frigida & crasse sint substantia. 5. de simpl. cap. 14. Vide Obstruentia.

Condyloma, quasi dicas Nodus, est extuberatio, quā cum phlegmone in rugosa contrahenteq; se se ani parte exurgit, lib. finit. med. quā & Thymus dicitur, 14. meth. c. 3. Est quoq; Condyloma, carnis excrescentia callosa in digitis manuum & pedum, in sede item, ac uteri orē coalescens: sic dicitur tumor hic, quod prominere in modum articuli, quem Condylon appellant; sed hic affectus in sede præ-

præcipue oritur, rugā aliquā corporum in ano reduplicatorum insurgente, ac prater naturā intumesciente. Quum enim sinuosus sit anus, rugas coagmentatas habet; ubi verò amplius intumuerit, tunc fit Condyloma, & aliquando citra inflammationem fit, & molle est; quandoq; verò cum inflammatione, tumq; durum est, & dolorificum. Gal. 1. de ossib. cap. 5.

Condylus, i.e. Tuberculum, seu Nodus, est gibba osium radii & cubiti explantatio, quā carpo dearticulatur; ob id etiam aliquando Capita dicuntur, & Apophyses, 2. de usu part. cap. 2. Dicuntur & Epiphyses, i.e. ossium capita; ubi enim os medullam habet, ejus finibus, utrinq; caput, instar operculi cujusdam, ut plurimum vides adnati. 10. de usu part. cap. 18. Vide Nodi, & Articuli.

Confusio febrium. Vide Complexio.

Congelationes, passionēs omnes dicuntur, quā à causa frigida, & vehementibus algoribus ortum duxerunt. lib. de differ. morb. cap. 5. In specie Catalepsin & Nervorum rigorem sic vocitant.

Conia stacte, i.e. Lixivium destillatum. 1. ad Glauc. c. 3.

Conjectura artificiosa est, quā propè ad veritatem accedit. 1. de cris. cap. 9.

Conjunctiva oculi tunica. Vide Rhagois.

Conjunctiva & continens causa. Vide Continēs.

Conoides corpus, sive Turbinatum, quod & Conarium dicitur, cerebri particula est, veluti firmamentū quoddam, venis, à magna vena cava propagatis, adjacens. lib. 9. de anat. adm. cap. 3. Ejus substantia glandula est, figura cono perquam similis; unde ei nomen quoq; est impostum: utilitatem autem ejus eandem esse existimant aliqui, quā est Pyloro ventriculi; nam ut hunc confirmant

esse glandulam, prohibereq; ex ventriculo cibum prius, quam is coctus sit, in tenue intestinum transsumi, ad eundem modum & hanc glandulam Conarion, in principio meatus ejus, qui spiritum ex medio ventriculo in Parencephalidis ventriculum transmittit, constitutam, custodem quandam esse ajunt, & velut Oeconomum, non plures spiritus de sese emittens, quam quantum spiritus mitti oportet. 8. de usu part. cap. 14.

Connutritus morbus est, qui longinquo tempore hominum corpora infestat, atq; his veluti connatus est. com. 5. in 6. de morb. vulg. 6.

Consistentia urinæ, hujus est tenuitas, & crassitudo. 9. meth. 4. Eandem Arabes vocant Urinæ substantiam.

Consistentia, seu status Paroxyismi, αὐτὸν, est illud tempus accessionis febrilis, cum jam caliditas materiam conviceris, & usq; aded calor augetur, ut non modò locum exurat, in quo est putredinis focus, sed etiam continuatim per totum corpus dispergatur; deniq; cum jam ad summum fervoris devenerint humores accensi, id accessionis tempus consistentia appellatur; tunc verò universum laborantis corpus, igneum redditur, extensum per totum animalis corpus aqualiter caliditate. 2. de differ. febr. c. 11. Vide Ascensus morbi.

Constitutio, κατὰ κράτος, luxari corporis in propriam sedem collocatio est, restitutio, & repositio. 3. de fract. 38.

Contenta, ἡρόσθη. Vide Continentia.

Contentiva causa. Vide Continens.

Contentus pulsus, idem est ac vehemens. 3. diff. puls. 5.

Continentes causæ (quæ continuæ, & conjunctæ dicuntur) sunt, quæ cum præsentibus sunt, morbi quoq; adsunt; cum tolluntur, morbi etiam discedunt: aut (ut in

Scholis dicunt) quibus positus, ponitur; sublati verò, tollitur morbus: ut, spina, telum; opponuntur Evidentibus, seu Procatarteticis, & Antegressis causis, quæ postquam adversam valetudinem creârunt, secedunt & separantur ab ea: ut, labor, Solis ustio, cruditas. Concausæ sunt, quæ affectum suum vi sola generare licet possint, generant etiam, & alteri coherentes, unde Synæctia dicuntur: ut, lapis in vesica, & inflammatio; nam amba urine suppressionis causa sunt, licet per se, earum utraq; illam generare possit. Coadjutrices causarum partes sunt, quæ suâ virtute morbum efficere non possunt, sed alteri auxiliantur; ut libido articulare morbum promoveret. Præcedens causa interna est, quæ ab evidentibus vel preparatur, vel coadjuvatur; ut, sanguinis abundantia, nutrimenti soboles est. lib. Introduct. cap. 8.

Continens febris. Vide Synocha febris.

Continentia, ἡρόσθη, vocat Hippoc. solida corporis membra, ut quæ comprehendant, regantq; humida; Contenta autem appellat humores; ut qui à solidis comprehendantur, quæ cum impetu feruntur substantiæ, spiritus; si quidem in omnem corporis partem momento temporis, & facili, & citra impedimentum perveniunt. lib. de trem. & palp. cap. 5. Continentes ergo partes erunt, E. G. corpus solidum cordis, arteriarum, & aliarum partium carvarum, atq; aliquid suo sinu cöcludentium, quæ sunt bases, radices, & fundamenta aliarum; in ipsis enim singulis triplex adest substantia, verè ipsa solida, circumfusa alia, carnosa munies, & fovës, & per utramq; sparsa spirituosæ.

Continua febris, συνεχὴς πυρετός, est, quæ ad infestationem, antequam ex toto solvatur, non devenit, etsi declinatio aliqua & remissio sensibilis appareat; cum verò

declinatio aliqua sensibilis non fiat, semper verò à primo principio febris, usq³, ad crism similis perseveraverit, erit febris deurens, ardens, homotonos, Caulon, à continuis, solà acutie differens, (qua enim idem cum genere nomen sortiuntur, atq³, in pluribus particularibus accessionibus continentur, continuæ vocantur) quæ & Synocha appellatur; alia quidem Epacmaistica, sive Increfcentis, sive Anabatica; alia Homotona, sive Acmaistica, in eodem semper vigore & tenore perseveras; ultima Paracmaistica, sive decrefcentis. 2. de cris. 6. & 2. de diff. febr. cap. 2. Bisariam Veteres Continui nomine, & Intermittentis appellatione uti videtur; Nam Continuas vocant febres quandoq³, omnes, quæ nullum tempus liberum habet accessione; quandoq³, non omnes, quæ accessione nunquam vacant, sed solas præcipuè illas, quæ omni carent, usq³, ad iudicium, mutatione. Ita Intermittentes interdum appellant illas solas, quæ accessionem perpetuam non habent; interdum eas, quarum equidè non recedit accessio: insignes autem sunt mutationes singularum accessionum, in initio, incremento, vigore, & remissione. At Medici quidam iuniores, quæ non magnam mutationem habet, non Continuas, i.e. Synochas, sed Synochos nominant; Continuas autem has solas, quæ non veniunt ad integritatem, & intermittunt, singulis accessionibus, has vocant Antiqui interdum Continuas, interdum Intermittentes; nam sunt rectè inter Continuas & Desinentes in integritatem, media. Proinde rectè, ubi cum Synochis conferuntur, Intermittentes appellantur; cum in autem, quæ ad integritatem veniunt, Continua. com. 3. in 1. de morb. vulg. 2.

Continui solutio, ἀνέκτασις. Vide Unionis solutio.

Con-

Contractiones. Vide Ganglia.

Contraindicare. Vide Endixis.

Contraria, apud Hippoc. & Medicos sunt, nō in corporum modò qualitate, ut calidum frigidum, humidum siccum; sed in quantitate etiam, ut magnum parvo, laxum denso, plenum vacuo, quæ Aristoteles opposita vocat; & hoc sensu dicunt Medici, curationem fieri per contraria. 11. meth. c. 12.

Conturbatio, seu Perturbatio, ταραχὴ. Vide Taxis.

Contusio, θλάσις est, cum grave aliquid, supra corpus durum aut molle incidit, ac id ipsum collidit, ita ut carnea pars disrumpatur; cum verò caro confusa, in loco sub cute, cruorem contraxerit, sine ulla cutis divisione, exuccatio, sugillatio, effusio, nigror, & nigritia affectio hæc dicitur; venas tamen exiguas, simul cum carne rumpi, ac discindi in huiusmodi sugillationibus, est perspicuum. 3. de his, quæ in medic. fiunt. 30. lib. de tumor. cap. 105. & de compos. med. per gen. cap. 3. Vide Collisio, & Unionis solutio.

Convexa hepatis. Vide Sima.

Convulsio, κράσις, cum omnes arbitrarii motus, musculis obeantur, quando hi, ad sua ipsorum capita retracti, unamquamq³, particulam, cui inferuntur, simul attraxerint, si affectus aliquis p. n. in tensionem musculos ducens, iisdem acciderit, hunc motus sequitur, similis quidem naturali, sed citra voluntatem, & vocatur affectus Convulsio, lib. de trem. & palp. c. 8. quam convulsionem Celsus lib. 2. cap. 1. vocat nervorum distentionem; quæ vel universalis est, (ut, cum totum corpus curvatur, aut in anteriora, & dicitur ἐμπροδόνος, aut in posteriora, ἐπίδόνος, aut in utramq³, partem equaliter, τέρων, quibus additur & τὰ μέρη) vel particularis, aut in musculis oculorum, & di-

citur *σταβιουός*, aut mandibula, *τενοουός*, aut oris, *νωουός*, aut penis, *σάβγαιος*. Vide Rhegma, & Unionis solutio.

Convulsio canina, *σασουός* *νωουός*, est affectio musculorum maxillarium, per quam, os, nasus, oculus, labrum, atq; adeo dimidia faciei pars, in obliquum inorquetur. Alias vocant oris torturam. 4. loc. aff. c. 2. versùs finem.

Convulsio comitialis, aliud nihil est quam Epilepsia. 5. de loc. aff. 5. & 3. de loc. aff. 7.

Convulsivum affectū vocat Galenus, qui ante mortem, necessariò convulsioni habet symptoma. 1. de prasag. ex puls. c. 4. & com. 3. in 1. prorrh. 69.

Convulsiui, & vibrati pulsus sunt, qđi naturali sede relicti, unum locum non tenent, sed sursum atq; deorsum agitantur. In vibratis, arteria quadam partes, quasi jacula superiora petere, quadam demitti uno eodemq; tempore conspiciuntur. 1. de diff. puls. c. 28.

Convulsivus pulsus est, in quo ad utrumq; terminū tenditur arteria, quē convulsio sequi solet. 2. de caus. puls. 12.

Coopertoria cartilago. Vide Cricoidē.

Cophosis, *νώφωσις*, i.e. surditas, est abolita auditus actio, inducta ab iis, quae vel ipsam audiendi facultatem, ejusq; primum instrumentum, (quod est animalis spiritus, in aures affluens) aut ipsius organa, quae natura ad audiendum comparavit, ledunt.

Copos, i.e. lassitudines, Graci vocant affectus, ex multo vehementeve motu corporis vel torius, vel particularum, quae justò plus laborarunt, obortos: undē Acopa medicamēta, quae talem lassitudinem tollunt. 7. de comp. med. per gen. cap. 11.

Copula, Ligamentum, Gracis *συνδευός*, terminus
mūa

musculi est, sensu omni carens, durior & crassior nervo, & tendone, usum eum, quem vel nomine ipso prae se fert, exhibens; differt à Nervo, quòd Nervus, à cerebro, vel spinali medullā exorsus, sensum aut motum membrīs inducit; Tendo verò finis musculi nervosus est, ex Copula, & Nervo prognatus. 1. de placit. cap. 9. com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. Vide Nervus.

Cor, *ναρδία*, est viscus, carne compactā, durā, fibrosā, cavā, constans, principium vitalis facultatis. Sunt qui musculum esse definierunt; verū & minùs rubet quā muscululus, & longē durius, spissius, solidiusq; est, multoq; aliter fibrīs intertextum; fibrīs namq; validis & rectis caro ejus circumfusa est, (undē & Parenchyma, nomine quoq; aliis visceribus communi, appellatur) à basi ipsius, in mucronem tendentibus, arteriarum & caloris nativi, quo animal regitur, quasi fons & domicilium, in medio omnino thorace situm, praesertim suā basi, quam caput ejus nominant, mucrone ad partem lavam vergente. 6. de usu part. & 7. de anatom. adm. Vocant adhuc & Cor, Veteres omnes, os ventriculi, propter affinitatem maximam, quae illi est cum corde, & mutuū consensum: ut ostendit Gal. 2. de placit. & 5. loc. aff. 6.

Coracoide. Vide Ancyroide, & Acromion.

Coryphe. Vide Vertex.

Cornea, sive Corniformis, (*νεφαιοειδής, χιτών ή βύλη*) oculi tunica est, tenuis, dura, & densa, quae à dura cerebri meninge proficiscitur, & tenuem oculi tunicam choroidē in orbem amplectitur, quae & Ceratoide, 10. de usu part. cap. 3. quin & Cærulea dicitur, estq; tunica secunda oculi, h.e. proximē subjecta, adnatā tunica, quam *επιεστρά* appellant. Vide Cærulea, & Ceratoide.

Cornicularis processus. Vide Ancyroide.

Corniformis. Vide Cornea, & Ceratoide.

Cornua, κέρατα, numerantur inter affectus prater naturam: sunt autem duæ eminentia ossæ, quæ prope tempora nascuntur; dicuntur alias Dionysisci: sunt & cornua vulvæ, sive sinus, duo processus insignes, à lateribus vulvæ, ad utraq; illa, quos alii vocant Cirros. l. de vulvæ diss. c. 3. Vide Apices matricis.

Corona oculi. Vide Iris, & Stephanos, ἑρπιδόν.

Coronale os, ut Coronalis futura, στεφανιαία φάσις, στεφανιαίων ὀστέων, sunt futura anterior cranii, ab uno temporum osse ad alterum transversim perveniens: sic etiam os frontis, coronale dicitur, quoniā aut eā capitis parte, ubi id ipsum consistit, corona gestari solent, aut quoddam orbem frontē cingant. 9. de us. part. 2. de ossib. c. 1. 6. de anat. adm. cap. 1. Inde & Coronalis vena, στεφανιαία φλέψ, propago est, veniens à magno trunco venæ cavæ sursum ascendenti, cingens cordis basim in modum coronæ, eidemq; alimentum advehens. Est & alia vena cavæ propago, quæ Coronalis stomachica, στεφανιαία στομαχική appellatur, quæ à ramo splenico venæ cavæ proficiscitur, & ad stomachum effertur, ibiq; bipartito ramo, majore, seu coronæ stomachum totū cingit, minore ad pilorū descendit. Quemadmodum autem à venâ cavâ coronalis hæc vena proficiscitur, sic à magnâ arteriâ statim, ubi à corde orta est, arteriæ duæ coronariæ prodeunt, major sub valvula dextrâ, minor sub postica, quæ in cordis superficiem, & ejus partem crassiore, perinde ac venæ, distribuuntur. 7. de anat. adm.

Coronæ, sive Coronon, est extremitas ossis, hujusve pars ultima, quæ in mucronem desinit. l. de ossib. in proom. Unde omnes apophyses rotundas appellant Coronas, vel

Coronos, κορώνη, κορώνων: sic autem dicitur, quia τῆς κορώνης, h. e. cornicis rostro similis sit. Quæ autem apophysis in caput crassum & rotundum desinit, non Corone, sed Auchē, Γρακίς αὐχῆς, nominatur. 2. de usu part. c. 14.

Corrugatio pupillæ. Vide Tabes oculi.

Coryza, gravedo, κόρυσα, tenuis & incoctus humor aqueus est, qui per nares secernitur; quæ ipsa defluxio, cum per palatum sit, dicitur catarrhus. 2. progn. 49. Est autem hic humor, non σκωδός, sive crudus, sed ἀπενήθ, h. e. liquidus & tenuis. Celsus autor est, & destillationem, & gravadinem κόρυσας Hippocratem appellasse. Catarrhum appellamus, cum quod supervacuum est in cerebro, in os defluit; Coryzam, cum in nares. Bronchos autē sive raucitas catarrhū supervenit, faucibus scilicet humore imbutis; quod si in Gargareonem fluxio decumbit, quam ex similitudine Græci staphylen, i. e. acinum vocant, in ea gignit, aut aliās eam in tumorem attollit, at si glandulas, antidas, aut eas, quæ in proxima sunt, Paristhmia. 3. de sympt. caus. cap. 4.

Costa extrema est, non parva illa reverà spuria, quæ ab aliis discedit, & carnosæ parti septi transversi obducta est, sed ipsi proxima, cui manifesta jam membrana tenuis, intus subtenditur, ei continua, quæ omnes costas subiungit. 5. de anat. adm. 3.

Costæ, ossa pectoris sunt, quæ à collo toto, ad ilia usq; ex anteriore parte, ad utrumq; latūs protenduntur. lib. introd. cap. 10. & 3. de artic. 37. Duodecim ut plurimum numero sunt, ex quibus superiores septem simpliciter πλοσσοὶ dicuntur, quinq; verò reliquæ costæ inferiores, πόδαυ vocantur, h. e. spuria, & illegitima, quia imperfectæ sunt.

Coryle, κορύλη. Vide Articululus, & Acetabulum.

Cory-

Coryledones, *κωρυλλόδες*. Vide Acetabulum.

Coxa, quæ & Ischion, magnum femoris osis capit est, Græcè *ἰσχίον*, i.e. coxa appellatur, veluti cavitās ejus, acetabulum dicitur, 2. de fract. 70. Unde affectus fit, qui Ischia & Coxendix appellatur. Inde Ischiadici & coxarum, i.e. coxæ morbo laborantes. 7. de compos. med. per gen. cap. 16. Ischion aliquando significat, ligamentum ipsum, quo femur coxendicis acetabulo colligatur; interdū verò ipsum articulum; quin & Ischia *ἰσχία* dicuntur à quibusdam, partes carnosæ ex utroq; sacri osis latere, (aliàs *ὀστέα* à Græcis, à Latinis clunes appellantur.) Os autem coxendicis, est apophysis osis sacri, ad coxendicis acetabulum undiq; pertinens. Os enim sacrum, quā parte femoris caput ei inferitur, Ischion vocatum est.

Cranium, Calvā, Calvaria, *κράνιον*, est os capitis crassum, rarum, rotundum, osibus septem compactum, sutureisq; veris tribus, coronali, lambdoideā, & sagittali, distinctum, cerebrum continens, atq; utramq; meningem ambiens, sic dictum, quòd quasi *κράνιον*, i.e. galea cerebri adiaceat. 8. de usu part. cap. 9.

Cralis, Græcè *κρανίος*, & *κρανίου*, temperiem significat. 1. de natur. hum. 12.

Crassa membrana. Vide Membrana dura.

Crassa vena, i.e. humeralis. 1. de artic. 53.

Crassus pulsus. Vide Gracilis.

Crea. Vide Tibia.

Creber pulsus est, cujus, intermedia quietis est brevis tempus; rarus, cum longum. 4. de puls. ad Tyron. c. 4.

Cremasteres. Vide Testes.

Cremor, idem est ac chymus, *χυμός*. 3. de natur. facult. cap. 4.

Cremor prisanæ est, ubi à decoctione, quis prisanam colaverit, deinde cremorem, à decocti parte aquosā separaverit. 1. acutor. 26.

Cricoides cartilago, est laryngis cartilago, basim annuli figuram representantem efficiens; tribus enim cartilaginibus constat larynx, quarum prima maxima, cujus convexum extrā protuberans pomum Adami vocatur, concavum intus, quæ dimidium totius capacitatis laryngis comprehendit, ad formam scuti, unde hanc Anatomici Thyroidem, i.e. scutiformem, alii peltalem, quòd peltæ formam agat, nominant. Posterior, quæ basim Cricoidem, i.e. annuli figuram imitantem, efficit, postrema ipsius aspera arteria cartilagini, literam Σ imitanti, incumbit, scutiformi verò in priori sui ipsius parte subjacet, (quæ & Cricoides, Cymbalaris, & Coopertoria dicitur.) Reliqua ab his cartilago, tum positione, tum magnitudine tercia, in suprema Cricoidis, quæ & Innominata dicitur) cartilaginis parte sita est, gutturniis, infundibulū, quæ Arytænes vocant, similis; unde & Arytænoides dicitur. Quæ autem à radice linguae exoritur, quam Epiglottida, quasi superligulam dixeris, non est bronchi propria. lib. de vocal. instr. diss. cap. 4. & 7. de usu part. cap. 11. & lib. de anat. viv.

Crimnoides urina, *κρῖναις*, cujus sedimenta criminoides sunt, i.e. talia, quæ speciem furfuris, vel spumæ reserunt, significantq; sanguinis cremationem, si rubea sedimenta sunt; vel solidorum nimiam liquationē, si alba. lib. de urinis, cap. 29. Vide Hypostasis.

Crisis, sive Judicium, sive Judicatio, *κρίσις*, apud aliquos, est subita, in morbo, in melius pejúsve, ad vitam aut mortem, mutatio; apud alios est ea, quæ antecedit judicium,

cium, humorum agitatio; apud alios, integra totius morbi solutio; apud alios, illa tantum morbi solutio, quæ ad bonum fit. 1. de cris. cap. 1. Sed ea, quæ repente fit, per excellentiam Crisis dicitur, & à naturâ, ea, quæ præter naturam sunt, superante, perficitur. 3. de cris. cap. 1. Judicatio per morbos, de foro translata appellatio, dicta est, significans, præcipitem in morbo mutationem, cum quadam evidenti evacuatione, vel abscessu; quæ quadrariam exsistit: aut enim statim vindicantur à morbis, aut magnam obtinent in melius mutationem, aut statim moriuntur, aut multo deteriores evadunt. Itaque duas primas judicationes, absolute proximas duas autem magna ex parte cum adjunctione, valâ aut pravam judicationem, quandoque, verò, sine adjunctione simpliciter sic vocat. 3. prognost. 1. Uritur item Hippoc. Crisi pro λύσις, i.e. solutione morbi, ut, in progn. optimam eam dicit esse urinam, in qua per totum morbi curriculum, donec ipse judicatus sit, subsidet album, leve, & æquale. Tertia adhuc est ejusdem nominis significatio, quâ significat crisis, motum vehementem naturæ pro cuiuslibet rei molesta depulsione, secundum quam non modo morbi, sed & conceptiones, & abortiones, & partus, & omnino quæcunque magno conatu naturæ indigent, dicuntur judicari & per crisis solvi. lib. de sympt. par.

Crisis alima est, quæ à nullo dierum indicantium aut signo, in illis apparere solito, prædemonstrata fuerit & indicata, 3. de cris. 10. ubi huiusmodi crisis perhibetur. Periculosa, quæ cum gravibus symptomatibus accedit: Infida seu incerta, cum morbi recidiva contingit; Obscura, quæ citra excretionem, vel abscessum evidentem evenit: Absoluta crisis autem est, quæ in morbo nihil facit reliqui. 1. dier. de cr. cap. 2.

Crisis

Crisis imperfecta, quæ non omnino à morbo liberat, 3. cris. 7. sed ex morbo quippiam relinquit. 1. dier. de cr. cap. 2.

Crisima signa, i.e. decernentia & judicantia. 1. aph. 12.

Crithe, i.e. Hordeum, sive Hordeolum sive Posthia, & oculorum tuberculum. de remed. par. fac. cap. 10. Vide Hordeolus, Posthia, Chalazia.

Crotaphite, ῥοταφίται, i.e. temporales muscoli, qui maxillam inferiorem movent, & sursum trahunt. lib. de musc. diss. cap. 6. Vide Manducatorii.

Cruda urina. Vide Aquosa.

Cruditas, ἀσάρως est, cum ventriculus, vel proprio morbo, vel vitiosis humoribus in ipso accumulatis, vel pravam alimentorum ob qualitatem, ut nidorofam, acidam, ferocem, aut putredini, aut corruptioni obnoxiam, aut ex preparationis modo, ad huiusmodi aliquam dispositionem deducta, cibos non amplectitur, sed in ipso corrumpi eosdem finit. Differt ab Incoctione, quæ est rerum, quæ non possunt concoqui, ut acinorum, & omnium, quæ omnino integra, & omnino non mutata rejiciuntur. 1. de loc. aff. cap. 3.

Crudus humor, αἷος χυμός est, cum alimentum, suam naturam, in ventriculo, hepate & intestinis quam diutissime servat, nullâ alteratione, ex particulâ, quæ ad ipsum concoquendum est destinata, susceptâ; vel, cum transmutatio fit, sed in peregrinam qualitatem. 8. de compos. med. loc. cap. 6. Humor crudus, pituita crassior est, ac minus flatulenta, qualis in urinis subsidet, iis præferim, quæ ex edacitate sedimen multum, sabacea pulcritudine simile, obtinent: quin & corporibus iis, quæ ab exercitatione abstinuere, cibis verò quàm plurimis, ac balneis post sumptos cibos utebantur, sæpe ejusmodi humor conferimus per album descendit, sed & unâ cum hoc humore, perindè

ac

ac cum pituitâ, decolor quædam in toto corpore subest albedo, qui crudus humor inappetentes homines efficit. lib. de multitud. cap. 11.

Crura, Græcis à currendo, (quodd cruram ministerio curramus), aut à Græco verbo κέρω, quodd inter ingredientium hinc atq; illuc ferant, Græcis κνήμης & κνήμης dicuntur extremæ corporis partes, quæ thoracem medium, & inum ventrem prætergrediuntur: ut, quicquid prominet ultra os sacrum, & carnosos musculos ibi subiectos infernè, usque ad pedes, id crura dicantur. Dividit hæc Galenus in partes tres, eis κνήμης τῆς καὶ κνήμης, καὶ πόδα. Κνήμης etiam dicuntur tibia in rota, à similitudine tibia in animalibus. lib. Introd. cap. 10.

Cryforchis, κρυφορχίς, i.e. testiculi, aut testiculorum occultatio, vel recessio. lib. finit. med.

CrySTALLINUS humor, κρυσταλλίνος ὕγρον, & CrySTALLOIDIS, (qui glacialis adhuc dicitur, quodd concretam glaciem imitetur, 7. de placit. cap. 5.) est humor albus, splendidus, lucidus, non omnino rotundus, sed aliquantulum planus, in medio oculorum situs, primum depressus & videndi instrumentum, qui per διαδοχὴν, i.e. transsumptionem (non per venam quidem, quæ nulla inest) vitreo humore nutritur. Cui adheret vitreus oculi humor, qui & Hyeloides dicitur, quiq; quantè crassior & albior est sanguine, tantè à crySTALLINO humore, humiditate, atq; albedine superatur: subest huic Albagineus, albo ovi similis, quem Hydaroidem, quodd aquæ sit similis, vocant. 10. de usu part. cap. 1. lib. de ocul. cap. 2. & Introd. cap. 11.

Citr, κτῆς, muliebris pudendi sinus, pilis decoratus, appellatur: quæ sinum ambiunt, κτῆς, i.e. alæ vocantur. 15. de usu part. c. 3.

Cubi-

Cubitus, (ἀγκών, ἄγος, ὀλέκων, πῆχυς, ὠλέκων) est os, quodd inter Humerum, & Carpum, quodd brachiale dicitur situm est; ejusdemq; partis os grandius. Cubitus item dicitur, qui alteri subest osi, quodd Radium nominant, lib. de osib. cap. 17. quem cubitum Pechyn, i.e. ulnam dicunt, 2. de usu part. 2. Clarius: Cubitus, Pechys, πῆχυς, seu ulna, Arabibus focile majus, est ea pars totius brachii, quæ superne terminatur, quæ brachio quidem continua est, per articulum, qui in curvatura cubiti est, cui innititur; infernè autem, quæ Carpo, manus extrema conjungitur, quo in spatio duo ossa recipiuntur: alterum magnum, & rotundum, nominatum eodem nomine, quo pars, i.e. cubitus; alterum, quodd Cerchis, Arabibus focile minus, i.e. Radius appellatur. 2. de motu muscul. cap. 2. & 1. de fract. 18.

Cubiforme os, quodd κυβοειδὲς ὄστρον dicitur, est os, quodd ab externis pedis partibus, firmum in terra statuitur, externisq; tarsi partibus est locatum; & articulatur cavitati calcanei, ad sinem adjacenti. 3. de usu part. 7. Est enim os unum, ex quatuor tarsi osibus, solum nomine donatum, cum reliqua tria careant nominibus; est autem os, ut reliqua tarsi ossa, intus cavum, foris gibbum, cubo simile, quodd latera sex habeat cubo communia.

Cuculus. Vide Coccyx.

Cucurbitulæ leves, quæ citra scarificationem adplantantur. 3. loc. aff. cap. 4.

Cunei os, sive cuneiforme, quodd & ὀστρεὸν σφινκτερίδης, os basilare, & os palati appellant, medium inter superiora, & inferiora totius capitis ossa. lib. de osib. cap. 1.

Cunnus, τὸ γυναικῆον, pudendum muliebre, naturâ inter ossa pubis extrinsecus locata, uterini colli capacitatis

est pelliculam quandam habens, virorum præputio correspondentem. lib. de vulva. diss. c. 2.

Curatoria, Θεραπευτική, Medicina pars est, quæ tunc factum morbum tollit, tunc fieri occurrit, tunc eum, qui imminet, aut futurus timetur, amolitur, præcavet & impendit, (quod est proprium θεραπευτικῆς.) Therapeutices autem tres sunt partes ad curationem necessaria, διαγνωτική, θεραπευτική, & προνοητική, quarum prima victus rationem instituit, altera medicamenta propinat, postrema manum adjutricem admoveat. de part. art. med. cap. 1.

Curta, κολλώματα, i.e. mutila & curta. Id autem dicitur à Græcis Coloboma, quod in labiis, aut narium alis, aut aure deficit: hujus generis sunt, & quas in majore angulo Rhœadas vocant, eo utiq; vel impensius extenuato, minoreve facto, vel prorsus abolito. Vide Colobomata.

Cuticula. Vide Cutis suprema,

Cuticularis membrana. Vide Membrana dura.

Cuticulosus musculus est, qui extrema sedis ora cuti commixtus, obtrinet, ut vel cuticulosus musculus, vel carnosus cutis dici possit. lib. de musc. diss. c. 30.

Cutis suprema, δερμὶς, & δέρμα, quæ & Derma dicitur, quasi Corium dixeris, quia excoriari potest, cujus exterior pars, Epidermis sive summa cutis corporis, sive Cuticula est, & toti superextensa, sensuq; destituta, aut certe hoc perquam obtuso pollens, quippe quæ sæpe circa dolorem facile ab ea separatur. 2. de usu part. cap. 6. & 3. meth. 4.

Cyboides. Vide Cubiforme.

Cyclifcus, sunt cava excisoria scalpæ. 6. meth. 6.

Cyllum, κύλλων, dicitur apud Hippoc. crus varum, i.e. in exteriorem partem luxatum, vel conversum, adeo ut

furat

scire processus, qui talem exterius complectitur, sine ullo stabilimento suspensus relinquatur; quamvis propriè mutuum, & imperfectum significet, ut scribit Gal. 3. de dieb. critic. ubi in ea significatione mensem κύλλων appellari inquit, qui diebus viginti novem constet, alios autem perfectos, qui triginta. Unde Cyllosum, κύλλων, distortionem cruris in exteriorem partem vocat Gal. 4. de artic. Idem tamen com. 3. dicit, nonnullos, de omni longorum membrorum distortionem κύλλων intelligendam censere, generaleq; ei tribuere significatum; alios verò eo nomine distortionem solum intelligere, in qua, in interiorem partem, membrum inclinatur.

Cyema, κύημα, factus est, cum nondum menses duos in utero absolverit, quo tempore Embryon dici nequit, sed Cyema, i.e. uteri gestatio, & conceptus, & genitura. 1. de symp. caus. cap. 7.

Cymbalaris. Vide Cricoides.

Cynanche, est inflammatio extra guttur existens; quæ & Paracynanche dicitur; si autem sit inflammatio faucibus adjacentium musculorum, dicitur Synanche, vel Paratynanche. 4. aph. 34. Propriè loquendo, Angina Græcis est inflammatio, quæ in gutture & faucium partibus & musculus externis internisq; advenit; Hippocrates verò & alii Veteres, omnes passionēs, in his locis advenientes, quas spirandi difficultas comitatur. Anginæ nomine vocant, nullo existente in pectore vel pulmone vitio; quæ in re differt Angina à Peripneumonia & laterali morbo, ex eo, quod angustia sensus in gutture est, cunctis in angina speciebus: suntq; ejusdem (exquisitè loquendo) quatuor differentie: una, ubi fauces inflammantur, altera, ubi neq; reliqua oris partes, neq; etiam externarum par-

tium nulla inflammata videtur, ager tamen suffocationis periculum in gutture persentit; tertia, quando gutturi partes, tum externae, tum internae similiter inflammantur, quarta, ubi ad anteriorem regionem, cervicis vertebra luxantur, & inde cavus apparet locus, doloremq;, quando tangitur, ager sentit. Recentiores Graci quidam, ut est Paulus lib. 3. cap. 27. & nostra aetatis Medici non pauci, inter Cynanchen, & Synanchen, inter Paracynanchen, & Parafynanchen discrimen faciunt, quod tamen Galenus lib. 4. de loc. aff. cap. 5. & 3. progn. 20. reprehendit. Inflammationem itaq;, quae in interioribus faucium musculus oritur, *Σωάχχλω* nominant, eam verò, quae in exterioribus eorundem musculus fit, *Παρασωάχχλω*: Inflammationem item, quae in interioribus musculus gutturi accidit, vocant *Κωάχχλω*; eam autem, quae in exterioribus ejusdem musculus oritur, *Παρακωάχχλω*: Vide Angina.

Cynodontes. Vide Canini dentes.

Cyphosis, *κύφωσις*, gibbositas seu gibborositas, vitium spinae est, quod à casu, ictu, & tuberculis crudis & duris, anteriorem thoracis partem distendentibus, pulmonemq;, prementibus, aliquando contingit, ut docet Gal. eo aph. quo scribit Hipp., gibbos ex asthmate, aut tussi factos, ante pubertatem mori. Vide Gibborositas. Dicitur eadem *κύφωσις*, ut annotavit Gal. 8. de artic. Opposita huic Contorsio, dicitur Lordosis, *λόρδωσις*, spinae vertebrae in anteriorem partem conversis. Vide Lordosis.

Cyrtoma, *κύρτωμα*, tuberculum in iliis appellavit Hippocr. quod & oedema ab eodem appellari solet. 2. progn. 25.

Cyrtosis. Vide Cyphosis.

Cyssaros, *κύσσαρος*, est ultimum intestinum in ordine, quod

quod & rectum dicitur, & podex est. lib. Quod animal sit, id, quod in utero. cap. 5. Vide Rectum.

Cystis, *κύστις*, *ὑποδόχῃ*, vesica, est pars membranosa, urinam à renibus excipiens, & foras excernens, exanguis, nervosa omnino, latissime distendi, & arctissime contrahi idonea, ut reliqua omnia alba, & exanguia, nervi insignibus instructa: in quam, renes, tanquam in lagenam, urinam deponunt per meatus, ureteres dictos, qui à renibus prodeuntes, obliquo itinere delati, inter ipsius binas tunicas, paulò supra ipsius os, inseruntur; cujus vesica cervicem musculus ambit, transversis constans fibris, quibus unde quaque contractu, vesicam claudit, ne urina effluat.

Cystis choledochos, quae & vesica fellis, & vesica bilis susceptiva, Gracis autem *κύστις χοληδόχῃ* & dicitur, vesica est, in cavà ipsius jecinoris parte sita, inter vena porta & cava radices, bilem ex jecinore attrahens, quam rectis fibris trahit ex hepate, obliquis retinet, transversis verò expellit, quae & ob id fellis folliculus appellatur. 4. de usu part. cap. 12. & 2. de natural. fac. cap. 9. & 9. de anatom. adm. cap. 2.

D

Dactylion, *δακτύλιος*, *ἡ δολχῃ*, i.e. podex. 1. de compos. med. loc. cap. 15. Sunt quoq;, qui rectum intestinum eo nomine intelligant.

Darlis, i.e. excoriatio, quae, cutis, à subjectis partibus scalpello deciditur & separatur. 3. de anat. adm. cap. 2.

Dartos, una est è quatuor membranis, quae testes involvunt: earum prima & intima Epididymis; post eam Erythroides, i.e. vaginalis; tertia Dartos, carnosae, Erythroide multò valentior & crassior; quarta & extrema Scrotum est. Introd. cap. 11. Mulierum autem testes, peni-

tius in vulva latentes, unicâ tantum tunicâ contenti sunt, quæ Dorta appellatur, proportionè respondens tertiatæstium virilium tunica, cæteris autem recensitis carent. de dissect. vulvæ, cap. 9.

Dasympma, oculi vitium, idem quod Trachoma, ut scribit Aëtius lib. 7.

Dearticulatio, ea est osium naturalis conjunctio, cuius ratione copulata ossa evidentem motum habent: & e-côtrâ Synarthrosis, coarticulatio, naturalis osium est commissio, quæ exiguum & obscurum aliquando, aliquando nullum motum præ se ferunt, & edunt. 2. de artic. 8. & 1. de artic. 1.

Declinatio est illa paroxysmi pars, quæ statum ipsum subsequitur, usque ad secundæ accessionis principium. 1. de cris. 3. Vide Principium.

Decrescens febris. Vide Continua.

Decretorius, sive Judicatorius dies est, in quem ut plurimum morborum iudicii tempus incidit. 1. de dieb. decret. cap. 3. Est adhuc alius dies Judicatorius incidens, sive intercalaris, in quo imperfectæ solent fieri iudicationes, ut dies tertia, quinta, sexta, nona. 3. progn. 1. Decretoria autem signa sunt, quæ salutem ægri, per crisim futuram ostendunt. 1. de cris. 7. Incidentes verò, sive Intercidentes dies differunt à Judicatoriis, & decretoriis, cum naturâ, tum usu. Naturâ quidem, quod natura sua ratione, Judicatorii perfecti sunt, (omnibus siquidem ritè factis, solâ naturâ spontè agente, in iis crises fiunt) ac numero quaternario, & septenario dividuntur; Intercidentes autem minimè perfecti sunt, & in eos, non nisi aliquo errore interveniente, crises incidunt: unde non vi naturæ, sed morbi malitiâ, aut aliquo extrâ-

neo

neo impellente, in iis crisis accidit. Atq; hinc est, ut à nonnullis dies provocatorii nominentur, quod in his natura, ad pugnam irritata, insurgat. Ufu adhuc differunt dies Judicatorii & Intercidentes, quod ad futuri vigoris & iudicii cognitionem, quaternariorum circuitus sufficiunt; ad crisim verò jam factam discernendam, num scilicet fida, aut infida sit, intercidentium cognitio conducit.

Deficiens pulsus est, qui admoventi digitos, videtur exolutus, & applicatos paulatim tenenti, prorsus desinit. 2. de caus. puls. cap. 3.

Deficiens, decurtatus, *μωχρὸν σφυγμὸς*, pulsus, qui & mutilus, & decrescēs pulsus dicitur, est, qui perpetuò diminuitur, nec minui desistit, ad quietem denique omnimodam venit, prorsusq; deficit. Qui pulsus, si iterum redit, & de integro augetur, decurtatus reciprocus dicitur. 1. de differ. puls. cap. 11. Quod si in eo nulla servetur equalitas, motusq; ipso frequenter deficiat, deficiens inæqualis appellatur. 2. de caus. puls. c. 12. Nomen autem Græci, à figuris, quæ in acutum desinunt, & à cauda transulerunt. Huiusmodi autem Pulsuum inæqualitas, *ὑστεματικά*, sive collectiva dicitur.

Deglutitio, *ἀλτοφάγος*, est cibi, & potus, ab ore in ventriculum per œsophagum descensus, larynge simul in tantum sublatâ, quantum gula deorsum trahitur, factus vi ventriculi tractoriâ.

Dejectiones, & Subductiones solet Hippoc. vocare excrementa per alvum exeuntia. 7. aph. 64. Syncera autem dejectio est, quæ unum tantum humorem, cæteris impermistum, habet. 2. prorrh. 15. Ut dejectio biliosa, solam bilem flavam egerit.

Deleterium, quod & Phtharticum, & Phthoropæum dicitur, lethale venenum est, quod ubi in animalia corpus ingressum fuerit, totum id momento temporis immutat, sibiq; simili affectione alterat, penitusq; enecat. 1. de sem. cap. 16. Tamen si verò alexipharmacum medicamentum ultra modum exhibitum nos quoq; interficiat, moderatâq; in dosi assumptum sanet, non tamē ob id deleterium censendum est. Propriissimè enim deleterium est, quod, quocunq; tempore, loco & quantitate (quantumvis in minimâ) sumptum, aptum est interficere. com. 6. in 6. de morb. vulg. 5.

Delirium, Desipientia, *παρὰ φρονέειν*, mentis alienatio, duobus modis dicitur, generaliter & speciatim: generaliter, est motus errans & depravatus facultatis animalis principis imaginatricis, aut ratiocinatricis; plerumq; in utraq; facultate consistit delirium, quatenus delirantes tū parum probe imaginando, tū parum aptè ratiocinando hallucinantur; aliquando verò in altera tantū facultate, ut exemplo illustrat Gal. lib. de sympt. diff. cap. 3. atq; tū maxime sine febre est, 1. prorrh. 1. & 4. Insanire omnes dicunt eos, qui citra febrē desipiunt; & subdit, omnes, qui mente laesi, continuè febricitant. Phrenitici vocantur, solâ febre ab iis, qui deliri appellantur, discrepantes. Speciatim verò significat *παρὰ φρονέειν* mentis alienationem cum febre; à Phrenitide verò differens, quodd hac fiat, cerebro primario affectu laborante, cum symptomatum magnitudine & vehementia. Delirium autem ejusdem febris symptoma est, atq; ex subjectis cerebro partibus affectis, imprimis verò ex inflammato Diaphragmate, originem ducit, sublato in caput acri & ferventi biliosi sanguinis vapore; neq; impetus tantos habet, quantos Phreni-

Phrenitis. 5. loc. aff. 4. Vide Phrenitis, & Paraphrosyne. Deltoides, quasi litera Δ figuram imitans, musculus est, qui superiorem humeri partem, quâ brachii caput est, regit, qui etiam totius manus initium est. 3. de anat. adm. 6. 3. Græcè Δειτοειδής sic dicitur, quodd triangularis videatur, & ad litera Δ similitudinem efformatus.

Denervationes, (*ἀναρροήσεις* Græci vocant) sunt nerveæ musculorum extremitates, in quas musculi destinant, & Tendones dicuntur. 1. de motu musc. cap. 1. & 1. de anat. adm. cap. 3. Vide Tendones.

Dentem, sæpè Hippoc. secundam colli vertebram vocat: propterea hunc processum à dentis similitudine, Odontoidem, i. e. dentiformem appellat, lib. de oss. cap. 8. Alii Pyrinoidem, productionem, à nuclei similitudine nominant, 12. de usu part. cap. 7.

Dentes, in ossium numero reponuntur, mollium cerebri nervorum participes, & ob id soli dentes, ex toto ossium genere, sentiendi vim habent evidentem, lib. de oss. cap. 5. Priores quaterni, quia secant & cibos incidunt, Tomi, i. e. incisorii ad cultri cibos incidentis similitudinem dicti, molliem in se habent: huc utrinq; canini adjacent, quodd canum dentibus sint quàm simillimi, ad dura cibaria non secanda, sed admodum cōstringenda. Ultra hos mammillares & molares, ab utroq; latere, quodd iis cibi (veluti molis, cereales fruges) attenuantur, & continentur. Ibid.

Dentes genuini, qui omnium novissimi nascuntur, *ὠντογενήες*, ut plurimum ab anno duodevigesimo, usq; ad annum vigesimum-sextum: visi aliquando sunt etiam anno octogesimo nasci, utrobq; singulares, in penitissima oris parte oriuntur; ideoq; ita nominantur, quodd nascan-

daci facta, sive intrinsecus à vitioso succo, sive extrinsecus à valentioribus medicamentis, aut igne.

Diachylon, διαχυλον, emplastrum, quod ex succis est compositum, emolliens, concoquens. 7. de compos. med. per gen. cap. 9.

Diacodion, confectio est ex capitibus papaveris. 7. de compos. med. loc. 2.

Diadosis, διαδοσις, digestio seu distributio alimenti est, cum sanguis alimentarius, ex jecinore, per venas majores, in minimas, ipsumque in corporis habitum transit. Vide Anadosis.

Diæta, i.e. victus ratio, est certa victus institutio & norma, non in solo cibo & porione consistens, verum in omnibus aliis sex rebus externis non-naturalibus, ut otio, exercitatione, Venere, somno, vigiliis, repletionem, inanitionem, animi affectibus. Gal. lib. ad Thrasib. cap. 35. Inde disciplina, quæ hanc instituit, Diæterica, διατερικῆς dicta, est pars artis Medicinæ curativa, quæ agitur ad præsentem morbum profligandos debetur. 11. meth. c. 15.

Diagnostica signa, sunt præsentium rerum, causarum morbidarum, & morborum declarativa. lib. de opt. sec. emp. cap. 5. Vide Prognostica.

Dialemma, est illud intervallum, quo febris ad infectionem venit, antequam sequens annotatio adveniat. lib. de morb. temp. cap. 3.

Diapedesis, διαπεδισις, est exiguorum vasorum apertio, aut potius eorundem tunica extenuatio, adeoque, seri sanguinis excretio, per tunicas extenuatas. 3. de caus. sympt. cap. 2. Fit ergo ex tunica rarefacta, sanguine vero tenuato, & ex gracilium vasorum ore aperto; unde transcolatur sanguis, & sudoris, aut roris more transmittitur. 5. meth.

5. meth. c. 2. Differt ab Anastomosi, in hac siquidem cum majorum venarum, arteriarumque ora aperiuntur, cum sanguis impetu, & copia ex iisdem aperis erumpit.

Diaphanes Græcè, Latine dicitur Lapis specularis, ex iis est, quæ leniter, ac sine morfu exsiccant, qui usus, ulceribus agere cicatricem admittentibus, non item malignis, ac rebellibus, conducit. 4. de compos. med. per gen. cap. 1.

Diaphoresis, διαφορσις, Latine digestionem, seu evaporationem dixeris, est, quæ humorem, qui in phlegmone obsessa inflammataque parte continetur, sub specie halitus per meatus insensibiles, educit. 13. meth. cap. 16. & medicamenta, quæ id præstant, διαφορσινῆς, h.e. discussoria, & per halitum digerentia appellantur, duplici ratione, aut humores ebibentia, velut & per cutis meatus exugentia, cum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem. 5. de simpl. med. facult. c. 5.

Diaphrattontes membranæ, διαφράττοντες ὑμενές, dicuntur membrana illæ, quæ totum thoracis spacium, à jugulo ad septum usque, in duos sinus, dextrum, sinistrumque, dividunt; vulgò Mediastinum vocatur. Vide Hypezochores, Cingentes.

Diaphragma, septum transversum est, quod & Phrenas, i.e. mentem appellarunt Antiqui; quia (ut aliqui putant) eo inflammatione affecto, mens ladatur: nam multi quidem, varios ob morbos, delirare solent; sed quæ diaphragmate p. n. affecto incidunt deliria, non multum distant à Phrenitide: nulla enim pars, cerebro subdita, præter septum transversum, perpetuum delirium excitat; itaque maximis illi videtur esse cum mente & hujus sedes (cerebro) consensus. A Platone Diaphragma vocari cepit, i.e. septum transversum; est enim musculus rotundus.

rotundus, obliquus, membranofus, & carnosus, medius inter partes nutritioni servientes, (quas peritonaeum continet) & inter spiritus organa, (quae tunica succingente concluduntur: eamq; ob rem diaphragma nominatur, quod eas partes diaphragma, i.e. dividat septum veluti mediū: quā ratione Aristoteles id ipsum succincturam appellat, 5. de loc. aff. 4. Majores nostri præcordia nominarunt, com. 1. in 1. progn. 24.

Diaphthora, est corruptio ciborum in ventriculo. 2. de loc. aff. 1.

Diapyemata. Vide Empyemata.

Diaria febris, ἡμετέρη & πνεύσας, Ephemera febris est, quae unica accessione, unoq; ut plurimum die naturali, & sola ferè natura curatur, à causa manifesta (ut, ex ira, insolatione, luctu, pugna) orta. 9. meth. 1. ait: Febrim in spiritibus accensam excitant causa, aliis febribus communes, (præter spirationem & putredinem) ira, dolor, vigilia, cura, æstivus Sol, fatigatio, bubo pertinax, studium, cruditas.

Diarrhoea, διαρροία, i.e. profluvium, copiosior est alvi fluor, sine phlegmone & ulceratione intestinorum. lib. finit. med. Per diarrhoeam vel pituita, vel bilis altera, sincera, aut invicem mista vacuatur, ab humoris copia, vel cruditate, quā aut in toto corpore, aut in certā quādam parte sedem habet, exorta: ventriculus enim multitudine gravatus, quam vel ipse colligit, vel ex aliis sese in eum exonerantibus suscipit, aut pravā aliquā qualitate irritatur, quam cruditas (quae propriè διαρροία dicitur) invexit, τῇ διαρροίᾳ infestatur, præsertim si ejus orificium, supernaq; partes valentes sint, infernae autem languida; nam si contrā acciderit, vomitiones, pro diarrhoea succedent, ut docet Gal. 3. de natur. facul.

Diarrhoea

Diarrhoea in urina. Vide Diabetes.

Diarthrosis. Vide Articulus.

Diaspermaton medicamentum est, quod ex semini- bus constat. 7. de compos. med. per gen. 7.

Dialpoleticum medicamentum est, cujus compositionem, cuminum, piper, ruta, ingrediuntur. 4. de sanit. tuend. cap. 5.

Diastole, est motus dilatationis, & elevationis arteria, ad substantiam quandam exterius attrahendam, cumprimis æream, quo nativus totius animalis calor, per immis- sum spiritum refrigeretur, quemadmodum Systole, est ar- terie submissio & contractio, ut id, quod ex humorum deustione in toto animali contractum, veluti fumida su- perfluitas est, expellatur. lib. de usu pulsuum, cap. 3. Et proin eundem præstat Arteriarum Diastole, & Systole, to- tius animalis calori, quem Inspiratio, & Exspiratio, parti- cularim calori Cordis. Ibid.

Diatessaron, emplastrum, quod ex quatuor rebus con- stat, Chalcide, Misy, Diphryge, Chalcanti. 5. de compos. med. per gen. cap. 14. Διατριάσας Græcè.

Diatrionpipereon, i.e. medicamentum, triplici pipe- ris genere constans. 4. de sanit. tuend. cap. 5.

Diatriton, i.e. tridui inedia: ut Diatritarii, qui tri- duanam inediam præcipiunt, 4. meth. cap. 4. cujus primus autor Thessalus. Διατρίτων Græcè.

Dichophyia, pilorum defectus est, quando bifurcan- tur. lib. finit. med.

Dichroma, (διχρῶν Græcè) emplastra sunt, quæ & Gilva dicuntur, coloris ambigui, 2. de compos. med. per gen. cap. 1. Sunt enim quadam medicamenta, quæ sulva vocant, quibus ubi statim reponuntur, quadam extrinse- cūs

cus eminentia fusca supernascitur, sub qua pars medicamentum profundior, plus quam ab initio fulva videtur, propterea dichroma vocant, i.e. bicolora; quidam vero eadem vocant Diprosopa, διπρόσωπα, i.e. bifacia. 2. ad Glauco. 8.

Dicrotus pulsus, διρροτός & ἀπρὸς, i.e. bis feriens, est, cum in diastole, quae sit quasi recessio, arteria, non perfecta obitur, sed cunctatur, idque pro subductionis, aut inhibiti spiritus quantitate, deinde repetitio perfecta, debita sit contractionis. lib. finit. med. Estque unus pulsus; non duo, (contra Archigenem) qui simul atque omnem distentionem efficit, se paulisper sudducit, ac mox pulsat iterum, ut intermittentium quies media, ictus interceptat, cuius dicroti contractio, congressus, vel reditus dicitur, 1. de differ. puls. 6. 17. qui post absolutam diastolen, antequam perfecte contrahatur, secundo ictum ferit, ut ex malleis incudem percutientibus, & postea resilientibus, apparet.

Didymoi, διδυμοί, 1. de usu part. cap. 14. dicuntur proprie fratres uno partu editi; dicuntur & testes, honestiore vocabulo, ut ait Galenus. Dicuntur & διδυμοί in Cerebro, de quibus vide Glutia.

Dies, apud Medicos non solum lucem, sed etiam noctem complectitur; non id tempus tantum, quo Sol supra terram fertur, appellantes diem, sed etiam illi tempora noctis adjacentia. 2. de cris. cap. 2.

Difficultas intestinorum, quae δυσκολία dicitur, 2. de facult. nat. cap. 9. proprie ulcus intestinorum est, ex mordacibile flava, atra, & pituita salsa, quam sequitur interaneorum abrasio, cum quibus paulum cruoris immixtis cum torminibus secernitur. 6. de loc. aff. cap. 2. In quibus difficultatibus intestinorum, cum adhuc incipiunt, quaedam

quaedam corpora pingua excernuntur; post hac autem, nisi finiri anticipaverint, quaedam ramenta intestinorum, (ablatâ ipsarum superficie interiore, quae membranosa existit & densa, illi, quae cutem exterius conegit, Epidermidis, i.e. cuticulæ appellatae, proportionalis:) post hac autem (dysenteria videlicet jam completâ) aliquid ex ipsa abraditur substantia intestinorum; excernuntur enim partes magna intestinorum, quas & carnes, & carunculas vocare possumus. 4. aph. 26. Talis quippe proprie dicta Dysenteria est, nomen habens a laesa particula, quam solam plerique Dysenteriam nominandam censent: etsi Hipp. atque alii, non ipsam modò intestinorum exulcerationem, verum omnem cruoris per intestina vacuationem, Dysenteriam cruentam nominent; nomen morbi, symptomati tribuentes. 4. de art. 40.

Difficultas urinæ. Vide Ischuria.

Difflatio, & Difflatus, & Perflatus, ea, quam Medici sensum latentem transpirationem appellant, quâ distantur corpora vaporosa, & humida, in vapores resoluta, alia est vaporum, alia autem, qualis aer siccus, atque talis, cum quæ videri possunt, exeunt humiditates. Adversus Lycum, cap. 2. quæ Græcis λόγῳ διαπνοῆς διαπνοῆς & ἀπνοῆς ἀπνοῆς διαπνοῆς, h.e. perspiratio, & difflatus, qui ratione comprehenditur, & transpiratio sensu imperceptibilis appellatur, quæ calidioribus temporibus, regionibus, atque libris, naturis, diaris communis & familiaris est, non parvâ substantia nostra portione, per διαπνοῆς exhalante, & contra in frigidioribus, paucâ, propter cutis adstrictionem. Vide Inspiratio.

Digiti, δάκτυλοι, quinque sunt in omni manu. Primus, Pollex, quod oppositus ceteris quatuor digitis, hæc equi-

polleat, proin *ᾠτixερα*, h.e. promanum, tanquam pro
 rota manu esset, vocarunt. Hippoc. *μεγαν*, h.e. magnum
 nominat, quamvis parvus sit, quia ceteri sine eo ferè in-
 utiles sunt, apud Arist. 4. de part. animal. cap. 10. Magnus
 Galeno dicitur, non solum viribus, sed & magnitudine;
 nam principium pollicis, ut ait, prope radium est, aded ut
 eum ferè attingat. Celfo, & Aristoteli, viribus tantum
 magnus dicitur. Secundus *ἄχαρις*, Index. Tertius, *μέσος*,
 Medius. Quartus, *περὶ τοὺς ὀφθαλμούς*, annularis, Medicus à
 Medicis appellatur. Quintus, *ὑποπόδιον*, minimus, auricula-
 ris, omnibus aliis corpore & viribus inferior. Singuli
 terna ossa continent (præter pollicem) mutuo sibi colliga-
 ta, & ordine sibi succedentia, veluti in acie; unde & *ὀστῶ-
 ναρις* à Græcis appellantur; ab aliis autem *ὀστέα*, id est, à
 turmâ equitū, quam Græci *ὀστέον* vocant. Latini, com-
 muni vocabulo, digitorum internodia dicere solent.

Dignotio, est præsentis morbi, hujus sedis item &
 causæ effectricis conjuncta cognitio. Græcis *ῥήσις* dicta.
 Præcognitio verò, est futuri morbi cognitio. 3. de crif. c. 1.
 & 1. progn. 5.

Dimotio. Vide Prolapsiones.

Diplosos. Vide Diabete.

Diprosopa. Vide Dichroma.

Difcissionses, magna vulnera solet Hippocrates ap-
 pellare, quæ lethalia sunt; ut, vulnus in Cerebro; cum ad
 aliquem ejus ventriculum pervenerit. 6. aph. 18.

Discretiva, Medicinæ pars est ea, quam Significati-
 vam Recentiores vocant, Græci *ἀνάλυσις*. 1. de his, quæ
 in medic. fiunt. 1.

Dispersus morbus. Vide Communis.

Dissimulare membrum, heterogeneum, seu compo-
 situm

fitum est, cujus quamcunque partem assumpseris anima-
 lis, toti nec nomine, nec definitione similis erit: E. G. Ma-
 nus & Facies. lib. anatom. viv. Vide Instrumentale.

Dissidentias vocat Hippoc., cum ossa, quæ mutuo à co-
 herent, ac sese mutuo cōringunt absq. articulo, ob aliquam
 lationem dissident a sese invicem ac distant: ut Cubitus, &
 Radius in brachio ad gubnū, & ad manum; in crure Tibia,
 & Sura, quæ & Genu, & Calci committuntur. comm. 3.
 in medic. 31.

Dissolutiones, animi defectus, Græci *ἀπορροιαί* vel
ἀπορροιαί vocant. 1. ad Glauc. 14.

Distentio, idem est ac nervorum convulsio: quæ est
 triplex, Opisthotonos, i.e. tentio ad posteriora, Enpro-
 sthotonos, i.e. tentio ad anteriora & Tetanos, i.e. aqua-
 lis in utramq. corporis partem tensio, 4. aph. 57. per univer-
 sum corpus qui sparguntur, nervis eventiens. 3. de loc. aff. 10.

Distorsiones sunt, cum à sua sede dilabitur aliquid
 vel in exteriorem corporis partem, vel introrsum in inani-
 tatem aliquam prolabitur, ut in navibus, si in exteriorem
 partem, aut os, aut pinnula earum abiit; & contra memo-
 ratæ partes cum in foramen descendunt, introrsum distor-
 sio fit. 2. de iis, quæ in medic. fiunt. 33.

Diuretica, alias & Uretica pharmaca, *διουρητικά*
φάρμακα, medicamenta sunt, quæ ad ciendas urinas ac-
 commodantur. 11. meth. 16. & 5. simpl. 20. Dulum autem ea
 sunt generum; aliqua enim mediocriter id præstant, &
 proin Eccathartica, i.e. poros expurgantia dicuntur, ca-
 lida sunt & tenuium partium; alia vehementius, ut quæ
 plurimum movent urinam, quæ magis & siccant, & exca-
 lescentiunt prioribus.

Diurnus sive Chronicus morbus est, quicūq. acutorū

ex decedentiā terminum pratergreditur, quem nunc quadragesimum, nunc sexagesimum diem Hipp. facit. 2. de dieb. decret. cap. 12.

Dodecadactylon, sive Duodenum Intestinum, δωδεκάδακτυλον, primum est omnium intestinorum fundo stomachi alligatum, à longitudine duodecim digitorum sic appellatum. 6. de anat. adm. c. 9. Hoc quidam non dignantur vocare intestinū, priusquam in anfractus, orbesq; convolvantur, sed id ipsum ἐκφυσι, i.e. productionem simpliciter, vel cum appendice productionem duodecim digitorum, ἐκφυσιν δωδεκάδακτυλον nominant, primumq; intestinum in ordine dicunt esse jejunum. Ibid. cap. 12. Hoc idem Duodenum vocant Portinarium, sive Janitorem. lib. de anat. viv. In hoc ipsum Duodenum, biliarius meatus inseritur, à vesicā bilem continente, per quem, hac, in illud expurgatur.

Dolor, ὀδυνή, tristis sensus est, ut voluptas, blanda est sensatio, 2. loc. aff. 2. qui si per inflammationis fiat affectus, atq; in corporibus sensibilibus, vel per se proprio & primario affectu, in arteriis, vel reliquis partibus sensibilibus omnibus per consensum, eod quod à vicinarum contractu premantur, pullatorius, sive pullativus, ἐκφυσιώδους ἢ ἐκφυσιώδους dicitur. 2. loc. aff. 3. Si verò in aliquo viscerum, hacce circumambiens membrana, per quam nervus dispergitur, à tumore prater naturam, extendatur, ita ut gravitas quadam sentiat, dicetur sensus, seu dolor gravis, βαρεὶς, aut gravitatis. Ibid. c. 4. Quae partes si inflammatae sunt, unico doloris modo vexantur, tensivo, τενσιώδους, sive extensionis: Qui verò in membranis sit, ipsius affectus veluti radice, eo loco fixa, ubi membrana pungi-
tur, qualis est in morbo laterali, dolor punctorius,
πυκνωσι-

πυκνωσιώδους dicitur. Ibid. c. 5. Si nervi ipsis primò accidat, dicitur dolor νευρικός, stupidus. 2. loc. aff. cap. 2. Quod si in lateribus spiritus quidam flatuosus procreatur, qui cum extenuatus, cum discussus dolorem sedat, deinde rursus procreatus alter, dolorem augeat, dolor ἀεραὶς, rarus dicitur. comm. 1. in 1. prorrhet. 22. Dolores autem ulcerosos, cum Medici, cum Gymnastæ vocant, eos, per quos, inter movendum, vel tangendum, lassatas partes, sensus veluti ulceratarum partium ἐλκυσίωδους, percipi solet. 2. loc. aff. 7.

Dorsum, quod Græci ὄστρον ἢ ὀστέριον, & ἡμετέροις appellat, est omnium vertebrarum, quos Spondylos vocant, compactarum basis velut & fundamentum. Nonnulli tamen ex recentioribus Medicis, non totam vertebrarum structionem, spinam appellandam censent, sed circa thoracem tantum, & lumbos, non circa collum. 3. de artic. 1. Aristoteles verò 1. de histor. animal. Dorsum dicit esse totam posteriorem corporis partem, ab occipite usq; ad extremū Coccygem, ex triginta quatuor vertebris (si modò ossis sacri partes, vertebris annumerentur) compactam; quod dorsum conficiunt, collum, thorax, lumbi, os sacrum & Coccyx, in quo costæ, velut in carina, trabes, connectuntur, totumq; corpus stabiliunt. Sed aliter Galenus lib. de ossib. c. 7. his verbis: Spina est tota connexio, viginti & quatuor vertebrarum à Capite usq; ad os sacrum, ita ut septem primæ à Capite vertebræ Collum, sive Cervicem constituent; duodecim, quæ sequuntur, Dorsum, cui à parte anteriori respondet pectus, quinq; reliqui lumbos, os, in quod omnes vertebra finiuntur, sacrum, vel latum dicitur, sive etiam os magnum. 12. de us. p. c. 12. Vide Spina.

Dorhien, Δορίον, i.e. Furunculus, 2. meth. 2. Vide Furunculus.

Dracunculus, Δρακύντιον, est ulcus partis propinqua ipsius nervi dilationis, sic dictum, quod nervus movendus: poro destinatus in id ulcus recedat, in eodemque, quasi oculiterur. lib. finit. med. Vide quid scribat Aëtius ex Leonida, de Dracunculo, l. 4. retrab. ferm. 2. c. 85. inquit, In superioribus Aegypti partibus, pueri, maxime in tibiis generari, ac partibus aliis musculosis. Paulus addit, ex Sorano, Dracunculos hos non esse animalia, sed nervosas extremitates, quae speciem morus exhibeant, verè autem non moveantur. Nostrates affectum hunc, vernaculà linguà, vocant Mitesser.

Dropax, Δρόπαξ, est medicamenti forma quadam, nunc liquidioris, in modum malagmati, nunc consistenteris ficioris, emplastri modo, prout usus exigit, cuius materia eadem est, quae Acopis & Emplastris debetur. Est autem Dropax duplex: Simplex alius, qui & πικρὸς, h. e. pica-tio appellatur, solà pice aridà, oleo liquatà constans. Compositus est, cui praterèa adjunguntur alia ad diversos usus. In hoc genere est illud medicamentum, quod Graci ξιζω-δρον, i. e. depilatorium vocant.

Drymea medicamenta, i. e. acria, quae cacoëthiam humorum extinguunt. lib. de dynam. in proem.

Dura ulcera, quae Graci ὀχθόδα, i. e. verrucosa ulcera vocant, sunt, quae callum contraxerunt, & pratumidas ac duras oras habent. 4. de compos. med. per gen. c. 12.

Duodenum. Vide Dodecadaëtylon.

Dura mater. Vide Membrana dura.

Durum, σκληρόν, Medicis est, quod largo & superfluo humore, aut vapore in partem aliquam affluente, tactui renititur, nec cedit spontè, (aliter ac Philosophis:) & propterea quod ita durum est, propriè ἀντίρροον, h. e. reni-tens appellatur.

Durus

Durus pulsus. Vide Mollis.

Dyonisisci, sunt ossa eminentia, quae prope tempora nascuntur: dicuntur autem cornua, desumpto à corni-geris animalibus nomine.

Dyplasiamus, duplicatio, est duorum musculorum, qui ab ipsa scapulà excipiuntur, & ad exteriora, poste-rioraq, membrum circumagunt, quatenus ambo simul agentes, brachii circumductionem efficiunt. lib. de muscul. dissect. cap. 18.

Diploës, secunda est lamina Calvaria. 6. meth. 6.

Dyprosopa. Vide Dichroma.

Dypsacos. Vide Diabete.

Dyesthesia, δυσαισθησία, i. e. sensus difficultas, est vi-rium actionis sensitiva diminuta. lib. de sympt. diff. cap. 2. Perinde ut δυσκίνησις, non modò difficultatè motionis, sed etiam immobilitatem significat. Ibid.

Dyscrasia, intemperies, est mistio intemperata qua-tuor primarum qualitatuum; ubi enim illa ita coerint, ut earum pares sint vires & portiones aquabiles, temperamen-tum emergit exquisitissimum, quod ceterorum omnium norma est: ab eo quodcumq, desiscit, intemperies dicitur; tunc enim aut una aliqua, aut duae qualitates exuperent, necesse est.

Dysenteria. Vide Difficultas intestinorum.

Dysepulota. Vide Cacoëthe.

Dyspathia, h. e. ad patiendum difficultas. 1. de us. p. c. 15.

Dyspeplia. Vide Concoctio.

Dysphonia, i. e. vocis difficultas; ut Aphonia, ejus-dem abolitio. de sympt. differ. cap. 3.

Dyspnoea, difficultas spirandi, vel inordinata spiratio. 2. meth. 2. & 1. de diff. respir. cap. 1.

Dyſtherapeuta ulcera, i. e. curatu difficilia. lib. 6. de compoſ. med. per gen. cap. 1.

Dyſthymia, i. e. meſtitia melancholica. 6. de loc. aff. c. 1.

Dyſtichia, eſt alterius pilorum ordinis in gena mat-
gine exorſus, præter naturam. lib. finit. med.

Dyſuria, *δυσουρία*, eſt urina vel difficilis ſaltem & de-
bilis, vel cum dolore ſolo, ſive doloroſa ſimul & languida
excretio. 7. aph. 48. Vide Iſchuria.

Dytriachifis, oculi morbus eſt, cum pilis naturalibus
alii ſubnaſcentes, ipſum pungunt, fluoremq; concitant. lib.
Introd. cap. 15.

E

ECROLIA, *ἐκρόλια* pharmaca, i. e. abortiva medi-
camenta, qua abortum faciunt, qua & *φθορία* ap-
pellantur; eadem & fœtus demortuos extrahunt. Vide
Aborſus.

Eccathartica, qua & Ecphraſtica vocantur. Vide
Rhyptica.

Ecchymoma, (Græcis *ἐκχύματα* ἢ *ἐκχύματα*, i. e. ſu-
gillatio,) eſt affectio circa cutem, cum, tenuibus ejus venis
contuſis, ſanguis per fiſſuras effunditur, nondum in gru-
mos coactus, ſed poſtquam per Diapedeſin effuſio ipſa facta
eſt, contingit ſane aliquando, ubi ita coierit temporis pro-
greſſu, eundem liveſcere, & denigrari, parvis nimirum gru-
mulis, ex diſperſo in multas cutis partes ſanguine, coactis.
2. de compoſ. med. loc. cap. 1. & 4. meth. 1. Ecchymofin, ſo-
lutionem continuitatis cum contuſione, & ruptione con-
junctam vocitat. Generatim verò Hipp. ſolitus eſt vocare
Ecchymofes, ſanguinis ex vaſculis effuſiones, & in-
dignationes: & alio nomine *ραυδιώσις*, com. 2. in 9. de morb.
vulg. 9. Quæ effuſio in phlegmone quoq; fit à cauſa inter-
na,

na, ubi ſanguis è vaſis effunditur, & tumor excitatur,
tactu mollis & cedens: diſtinguit tamen Gal. 6. aph. 20.
Phlegmonem, ab Ecchymofi; quod in Phlegmone,
ſanguis per muſculorum cavitates, ſolâ ratione contem-
plabiles, ſecundum minimas ſui partes, effunditur; in Ec-
chymofi verò in ſpatia effluir, qua venis adjacent. Species
Ecchymomatis ſunt, Hypopion, & Hypophagma,
ὕποπιον ἢ *ὕποφάγμα*, & ſanguinis ad ungues con-
cuſus, ex plagâ. Vide Unionis ſolutio.

Eccope, *ἐκκοπή*, exciſio. Diviſio eſt calvaria, quâ os
offenſum, reſractum eſt. lib. finit. med. Inde *ἐκκοπήματα*, me-
dicamenta imbecillia ſunt, qua movendi tantum ſtercoris,
& ea, qua in ſpaciis inteſtinorum primæq; regionis viis
continentur, deſiciendi vim habent, non etiam ex alto ar-
trabendi, & humores evacuandi.

Eclegma, (Græcis *ἐκλεγμα* ἢ *ἐκλεγεῖν* *φαρμακον*) me-
dicamentum eſt, per ſputum evacuans, qua in ſaucium par-
tibus, phlegmone obſeſſis, urî etiam in aliis partibus ſpiri-
talibus continentur. 4. de rat. viſt. 20. Ori enim inditum,
ſenſim liqueſcit, & deglutitur, ad pectoris, & pulmonis vi-
tia accommodatum: proinde alio nomine vocatur Arte-
riacum, *ἀρτηριακόν*, diciturq; *ἀπὸ τῆς λείψεως*, i. e. à lingendo.
Arabes vocant Looch. Paulus verò lib. 4. c. 57. nomen hoc
tribuit medicamentis, qua devorantur ad lumbricos ene-
candos. Vide Arteriaca.

Ecphraxis, i. e. pororum apertio, & recluſio. 11. meth. 13.
Inde *ἐκφραſμα* medicamenta vocantur, quacunq; obru-
ratione, & obſtructione agrotantes liberant: facultate ni-
troſâ & amarâ, oppoſita emplaſticis medicamentis, quo-
rû eſt meatus obducere, & obrurare. 4. de comp. med. loc. c. 1.
Hæc ipſa dicuntur alio nomine Eccathartica, *ἐκκαθαρτικά*.

Ecphysis, i.e. exortus, seu processus alicujus cumprimis osis, sed & intestini, vel visceris. 2. de ana: adm. c. 5. Porro, Ecphysis simpliciter & sine adjectione prolata, est medium spacium inter intestinum jejunum, & fundum ventriculi, carens circumvolutione. lib. 5. de usu part. cap. 3. Vide Do-
decada & ylon.

Ecphyselis, efflatio, sive exsufflatio, est copiosissimi aeris exspiratio confertim facta. 2. de motu muscul. Græcis ἐκφύσεως ἢ ἀέρος & πνεύματος ἐκφορά; propria vocis materia, neq; vox citra eam fieri potest: differt à simplici expiratione, tum violentia, tum musculis, per quos efficitur: 4. de usu part. nam & paulatim exspiratio fit à solo septo transverso. 4. de loc. aff.

Ecplexis, est subitus & vehemens timor, Græcis ἐκπληξις: hujus oppositum Pericharia dicitur. περικαρία Græci vocant, quasi excessum gaudii dixeris: scimus autem, amborum occasione, plures subito perisse. 12. meth. 5.

Ecpielma, ἐκπιεσμα, calvaria in multas partes diffractio, ubi simul intrusa osis partes in inum decubuerint, ac meningem membranam, innixio suo premunt. lib. finit. med. Est, inquit, affectio, in qua profundius fracta osicula descendunt, & membranam Cerebri comprimunt. Unde Ecpielmus, ἐκπιεσμός, est totius oculi prolapsus extra suam cavitatem, ut prominens appareat. Differt à Proptoli, πρὸ & προπίεσμος, h. e. à procidentia, quod in hac uvea tantum tunica, in illa totus oculus foras erumpat, præsertim is, qui strangulantur, athleticis, & foeminis, quæ præ dolore partus vehementius distenduntur, aut fluxionibus à capite in oculos tentantur.

Ecpyema, ἐκπύημα, dicitur ab Hipp. copiosissimi puris collectio, tumore aliquo p.n. phlegmonoso, pleura cūprimis suppu-

suppurato, & hinc concocto. Εἰκονομαί, idem est, quod ad suppurationem perducere.

Ecrhythmus pulsus est, qui nullius ætatis rhythmum servat. 1. de diff. puls. cap. 9.

Ecstasin melancholicam, mentis motionē, aberrationemq; intelligimus vehementem & ferinam, quæ Cerebro, assarā à flavā bile obfesso oritur. com. 1. in 1. prorrh. 14.

Ecthlimma, est exulceratio, quæ in summā cute, ex compressionē violenta nascitur. 2. de fract. Græcè item ἐκθύμα dicitur.

Ecthyrata, ἐκθύρατα, cutis velut efflorescentia, papule sunt per summam cutem erumpentes, ab humoribus superfluis, falsis, tenuibus, ided etiam in cute leviter extubant, quod tenues humores exulcerationem potius, quam tumorem insignem procreant. Dicuntur alio nomine Græcè ἐκθύρατα, cujusmodi sunt, tum quæ per febres ardentes exeunt, tum Variola vulgò dicta & Morbilli.

Ecprosis, ἐκπρόσις, luxatio, seu osium à propria sede amorio, & divulsio, citra fractionem: significat etiam ἐκπρόσις, sive ἐκπρόσθησις, apud Hipp., ut notat Gal. in initio libri de Articulis; cujus luxationis causa alia est externa, omnis ea, quæ articulum loco dimovere potest, alia interna, humoris defluxio, articulum præ copia sua, vel mollitie, ex loco suo naturali propellens.

Ectropion, est suppullatio carnis in gena, quæ genam ipsam suā gravitate foras invertit. Causa autem gena everrenda, est vel caro adnascens, vel resolutio, vel cum cicatrix inducitur. lib. finit. med. Alibi: Ectropion, inquit, est diversio, sive inversio, palpebrarum virium, cum exulceratis oculis, plus extrā feruntur. lib. Interd. cap. 15. Est autem affectus solius inferioris palpebra, oculum conte-

gentis,

gentis, ita inversa, & retracta deorsum, ut parum sursum attollatur, sed pendeat & hiet, neq. ex toto oculum integat. Quod vitium si palpebra superiori acciderit, *αγρία-φθαλμος*, lagophthalmos dicitur; quod vitium naturaliter contingere potest: Ectropion verò non nisi à causa præter naturam, à cicatrice, carnis excrescentiâ, relaxatione, medicamento, suturâ, vel ustione inartificiosâ, & à senectute summâ dependet.

Ectrosmos, apud Arist. 7. de hist. animal. sunt aborsus & imperfectorū fetuum corruptiones infra diem quadragessimū factæ; quæ verò intra septimum diem fiunt, non *ετρώσις*, seu abortiones, sed *εκπτώσις*, i.e. effluxiones vocat idem Philosophus.

Eczemata, *ἐκζέματα*, Latinis carbones, sunt pustule ardentes, & fervide, dolorem cientes, citra saniem; ingens enim fervor omnem materiam absorbit.

Efflationes, sunt magna & vehemētes spiritus expulsiōnes, quæ per eadem instrumenta fiunt, per quæ & cussus, & cussiendo efficiuntur. Efflatus quoq. dicuntur, ab expiratione, quæ sine strepitu fit, copiâ & velocitate motus differentes. 2. de moru musc. cap. 8. & 2. de sympt. caus. cap. 4. Vide Ecphyfesis.

Efflorationes, sunt ulcerationes superficialia, facta in corporis ambitu & superficie, subrubra & aspera, de medic. sac. par. cap. 5. quas, si noctu enascantur, Epinyctidas vocant, lib. de tumor. cap. 15. & 2. meth. 2. Easdem Celus vocat pustulas pessimas, colore sublividas, & subnigras, albas, suo humori similes, magnitudine fabam non superantes, cum vehemēti inflammatione & dolore, ex quibus adaperitis, sanies effluit, & exulceratio mucosa iniret. Paulus & Aërius dicunt, esse ulcuscula sponte nascentia.

scientia, phlyctenis similia, subrubra, ex quibus cruenta sanies effluit. Utrumque verum est, & pustulas, & ulcuscula esse.

Effulgescentiæ, quas Græci *ἐνλαμπύς* vocant, Hipp. sunt morbus puerorum proprius, aut certè quàm familiarissimus, Epilepsia videlicet, ut notatur comm. 1. in 6. de morb. vulg. 5. etsi alii de hoc significato contendant.

Effusio. Vide Contusio.

Effusa & Nigrores, sunt sanguine à venis effuso subcutem, nunc per tunicas contusas, nunc verò in sinibus resecras. lib. de tumor. cap. 10.

Elcos, Latine Ulcus, solutio continuitatis est in omnibus corporis partibus, (præterquam in solo osse) ab interna causa, humore scilicet vitioso, acri, & erodente, partii, cui inest, continuitatem (sive ea caro sit, sive cutis, sive cartilago sive membrana) solvens. Id autem vitii ubi in os incidit, caries, sive *τεφρόδω* appellatur. Aliquando verò Hipp. Ulceris nomen ad omnem morbum dolorificum extendit, continui solutionem eo nomine significans.

Elementa, *στοιχεῖα* Græcis, apud Medicos sunt, calidum, frigidum, humidum, siccum, ex quibus homo primis velut & simplicibus, minimiq. ex corporibus est constitutus, & in quæ ultima apparatus, & simplicissima, ac minima, resolutionem capit. lib. finit. med. Adhuc elementum appellatur minima pars ejus rei, cujus est elementum: omnium autem corporum, quæ gignuntur, & corrumpuntur, quatuor sunt elementa, Ignis, Aer, Aqua, Terra, ut minimum intelligatur id, quod minimè divisionem suscipere potest: 8. de placit. c. 2.

Elephas, (qui & Elephantiasis dicitur) morbus est, in quo naturalis faciei figura mutatur, refimatur, nasus, labra

labra crassa sunt, extenuantur aures, ad Satyrorum effigiem, lib. de caus. morb. cap. 7. ex sanguine melancholico primam generationem habent, quam affectionem, cum incipit, Satyriasmum nominant, quoniam vultu Satyris similes fiunt. Non desunt, qui osseas eminentias, quæ in temporibus fiunt sic vocant. In aliis autem partibus, quæ fiunt tales osium eminentia, Exostoses vocant. lib. de tumor. cap. 14. *ἐλεφας* ἢ *ἐλεφεύσιος*, universi corporis cancer est.

Id nominis nactum est hoc malum, quod in eo cutis, corio Elephantum persimilis videatur, nam maculis quibusdam ad atrum colorem vergentibus inficitur, atq; inæqualiter aspera, crassa, ac veluti squamis fœda, livens, serinaq; redditur. Nec Elephas quicquam a lepra Arabum differt.

Elminthes, *ἐλμίνθες*, lumbrici, animalia sunt in humano corpore, cum primis in intestinis, in auribus, in vesica, & in ventriculo, interdum etiam in sordidulis ulceribus generari solita. Lumbricos Greci *ἐνδόοντες* vocant. Sunt autem trium generum. Primi generis sunt teretes, seu rotundi à figura, longitudine aliquando palmares, sæpè longiores, quos vocant *ἐνδόοντες* *γεωγγύδας*, in gracilibus plerumq; intestinis consistunt, & ventriculum subeuntes, sæpè per os ejiciuntur, quibusdam è naribus redduntur, ut plurimum cum febricula consistunt; atq; hoc genus pueris infantibus, & puberibus peculiare est. Alterius generis sunt, qui lati vocantur, *ἐνδόοντες* *πλάταιας*, aliquando nequias, h. e. infestitas, à similitudine quam cum infestis obtinent; instar enim harum lati sunt, & longi, aliquando *ταυίρες*, i. e. fascias vocant, quod fasciarum effigiem, suâ latitudine, & longitudine, referant. Plinius lib. 11. cap. 33. tradit tricenarium pedum tania ventris aliquando visas, interdum plurimum. Terii generis lumbrici sunt, qui Alcarides nuncupantur, breves

breves ac tenues, parvis vermicibus similes, qui in extremo intestino reperiuntur, & glomeratim, in multas phalanges compacti, per sedem dejiciuntur.

Elythroide membrana, quæ & Erythroide, *ἐρυθροειδής* dicitur, testium est tunica, vaginalis dicta, 2. de sem. cap. 5. quâ tunica, uti & scroto, seminarum testes continent. lib. de vulva diss. cap. 9.

Embroche, Græcis *ἐμβροχή* ἢ *ἐμβροχία*, medicamenti genus est, cum locis affectis, liquore aliquo humectatis perfusisq; lanam deinceps aut linteam, eodem liquore imbutam admoveamus, imbecillius cataplasmate.

Embryon, est animal utero gestatum, 6. de usu part. cap. 13. quod tamen non prius Embryon dici debet, quam duos menses in utero absolverit. Vide Cyema.

Emmora, *ἐμμόρα*, medicamenta, i. e. linamenta sunt humida consistentiæ similia in, quæ linamentis, vel linteolis excipiuntur, cerati specie. 13. meth. 5. Emmotos vero vocat Hippocrates, eos, qui ulcus cavum & exesum contraxerunt ex suppuratione, quod curationem per linamenta desideraret. 3. artic. 55.

Emollientia. Vide Chalastica.

Emphraxis, *ἐμφράξις*, obstructio, est meatuum aut cavitatum naturalium stipatio, ex topiâ, vel vitiosâ qualitate (ut lentore, & crassitie) succorum proveniens, cujus species Gal. 12. meth. ponit *ἐμψροσιν*, & *ἀνδροσιν*. Unde medicamentum, quod suo lentore obstruit, *ἐμψροσιν* : huic contrarium est medicamentum *ἐμψροσιν*, quod obstructione liberat. 5. simpl. 12. Vide Rhyptica.

Empirici, (Græcè *ἐμπειρικοί*) nomine ab *ἐμπειρία*, h. e. experientiâ deducto, solâ experientiâ, experimentisq; particularibus nituntur. lib. de sect. cap. 1. Unde Empirica Medico-

Medicorum secta, accidentium syndromasin agnoscit, illorumq; curationem ab experientia solâ deducit, idq; nec morbo, nec causâ cognitâ. lib. Inerod. cap. 3.

Emphysema, inflatio, Græcis ἐμπύσημα, ἐμπύσημα τῶν αἰμάτων, est spiritus flatuosi collectio, in inanibus corporis partibus. Vide fusè infra Physis.

Emplaston, sive Emplastîcû, ἐμπλαστὸν, pharmacum est, quod meatus obducit: ut picatio, quæ imponitur pilis in totum abrasis. 1. de compos. med. loc. c. 1. Atque hoc pharmacorum emplastîcorum genus, substantia sicca & terrestris est, citra refrigerationem, aut caliditatem manifestam, aut in primo ordine refrigerantium, vel calefacientium. 4. de compos. med. loc. cap. 1. Sinè mordicatione siccant eadem, inquit lib. 4. simpl. cap. 5. & lib. 5. cap. 11.

Emplastomena, medicamenta vocant, quæ exigui totius corporis meatibus herentia prohibent, ne quid per urinas, vel universam curim diffletur, & effluat. 8. meth. 2.

Emprosthotonos. Vide Distentio.

Empyemata, quæ & Diapyemata, ἐμπίμματα, medicamenta suppurantia omnia sunt. Insuper, cum in viscere, phlegmone in pus cõversa est, πύημα id solum empyema nominant; & qui sic affecti, empyos. Alii eos solos empyos dicunt, quibus inter thoracem & pulmonem pus aggregatum est. lib. de tumor. c. 3. Εμπύος ἢ ἐμπύωνος Græci vocant suppuratos & purulentos, qui multum puris in capedine inter thoracem & pulmonem collectum habent. 4. de caus. puls. cap. 9. Sed & omnes, quibus inflammatum viscus aliquod suppuratum est, suppuratos vocant, ubi pus universum constitierit, concocto tumore quopiam præternaturali. comm. 1. in 1. progn. 40. & 2. progn. 59. & 60.

Empyreuma, reliquia sunt caloris febrilis post soluta-

tam

ram accessionem. Intermittentium enim & putridarum febrium proprium est, ut soluta accessione supersit nonnihil caloris, vel in ipsis humoribus relictis, vel solidis adhuc etiam partibus impressi, quem aliqui febris fomitem appellant. Huic contraria est ἀναψύξη, sive Infebricitatio.

Emulgentes venæ, & arteriæ, sunt vena cava ex hepatis convexo emergentis, trunci descendens, rami maximi in utrumque venem subjectum implantari soliti. Similiter alia duo vasa æquè magna, à maxima arteria, quæ spina incumbit, profecta, non aliter quàm venæ in renes inseruntur, quæ venæ, & arteriæ vulgò emulgentes appellantur, quippè per quas, renes, urinam à sanguine secernunt & trahunt, simul etiam multum bilis, ac prope modum omne id, quod ipsæ continuerint, attrahunt. lib. de venar. diss. cap. 5.

Enarthrosis, species est Diarthroseos, cum ossis excipientis cavum, altum admodum est, caputq; quod in id inseritur, oblongum. lib. de ossib. in præm. Vide Arthrodia.

Enæmon, ἐνέμων, est medicamentum, quod glutinat, 6. meth. 2. imponiturq; maxime cruentis vulneribus, sistendi sanguinis causâ: lib. 1. de compos. med. per gen. cap. 14. quæ ided & sanguinarium, & cruentis opitulans, & glutinatorium dicitur. 3. de compos. med. per gen. c. 2. Vide Glutinatorium, & Sanguinarium.

Ençorema, ἐνçόρημα, quod & Appendiculum quidam vocant. Vide Sublimamentum, & Suspensum.

Encanthis, ἐνçανθίς, i. e. inangularis, immoderatum est augmentum angulorum oculi; Rheas, immoderata eorundem diminutio. de differ. morb. cap. 9. Est etiam quidam præter naturam tumor, in magnis Hircis oculorum, quod tuberculum non est omnino præter naturam, lib. de

tumor. cap. 17. estq; ut plurimum in majori angulo: quam carunculam, quidam Chirurgici resistentes, effluxum excrementis eâ parte aperuerunt, quem affectum Rhœada quidam appellârunt. 10. de usu part. cap. 11. Alias Encanthis propriè angulum oculi significat; major autè angulus, qui naso est proximus, proprio nomine Rhanter. *ῥαντήρ*, dicitur; minor, qui est ad tempora, *ῥαπωνιάς*: inde verd ejus nomen, morbo inditum est.

Encathisma, *ἐνκάθισμα*, est sessio in aquâ medicatâ, ab imis pedibus, vel feminibus, usq; ad umbilicum, ita ut superna partes non madescant. 5. de comp. med. per gen. c. 13.

Encephalos, *ἐνέφαλον*, Cerebrum Vide Cerebrum.

Encharaxis, *ἐνχαρῆσις*, scarificatio, est cutis & subje-ctæ ejus carnis, per scalpellum sectio, non punctum, sed ca-sim, multis foraminibus facta. Dissert à Phlebotomia, quodd hæc uno vulnere venam adaperiat, illa multis sectionibus, cutem, carnemq; dividat & vulneret.

Encheridæ, grumi sunt, cera modo facti: in emplastris, dum liquida illis infunduntur. 4. de comp. med. per gen. c. 5.

Enchymoma, Græcis *ἐγχύμα*, à *ἐγχύω*, est sanguinis & humorum, in partem aliquam, naturalis effusio, per quam & partis ejus venula repletur sanguine, & color vividus rubens ac naturalis, parti inditur, ut in Ira, Verecundiâ, Gaudio, Somno fit. Eadem autem sanguinis effusio si fiat præter naturam, ut in vulnere contingit, abcessu, aut phlegmone, dicitur Ecchymosis, vel Ecchymoma. Vide Ecchymoma. 2. de morb. vulg.

Enchyta, medicamenta sunt, quæ oculis instillantur, ut sem. sænugraci decoctum, candidum & tenue ovi, lac muliebre, & quæ in hunc usum præparantur collyria. lib. de remed. par. fac. cap. 10.

Encope,

Encope, *ἐνκοπή*, & *διακοπή*. Vide Hedra.

Encranion. Vide Cerebellum, & Parencephalis.

Enema, i. e. infusum, quod per inferna, in alvum infunditur: dicitur quoque *ἐνάλωμα* *ναυαγέ*. lib. de ren. aff. c. 4. cap. 4.

Endemus, & Endemius morbus appellatur, quasi patrium dixeris & vernaculum, qui morbus communis est multis eandem regionem incolentibus: ut Epidemus, & Epidemius morbus est, qui cum perniciosus non sit, tempore tamen statò in regione aliqua sevit & insolescit: si enim perniciosus sit, peltis dicitur. 1. de vict. rat. 9. Morborum itaq; alii sporades, h. e. dispersi; (*σποράδες*, qui singulos separatim corripunt, non ab aère, sed potiùs à vitio ratione cuiq; propriâ, exorsi:) alii communes sunt, quos Græci *νοῦς*, *παῖνοι* & *ἡ νόσος* vocant, qui sunt certi morbi & singulares, qui alicubi vagantur, & multos eque simul corripunt, causamq; habent communem, ut aërem, quem omnes inspiramus, vel depravate aquæ potum, aut gravem & vitiosum cibum, quem omnes pariter absorbuerint, vel terram exhalationem, vel quid simile, quod vitari nequeat. Qui morbi communes, Panoeni & Pandemi; si patrii sunt, Vernaculi; & alicujus regionis familiares, Endemi & Endemii vocantur, causamq; communem agnoscunt, & communem insultum, de quibus Hipp. lib. de aqua, aère, & locis. Si verd à communi causa nati, communes quidem sunt, non tamè patrii & familiares, sed potiùs externi, & adventitii, sint autem perniciosi, & contagiosi, pestilentes dicuntur, Græcè *λοιμώδεις*. Si verd non pestilentes, sed pestilentibus mitiores sunt, ut *λοιμώδεις*, carent proprio nomine, quanquam Galenus, quasi oblitus eorum, quæ in proœm. lib. 1. epid. scripserat, asserat, eos, qui pestilen-

res non sunt, vocari Epidemios, mutato scilicet generis nomine.

Endixis, ἐνδείξεις, Indicationes sunt, i.e. communitates, scopi, & auxiliorum fontes, velut & loci: ἀνδείξεις vero his opposita sunt. 9. meth. 7.

Engisomata, instrumenta sunt, quibus in Calvaria fracturis utimur: aliis sunt osis pertusio, cum pars affecta in profundum descendit, ac super illas os corrumpit. lib. finit. med.

Engonios, i.e. angulosa brachii figura, quæ illi membro naturalis est: omnis enim cuiusque partis figura rectissima, maxime est à dolore aliena. 6. meth. 5.

Engosomata. Vide Camarosis.

Enrhythmus pulsus, commune quoddam genus est ad Eurhythmum pulsum, & Arrhythmum. i. de diff. puls. c. 9. Qui enim naturalem & optimum servat rhythmum, ὀρθὸς & dicitur, unusque est & indivisus: qui vero non servat, ἄρρυθμος, in tres divisus differentias: omnis autem pulsus, qualiscumque ille sit, modò servet rhythmum, ὀρθὸς & appellatur.

Ensiformis cartilago. Vide Cartilago ensiformis.

Entera, ἐντέρας, intestina: sunt corpora cava, rotunda, membranosa, ab imo ventriculo ad anum protensa, distribuendi ad jecur chyli, & continendi, expellendiq. stercoris instrumenta, in orbem involuta, fibris circularibus & transversis contorta, ad chyli & stercoris expulsionem: quorum tria superiora tenuia sunt, ἡμερῶν, sive δωδεκάδακτυλλον, πύγος, εἰς τὸν ἡ δακτύλον, i.e. Epiphysis, Jejunum, Ileum, sive tenue: tria inferiora crassa, τυφλὸν, πῶλον, & σιγὰ σιγὰ, Cæcum, Colon, & Rectum: atq. inde patet, esse unum & continuum numero sit intestinum, loco tamen, magnitudine,

tudine, numero orbium, & anfractu evariare, senariūq. resultare numerum. lib. 5. de usu part. & 6. de anat. adm. Ubi vero ἐντέρας, in singulari numero, ab Hippocrate profertur, docente Gal. com. 4. in 6. de morb. vulg. ipsum significatur Colon, per excellentiam, ratione suæ magnitudinis, quod solum ex intestinis in scrotum descendit, & Enterocelen efficit, i.e. herniam intestinalem, apud alios vero Cœcum. lib. 4. de usu part. cap. 17.

Enterocèle, Epiplocèle, & Hydrocèle, sunt species Herniarum, in quibus rumpitur is meatus, qui à Peritonæo ad testiculos pertingit. lib. de caus. morbor. cap. 10. ait: Cum articuli suis sedibus excidunt, aut loco tantum moventur, aut cum omentum vel intestina, ad inferiores testiculorum tunicas devolvuntur, alterum morbum Græci Epiplocelen, alterum Enterocelen appellant. de differ. morb. c. 10. Præter hæc ex ambobus etiam morbis compositum affectum Enterœpiplocelen juniores Medici appellant. lib. de tumor. cap. 15. Vide Celas.

Enthusiasmus, i.e. Fanatica percussio, seu Numinis afflatio, est E. G. cum quidam in sacris faciendis, mente capiuntur, si quæ viderint, aut si tympana, vel tibias, vel signa audiverint. lib. finit. med.

Epacnastica 9. meth. 4. Vide Continua.

Epaphæresis, i.e. repetita sanguinis misio. de cur. rat. per sang. cap. 1.

Eparmata, præter naturam tumores, secundum aures, in egrotantibus exortos, vocat Hipp. comm. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Galenus 3. de compos. med. loc. cap. 2. dicit, Eparmata (quæ & Parotides sunt) de genere esse inflammationum, quæ sunt glandulis, circa aures p. n. affectis. Paulus vero ait: Tumor omnis, sive œdematosus, sive scirrhus, etiam

citra inflammationem, glandulas sub auribus occupans, vaporis dici potest.

Ephebeon, Pubes & Pecten, Aqualiculus Latine, Græcis ἐφίβειον, ἐπίσσορ, ἄβη, id totum est, quod est ab Hypogastrio, seu imo ventre (quem & lumen vocant) usque ad pudenda. lib. Introd.

Ephelcis, i.e. ramentum seu cruoris exigua guttula, qua interdum, per rufim in hamoptoicâ passione, rejicitur. 4. de loc. aff. 5. Aliquando generalius, ἐφελκίς, crustula est, qua ulcers obducitur, diciturque de internis; quandoque enim crustula & per tussē pulmonibus, & per dejectiones ex intestinis, deiciuntur.

Ephelis, ἐφελίς, est aspreudo, & nigrities, in facie ex ardore Solis progenita, ἀπὸ ἡλίου, i.e. à Sole, nomō desumens.

Ephemera febris est, qua à causa procathartica, sive præcipiente, fit cum urina coctione, primâ die apparento, vaporosâ, blandâ caliditate, pulsu ad magnitudinem, & celeritatem effatu dignam accedente, systole pulsus parum à naturali tenore mutata, equali atque incomprehensō ascensu in caliditate, etiam cōsistente febre, sudore ad hoc aut rore, aut omnino cum aliquo optimo vapore integrè judicari solita. 1. de differ. febr. cap. 7. Ephemera febris, ait, in spiritibus citra humorum putredinem, accensa est. Ibid. cap. 5. Vide Diaria.

Ephialtes, affectus Græcis dictus, est nocturna corporis oppressio, & quadam quasi suffocatio, cum quis somni ab initio supinus jacens, grandi se mole opprimi, atque ab alio invadī imaginatur, cum difficili respiratione, immobilitate, ac voce præpeditâ, propè suffocari ager videatur; Græcis quoque ἐπιβολή & πνιγέλιον, Latine verò Incubus, vel Incubonus dicitur; fortè quia ex Veteribus quidam Dæmo-

Dæmonem, alii Cupidinem, alii Incubantem vertulam, aut externam quandam vim, quæ quiescentes invaderet & pondere oppressos gravaret, esse voluerunt, quamvis tota mali causa, intra corpus esset. in libello de utilitate respirationis.

Ephidrosis, ἐφιδρωσις, duo significat, vel sudoris circa thoracem, & caput exortum, vel in universo corpore sudoris proventum, tū paucum, tū inutilem.

Epialus. Vide Febris Hepiala.

Epicauma, est velut ex igne facta crustulosa ulceratio, qua oculi nigro advenit, nec permanet. lib. finit. med. Id morbi ἐπίκαυμα & ἐπικαύμα vocant Græci, Latini verò ustionem, sive exustionem.

Epiceraftica, ἐπιεραστικά, medicamenta sunt, quæ & temperata dicuntur, quæ si valentiora evaserint, humorem mordicantium morsum, retundunt. 2. simpl. 12.

Epicrasis, ἐπικράσις, est vitiosi succi (cū indicationes sibi adversantur) paulatim facta vacuatio, & paulatina ejus, quod salubre est, pro vitiosis reposicio. 9. meth. 10.

Epicrasis, i.e. adjudicatio. ad Thrasib. cap. 6.

Epicrasis, certa quadam est percussio, quæ mangones puerorum succurrunt iis, quibus à natali die, gracilia sunt membra. 14. meth. cap. 16.

Epicyma, ἐπικύμα, est secundus fœtus, conceptus gravidâ jam existente muliere: id quod fit, ut scripsit Hippoc., cū fœtū jam concepto non clauditur exactè uterus, sed semen aliud, etiam postea intro admittit; Arabibus Superimprægnatio dicitur, & Superfœtatio.

Epidemus. Vide Endemus, & Communis.

Epidermis, summa cutis corporis, seu Cuticula, 3. meth. 4. solâ sensatione, à verâ cute differt; hæc enim à ner-

vorum extremitatibus dilatatis fit, Epidermis verò à cutis excremento vaporoso, ambientis aëris à frigiditate, provenit: itaq; vel sensu caret, vel exigui sensus est; & proinde citra dolorem, facile à subiecta cute separatur.

Epideſmus, sive Hypodeſmidas, i.e. fascias, subfasciationes, & subligamina, sine ullà distinctione Veteres vocaverunt: at Hippoc. fascias, quæ ipsi corpori circumdantur, subligamina, seu subfasciationes appellat, quæ plagulis extrinsecus superligantur. 3. de his, quæ in medic. fiunt. 6. Vide Plagulæ.

Epideſis, genus ligationis est, ad sanguinis profluvium compescendum, sanguinem fundentibus vasis injecta, & vulnerati membri labra dissidentia continens, eamq; ob rem merito inter claudētia remedia numeratur. 5. meth. 3.

Epididymis, ἐπιδιδυμῖς, i.e. supergeminæ tunica, & parvus quidam quasi testis, testium involucrum simul est, & appendix: est enim pars quadam animalis gemini, h.e. testis capiti superimposita: id quod nomen ipsum præ se fert, ex qua multa fistula, seroso quodam humore plena, ad testem permeant. 1. de semin. cap. 15.

Epigastrium. Vide Abdomen.

Epigenema, ἐπιγενεμα, ἀπὸ τοῦ ἐμῆν, γενεῖν, quasi superveniens, vel supergenitum, idem est ac symptoma. de sympt. diff. cap. 1. Vide Symptoma.

Epiglottis, ἐπιγλωττῖς, i.e. superlingula, est membrana cartilaginosa, rotunda, hedera folio analoga, in interiori gutturi parte collocata, 1. de loc. aff. 1. quæ à radice linguæ exoritur, lib. de vocal. instrum. diff. cap. 4. quæ & Glottis dicitur. 7. de usu part. cap. 13. quin etiam lingula, ligula, i.e. laryngis lingua; est enim corpus quoddam simile linguæ alicujus fistula, ubi arteria & larynx inter se cōnectuntur.

7. de

7. de usu part. c. 13. velut operculum omni tempore, quo animal respirat, apertum stans, quæ autem translucet, laryngi accumbens. Ibid. cap. 17. Cujus ligula nisi tanta esset magnitudo, figura, substantia, & situs, quem nunc habet, vomentibus nobis non pauca in asperam arteriam deferrentur, ad laryngis cavitatem coacervata. Ibid. Estq; hac proprium vocis instrumentum. 1. de loc. aff. 6.

Epigonatis. Vide Patella.

Epilampſies. Vide Effulgescentiæ.

Epilepsia, (quæ & Epilepsis dicitur) i.e. morbus Comitialis, de diff. morb. cap. 5. estq; totius corporis convulsio. 2. de sympt. caus. cap. 2. Vide Comitialis.

Epilogismus, communis est quadam ratio, omnium assensu comprobata. 1. prorrh. 6.

Epiludes, Parulides, Thymi, tumores sunt præternaturam, in glande penis, nihil selectum habentes, præterquam quod sunt carnosæ germina. lib. de tumor. cap. 17.

Epinyctides. Vide Efflorescentes.

Epiparoxineſte, i.e. superacui, & superexacerbari dicimus, cum paroxysmus plures habet insultus: sicut & pulsuum Thlipsis, i.e. compressio, quando incipiente accessione, satis parvi atque inequales pulsus sunt. lib. 1. de diff. febr. cap. 7.

Epiphora, ἐπιφορὰ, tum inflammationis magna, universo illata corpori, tum largorum fluorum, & fluxionum, commune nomen est: propriè verò de oculis profertur, ubi cum maxima inflammatione, etiam humoris copia, in illos influxerit. lib. Introd. cap. 15.

Epiphysis, ἐπιφύσις, est ossium quasi adnata appendix. lib. de ossib. in præm. Differt autem ab Apophysi, ut idem Galenus annotat, quod Apophysis sit totius ossis ex-

*trema pars; Epiphysis verd non est osis pars, sed ali-
quid osi adnatum.*

*Epiphysis vermiformis, ἐπιφύσις οὐράνιος, idem
est ac Conarium, sive Conoides corpus, & Turbinatum.
Vide Conoides.*

*Epiplasma, idem est ac Cataplasma: ut cum tritici
farina, ex hydreleo decoquitur, ac vulneribus imponitur.
3. de compos. med. per gen. 1. ap. 2.*

Epiplocele. Vide Celas.

*Epiplocomistæ, pleriq; homines pingues & obesi
dicuntur, quasi dicas Omenti gestores, dum in magnam
molem, omentum iudem excreverit. 6. de anat. adm. cap. 5.*

*Epiplocephalon, omenti est in umbilicum prolapsus.
lib. finit. med.*

Epiploon. Vide Omentum.

Episarcidium. Vide Anasarca.

*Epistematia, est ipsum principium, sive insultus acces-
sionis febrilis in quo agri solent horrere, refrigerari, oscita-
re, particulari dormire, aut aliud quid simile pati: dicitur
Græcis ἐπιστέματις, significatio, aliàs ἐπιστέματις ἀποφύγις,
i.e. annotatio paroxysmi. Vide Annotatio.*

Epision. Vide Aquaticulus, sive Aqualiculus.

*Epistasthon. Vide Attrahens. Est medicamen ari-
dum inspersile, ad malignorum ulcerum curationem, non
inefficax. 4. de compos. med. loc. cap. 5.*

*Epithemata, ἐπιθέματα, pharmaca sunt, ceratis valen-
tiora, quæ tum ex unguentis, tum ex iis, quæ similem vim
obtinent, medicamentis componuntur. 7. meth. 4. Epithe-
ma quoq; operculum est. 2. de usu part. cap. 9.*

Epneumatosis. Vide Physis.

*Epoche, est suspensa sententia, nihilq; definiens: ut cum
quam-*

*quandiu humores sunt in motu, de nullâ re pronunciu-
mus nec asseveramus certò quidquam. lib. de optimo de-
cendi gen.*

*Epomida, i.e. superhumeralem, superiorem humeri
partem dicunt. 1. de anat. adm. cap. 11. Vide Ala.*

*Epulis, ἐπύλῃς, est tuberculum & carnis excrescentia
in gingivis proveniens, & ad intimos molares dentes sese
extendens, adeò ut ager aliquando os aperire nequeat. 5. de
compos. med. loc.*

*Epulotica, ἐπυλωτικά, præparata, medicamenta sunt,
quæ non detrahare, neq; liquare carnem, sed indurare, de-
siccare, & cicatricem inducere apta sunt; ut alumen, galla
omphacium, as combustum, præsertim lorum. 5. simpl. c. 15.*

*Equus, (qui Græcè ἵππος & dicitur, lib. finit. med.) oculo-
rum affectus est, insitus quibusdam, quibus oculi nullo tem-
pore manere possunt requieti, sed tremuli subinde nictant,
& instabiles. 1. progn. 21.*

*Erratica febris, sive inordinata, est, quæ extra horas
consuetas, vel tardius, vel celerius invadit, & inordinatè
tum moveretur, tum consistit. lib. de Typis, cap. 4. Sunt enim
(ait) in erraticis, inordinata principia.*

*Errhina, medicamenta sunt, quæ naribus, quas Græci
Rhinas vocant, capitis purgandi gratiâ infunduntur, aut
induntur. 5. simplic. c. 20.*

*Erythroide, est intima testiculorum tunica. 1. de caus.
morb. cap. 10. Vide Elythroide.*

*Eruptionum, sive, ut Græci dicunt, Exanthematum
nomen, quidam in genere usurpant, de affectionibus videli-
cet cutaneis, ulcerosis, & aspersis, in mento & corporis uni-
versi ambitu sua sponte provenientibus. 5. de compos. med.
loc. cap. 6.*

Eryfi-

Erysipelas, est tumor præter naturam, non aliter descendens, sed in cute consistens, à bilioso humore obortus, colore pallido. 14. meth. 1. Si verò ipsius color non sit omnino pallidus, sed mistus ex pallido, & rubro, erit etiam mista affectio, ex phlegmone (in qua sanguis peccat, coloris rubei) & ex Erysipelate, utiq; ab eo, quod in mistura superat, nomen ipsi inditur, ac dicitur vel Phlegmone erysipelatosa vel Erysipelas phlegmonosum. 14. meth. 1. & 2. Nominant autem Erysipelas, Vicinitrahā, vel Vicinirubiam, quod incensum quidem atque inflammatum est semper, cum tumore & rubore partium circumpositarum. 1. 3. de his, quæ in med. fiunt. 30. & 2. ad Glau. 1. Exactum autem Erysipelas est, quod à biliosa fluxione ortum dicit. 7. simpl.

Eschāra, crusta est, quæ ulceribus veluti seprum, vel suā sponte, vel arte pyroticorum medicaminum usu adnascitur. 5. meth. cap. 3. Vide Caustica.

Escharoticum medicamentum est, quod perinde ut causticū, in crassā essentia est, & cuiusq; inhaerit parti, stipitis ritu infixū, eam excruciat, cōdurit, &c. 5. simpl. 15.

Esthiomenos herpes, est inflammatio ex sincerā flavā bile ad cutem decumbente acriori, & mordaciori quā ea est, à qua oritur herpes miliaris, in hoc enim fluor, pituita mistus videtur, in illo autem exacta bilis rotam exulcerans, & corrodens cutem. lib. de tumor. cap. 9. Vide Herpes, Phagedæna, Nomæ.

Echmyodes platysma, i.e. latus ille musculus, sive musculoſa dilatatio, quæ cuti subnascens, Gnaton, i.e. buccam sive maxillam movet. lib. de nervorum dis. cap. 6.

Evacuationem omnem, sive fiat inedia, sive sanguinis missione, sive purgante medicamento, solitus est vocare Hipp.

Hipp. vasorum Inanitionem. Evacuatio autem præstius dicta, est humorum, qui suā quantitate molestant, purgatio: ut purgatio est humorum, qui suā qualitate molestant, evacuatio. 1. aph. 2.

Euchymia, i.e. succorum in corpore bonitas. 2. simpl. 13. Unde Euchymon nutrimentum est boni succi. 6. de san. tuend. cap. 7.

Eucrasia, est medium omnium temperamentorum, 1. de sanit. tuend. cap. 4. ex optima & convenienti cuiq; naturæ corporiq; mixto, mistura quatuor primarum qualitarum consurgens. Unde ejus magna est latitudo, quā qui adeptus est, εὐκρασία, sive Eucraton corpus, i.e. optimè temperatum corpus nactum esse diceretur: secus Dyscraton, sive intemperatum. 2. de temper. 1.

Euectica, Medicina pars, quā alii Gymnasticam vocant, est, quæ optimum habitum corpori inducere studet. de part. art. med. cap. 5.

Euexia, est bona corporis habitudo. 1. de sanit. tuend. cap. 8. Ut huic opposita Cachexia, est pravus corporis habitus: εὐεξία καὶ καχεξία, illam complent, bona omnium partium temperies, actionum robur, Euchymia, sanguinis, carnis, totiusq; corporeæ molis symmetria.

Evidentes causæ. Vide Continentes.

Euoxon, vinculum vocat Hipp., quod bene gestat, continet & sustinet, h.e. firmiter & sine ulla compressione continet. 3. de artic. 22.

Eupathia, i.e. patiendi promptitudo. 4. de usu part. 14.

Euphyian, vocat Galenus bonam habitudinem. 1. de usu part. 9.

Eupnoea, εὐπνοία, proba spiratio, quæ secundum naturā sit: opposita dyspnœa, quæ est difficilis spiratio. apud Hipp. Eurhy-

Eurhythmus pulsus, est cuiq. ætati, loco, tēpori, temperamento, naturalis & cōveniens pulsus, cūm item suum rhythmum in diastole pariter & systole servat. i. diff. puls. 9.

Eufarcon. Vide Quadratum.

Eusema crisis, quæ cum bonis signis, à sua indicatoria die fuit indicata, ut quæ undecimo die, coctionem in urina, noctem gravem, quæ accessionem præcedit, insultus, cum concussione pulsuum, decretoriam commotionem, & sudores bonos, citra horrenda pericula habuit. i. di. decret. c. 7.

Eustomachus, cibus est gratus stomacho, ventremq. roborans. 6. de san. tuend. cap. 9.

Euthyporos, i. e. in rectum procedens, alterum ex instrumentis & organis est, quæ fractis, vel luxatis cruribus supponuntur, (ὀρθόπους Græci vocant:) quod quidem Euthyporos per unicum axem, qui in fine machinæ ad infernam ejus partem est collocatus, contrarium nixum toti membro, geminâ tensione efficit; quod verò prius sursum, mox deorsum, illud Metalepticum dicitur, quasi translativum dixeris. 6. meth. cap. 5.

Eutrophia, i. e. bona & uberior nutritio. 3. de sanit. tuend. cap. 8.

Exanastomosis. Vide Osculorum apertio.

Exangues corporis partes sunt, ut ossa, & cartilaginee, quæ mucoso quodam humore natura sua analogo aluntur, lentore quodam & albedine prædito. 3. de artic. 6.

Exanthematum nomen, quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet ulcerosis, & asperis in aliqua corporis parte provenientibus, quæ & Pustulæ, & Bothor dicuntur. 5. de compos. med. loc. cap. 6. Sunt autem ἐξανθήματα, sive papulæ, quædam leves eruptiones humorum per cutem efflorescentium; rubra, pallida, flava, nonnunquam

nunquam & nigra, & livida, pro humorum ratione, nunc indolentes, nunc prurientes, cum scalpitu, interdum sinè pruritu, nunc ulcerosæ, nunc ad ultus non devenientes: harum generum sunt φλογιάριαι, ὑδαγάναι, ὑνὸν ὑνὸν ὑνὸν, Variola, Morbilli, quæq. in lue Venerea etiam gignuntur, & quæ in febribus pestilentibus. Vide Pustulæ, Eruptiones.

Exarthrema, luxatio est, non omnis, sed ea tantum, in quâ totus articulus, à sua sede naturali excidit; nam parvam luxationem, non ἐξάρθρωμα, sed παραρτίρωση vocant. 2. meth. 2.

Exarticulatio, est alicujus membri luxatio. lib. de morb. diff. cap. 13. Exarticulationes interdum vocat exarticulata, i. e. osium è propria sede excessus, sinè fractione. comm. 1. in 1. de fract. 1. Vide Luxationes.

Exægritudine senectus, sive Ex morbo senium, (quod & Tabes, seu Marasmus, & Marcor, & Febris tabida, vel Marasmodos dicitur) est extinctio summæve imminutio nativi caloris, ad quam totum corpus contabescit, instar arboris cujusdam supra modum arefactæ, aut ob longitudinem temporis, aut flammæ viciniam, aut vehementem atq. immoderatum squalorem. Et sicut hac qualitas, senibus, annorum multitudinis ratione comparatur, ita tabidis à febrili caliditate. 5. de san. tuend. cap. 9. & 1. de differ. febr. cap. 8. Fitq. ex defectu nutrimenti, ubi quis vel ex electione famem tolerat, vel præ ciborum inopia, fame conficitur. lib. de marcore, cap. 1. Vide Marasmus.

Excavatio. Vide Lordosis.

Excidentia, apud Hippoc. nunc sinè adjectione luxationes osium à propria sede, i. de fract. 1. nunc articularum tantum

tantum luxationes sunt & dicuntur. comm. 3. de iis, quæ in medic. fiunt. 31. Vide Luxationes.

Excrementum, id omne dicitur, quod in alendo corpore nec confici, nec assimilari potuit; cumq; corpori non adnascatur, nec adcreseat, propterea per ipsius laxiora intus spatia, supervacaneum errat, unde nomen quoq; recte à Majoribus ei rei περὶ τῶν ἰσχυρῶν, i.e. pererrans est inditum. 1. de sanit. tuend. cap. 3. Vide Attractrix, & Lotium.

Excutiones, i.e. osium extra cutem ejectiones; de osibus enim extantibus est sermo. 4. de artic. 34.

Exelcismus, est osis, vel osium deductio à superficie in profundum. lib. finit. med.

Exercitatio acuta, cujus celeres motus sunt, est, quæ corpus extenuat & consumit: contraria crassum reddit; multa corpus siccant; mediocris obesum præstat. 5. de sanit. tuend. 3.

Exipotica, digerentia sunt medicamenta. 7. de comp. med. per gen. 9.

Exomphalos dicitur, cui umbilicus foras prominere; quod malum alii rupturam vocant, alii egressionem umbilici: quod accidit, vel Peritonæo rupto. aut procidente Omento, aut intestino, vel humore ibidem collecto, vel carne subnatâ, vel sanguine in loca hæc irrumpente, per Diapedesin, vel aneurysin, vel solo aliquando spiritu irruente. Vide Bubonocle.

Exostoses. Vide Elephas.

Expansa, ἐκτετακτα. Vide Abfcedentia.

Experientia, est ejus, quod sapius & eodem modo visum est, observatio, atq; memoria. ad Thrasib. cap. 11.

Expiratio, est motus thoracis, & pulmonum, quo spiritus per respirationem ad interiora latus, ad exteriora cum fuligi-

fuliginosis excrementis repellitur. 4. aph. 68. inquit, Morio est, quâ, in cordis compressionibus, id, quod fuliginosum est, ac humidum, per laves arterias, extrâ pellitur. 7. de usu part. 9. Vide Inspiratio.

Expultrix faculas. Vide Attractrix.

Exquisita tertiana. Vide Terciana simpliciter.

Exspiratus, species quadam est Respirationis, ex convulsione proveniens, quæ muscularum, qui exspiratum efficiunt, convulsionem sequitur, quam appellat Hippocr. spicritum inter exeundum offendentem. 2. de sympt. caus. cap. 2. & 4. aph. 68.

Extasis, i.e. mentis amotio, seu abolitio, insania est, quæ brevi finitur. lib. finit. med.

Extensum intestinum. Vide Rectum.

Extergentia. Vide Rhyptica.

Externa causa. Vide Procathartica.

Extuberatio, est vertebra alicujus, ab interiori, ad exteriorem regionem facta luxatio. 9. de placit. 4.

Exuccatio, i.e. sugillatio. 2. de fract. 24. Vide Contusio.

Exudare, est circa frontem & clavículas parùm sudare. comm. 2. in 1. de morb. vulg. 75.

Exufflatio, est multi spiritus, ex thorace, per guttur assatim facta emissio, agentibus ad id intercostalibus musculis, contractis, thorace. 1. de loc. aff. 6. Duplex est, altera circa sonitum & strepitum, cum ex utroq; thoracis partibus nihil omnino expirat animal; altera, cum una tantum thoracis parte respirat animal, ita ut semispirans, vel semivocale reddatur, diciturq; exufflatio strepens, vel cum sonitu: illa hiantibus, hæc contractis sit faucibus. 4. de loc. aff. 6.

Exustio, quæ & Deustio dicitur, vel ipsa Solis ope-

ratio, vel is, qui ab eadem hac Solis exustione oritur in corpore affectus, sive ille jam effectus sit, sive adhuc fiat: ubi sapius adest calor quidam praternaturalis, nondum tamen febris, nisi Cor quoque simul sit ultra modum calefactum. lib. 1. de differ. febr. cap. 2. 3.

F

FACIES, Græcè πρόσωπον, est quicquid in anticâ capitis parte, sub totâ fronte, auribus, oculis, naso, & ore ad mentum usque, à superciliis incipiens, circumscribitur. lib. Introd. cap. 10.

Facies Hippocratica, verè mortifera est, cujus nasus acutus, cavi oculi, adstricta tempora, aures frigida & contracta, & fibra earum versa, cutis circa frontem dura, intenta, arida, color totius vultus viridis aut niger est. 1. prognost. 7.

Fames. Vide Sensus indigentia.

Fatuitas, (Græcè νώγωσις, stultitia & stoliditas dicitur) symptoma est citra delirium, ægros naturalibus fatiis similes reddens; quales etiam ex iis, qui consenescent, nonnullos fieri novimus. Simile vitium est ἀνοία, amentia, ignorantia, de qua Thucydides scripsit, in his, qui ex peste servati sunt, hoc pacto, ignoraverunt, tum seipsos, tum familiares. com. 2. in 1. prorrh. 60.

Fauces, sunt internæ oris locus, in quo simul conveniunt & gula, & gutturis partes extrema. 4. de loc. aff. cap. 3. Græci fauces Pharynga vocant, i.e. præjacentem gulæ & gutturis sedem, quâ apertâ videmus evidentem amplitudinem, in qua gemina ostiola visuntur, tum gulæ, tum etiâ gutturis. 3. progn. 10. Vide Lithmus, & Pharynx.

Favus, Græcè μύκωσις, & μείμωσις dicitur. Vide Achores, & Cerion.

Febr-

Febrere existimamus, non eum modò, qui in cute corporis exteriori igneam habet caliditatem, verùm eum cum primò, quicquid in corporis imò, & visceribus continet. com. 1. in 1. prorrh. 7.

Febris, secundum communem omnium hominum consensum, est caliditas præter naturam, maximè quidem in totum animal effusa; sin minùs, at omninò vel in plurimis partibus, vel in nobilissimis accensa, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29. cum is calor adeò auctus est, ut & hominem offendat, & actionem cordis ledat, 8. meth. 1. sive idem calor, ipsum Cordis corpus occupaverit sive eos, qui in ejus ventriculis continentur humores. 1. de diff. febr. c. 1. & 3. & de cur. per sang. cap. 5. Febrim autem dicit Hipp. à fervore & igne dictum; uti nomen πυρετός dicitur ἀπὸ τοῦ πυρός, i.e. ab igne, siquidem febris essentia calorem igneum habeat. 3. de fact. & de caus. morb. cap. 2.

Febris ab apostemate, aliàs Febris phlegmonodes, 14. meth. 9. est, cum aliqui, vel ob inflammationem, obortum abscessum, dolorem, vel erysipelas, lateris, pulmonis, vel alterius partis, febricitant; licet Veteres eos non simpliciter febricitare, sed vel pleuriticos, peripneumonicos, lenos, simpliciter dicant. 4. aph. 73. Eadem etiam Febris accidens dicitur, si post sensibilem alicujus membri advenit affectum; alioquin agritudo & passio censenda est. de differ. morb. cap. 5. & com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris accidens. Vide Febris ab apostemate.

Febris Acmaistica, Anabatica, Epacmaistica, Paracmaistica, Homotona, Caufon, ardens, deurens, continua, ἀκμαστὴς ἢ ἀναβητικὴ, ἀπακμαστὴς ἢ ἐπακμαστὴς, παρακμαστὴς, ἡμωτονία, καὶ αὐωνία Græci vocant. Vide Continua febris.

K 2

Febris Amphimerina, ἀμφιμέρινη. Vide Amphimerina febris.

Febris Cathemerina. Vide Cathemerina febris.

Febris Colliquativa, κολλητική, ex genere est februm, quas marasmodae vocant; hoc solo excepto, quod quae partes in his colliquantur, vaporis vice digeruntur, adeoque evaporant, in illis aut in ventrem influunt: in ardentissimis enim febribus carnes humidae, molles & adipe copioso pollentes, liquari deprehendimus, unde postea in marasmodae febres transeunt, in quibus sicciores carnes redduntur, & corii ritu durantur, nec in ventrem defluunt, ulla ex his sensibilis liquatio. 10. meth. 11. Idque fit, cum corporis humores tenues fuerint, & febris calor acris; nam evaporantur, qui ita extenuantur, per insensibilem evacuationem. 2. de rat. vict. 47.

Februm confusio. Vide Cōplexio febrū, ἐνδόξως.

Febris Diaria. Vide Diaria febris.

Febris diurna & nocturna, quam Graeci Cathemerinam & Mathemerinā vocant, est febris quotidiana, quae nocte vel die remittit quidem, sed non intermittit; quae vero remittit, ad infabricitationem venit, Amphimerina dicitur. comm. 3. in 1. de morb. vulg. 2. & 9. Vide Amphimerina.

Febris Ephemera. Vide Ephemera febris.

Febris facta & fiens. Vide Febris schetica.

Febris focus, est ea animalis particula, quae prima solidā suā in substantiā immodicē fuerit calefacta, quod in Ethicā febre primū est Cor, tum Jecur, tum Venter, tandem quaecumque alia in consensum Cor abripit. lib. de mat. core. c. 7. Focus febris, est particula, quam vel obstructio, vel putredo, vel phlegmone obsederit. 11. meth. 20.

Febres

Febres Hefticas appellant, quae solidas animalis partes occupant; sic dicta, vel quoniam firma ac soluta difficiles sunt, (quemadmodum habitus) vel quoniam ipsum corporis habitum comprehendunt. 1. de differ. febr. cap. 7.

Febris exquisitè Heftica est, quae nullum particulari accessionis, aut principium, aut incrementum, aut vigorem, aut denique remissionem habet: à solo autem cibo assumpto, heftica febres effervescent; aliàs ex toto aequales semper perseverant. lib. de marcor. cap. 8.

Febris Helodes, quae & Typhodes, & humida dicitur, est, cum à prima statim die agrotantes sudant, sudoreque ipso parum, aut nihil levantur: Econtra sicca, in qua sitis urget vehemens, ac scabra visitur lingua, indurataque, ad instar corii cutis, plurimusque, adest in corpore squalor. Adversus Lycum, cap. 2.

Febris Hemitritæus. Vide Febris Semitertiana.

Febris Hepiala, ἡπιαλός, ex genere est quotidiana, quando agri rigent simul, & aestuant, atque eodem tempore in toto corpore utrumque sentiunt affectum. 2. de differ. febr. cap. 6. quae & Epialus appellatur. lib. de inaq. intemp. c. 8.

Febris homotona. Vide Continua.

Febris horrida est, in qua magna accessionis pars horrore consumitur. 2. de differ. febr. cap. 8.

Febris humida. Vide Febris Helodes.

Febris Hyemalis, ea est apud aliquos, quae hyeme fit; apud alios autem ea, quae hyemis tempore est peculiaris. 4. de rat. vict. 61.

Febres lividae, à colore cognomen adeptae sunt, quippe in quibus agri cutis tota livida, & labia, qualia exesis moris esse solent, ad hac oculorum album livescit; sanguineum succum deficere, cum ipso itidem ingentium calidum, sum-

mè exhaustum quatenus nunciant, mortifera sunt, ex quibus nonnulla syncopas etiam efficiunt. com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris lipyria, λεπυρία, est, in qua intus in ipsis visceribus calor sentitur urens, aded ut neque valde subtilium vestimentorum, neque linteolorum velamenta, neque aliud quicquam, prater nuditatem ferre possint; in externis autem partibus, frigus adest. lib. de inaequali intemp. cap. 8.

Febrem magnam, aut parvam, consueverunt Medici appellare, non proprie quidem rei quali, nomen quanti accommodantes; hoc tamen facere assueti, non in febribus tantum, sed in mille aliis rebus, quae licet in qualitate subsistant, magna tamen ac parva dicuntur. 1. de differ. febr. c. 1.

Febris marasmodies, sive febris marcida est, in qua omnes corporis partes, aequaliter marcescunt. lib. de marcor. cap. 5. Vide Marasmus.

Febris marcida, apud Philippum idem est, ac ex morbo senium; quoniam eam Galenus non vult febrem dici, cum in ea frigidius, quam natura postulat, Cor sit factum: ostendunt id, pulsus parvus & rarus redditus, respiratio parva, tarda, & per longa intervalla, quae & ipsa Cordis & parvum ad Cor pertinentium frigiditatem indicat. lib. de marcor. cap. 5. Senium igitur ex morbo, quoniam in illo frigiditas siccitati adjuncta est, febris non est; sed ut tantum febris dici potest marcor, qui & corridus dicitur, & marcor syncopicus; his enim ambobus est pulsus frequens & parvus, agriq; dum oscitant, spiritum efflant calidum, ut jure ipsum ardori & aestui assimilare possis, qui marcor torridus, ex caliditate, ardentissimiq; febribus, praesertim in sicciori corporis habitu, fit; frigidus autem marcor senilis, fit ex permutatione febrium, quae, cum per aqua

aqua frigida potionem, tum per ea auxilia, quae refrigerandi gratia hypochondriis, ac thoraci imponi solent, fuerint secus, ac oportet, refrigerata. lib. de marcor. cap. 5. Vide Ex ægritudine senectus.

Febris Mathemerina. Vide Febris diurna.

Febris mitis est, quae Medici manum non mordicat, neque exurit aut ferit admodum, vaporem aded minimè mordacem exhalat; huiusmodi est Diaria febris. Mitis autem dicitur, non simpliciter quidem, sed per comparationem cum febribus ardentibus; siquidem omnis febrilis calor sit igneus, acer & mordax, sed hic magis, ille minus. Vide Febris simplex.

Febris modos, nonnunquam mores vocant, nonnunquam differentias, vel essentias: cum e.g. dicimus, Febrim boni vel mali moris, esse benignam, vel malignam. 1. de morb. vulg. 10.

Febris Pemphigodes, πεμφυγώδης, est, quae per caloris intensionem, pustulas in ore, Graecis Phlyctides dictas, generat. lib. finit. med. Insuper, Pemphigodes febres, per spirituum effluvium evanescentes interpretantur; sentimus enim plerumq; per febricitantium cutes, aërium quendam halitum effluentem. Dicitur quoque Pemphigodes, febris flatulenta, vel flatuosa; sed hanc pleriq; vario modo interpretati sunt. Quidam diariam febrem intelligunt, natam ex spiritibus accensis; alii febrem madentem & humidam, ab effluvio quodam vaporoso, per cutem erumpente; alii eam febrem sic vocant, quod veluti exilientium, & manui occurrentium scintillarum opinionem praebet; vel ita appellatur pestilens, ut & πεμφυγών, i.e. quae cum pustulis efflorescit. Quoniam possit etiam per Pemphigodé febrim intelligi Synochus non pu-

tris, quam ob id inflativam vulgus Medicorum vocat, quod calore febrili fervente, vena omnes plurimum sint inflata, & sanguine flatuoso, & bulliente, plena. Verum Galenus in eam sententiam inclinatur, ut Diaria intelligatur, qua in spiritibus accensis, rarenter putrentibus, subsistit. com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris pestilens est, qua à calidiori ambientis aëris constitutione, (qualis maximè circa Canis ortum contingit) vel à putrescibili vaporatione, manifestè Cor calefaciente, excitatur. In Febris omnibus simul Cor affici est necessarium, & cum supra modum incaluerit, ipsum primum atq; potissimum febrilem calorem suscipere, atq; ad universum corpus transmittere. 1. de differ. febr. cap. 4. Vide Endemum.

Febres putridæ sunt, quæ ex humorum putredine accenduntur, cum rigore extremorum, frigore, vel horrore incipientes, inæqualitatem pulsuum habent, & calorem, sive in principio sive in augmento, acré & mordacè: systole est velocior ipsa diastole, urina cruda, ejusdem febris declinationem, integra non subsequitur quies. 1. de diff. febr. cap. 7. Generantur autem à præcedentibus causis, non à præincipientibus. Quæcumq; enim in ipso animali sunt vel dispositiones, vel motus præter naturam, ægritudinum præcedentes causas nominant; quæ verò extrinsecus adveniunt, & alterant corpus, atq; transmutant naturam vehementer, præincipientes appellant. de caus. morb. c. 2.

Febris putrida intermittens est, quæcumq; ad sensibilem infebrecitationem pervenit, ortum habet ab humore putrido, qui per omnes corporis partes, expultrice vi deferitur. 2. de differ. febr. cap. 1. Cujus tres sunt omnino differentie, quotidiana, tertiana, quartana. Quotidiana,

qua

qua ex pituita putredine est; ex urinaq; verò bilis, flava quidem, tertiana; nigra autem, quartana. 2. de differ. febr. cap. 2.

Febris quartana. Vide Febris putrida.

Febris quintana, sextana, septimana, est, cum acri non prorsus ab affectione morbosa sunt liberati, sed semen aliquod retinuerunt; his usu venit, ut victum convenientem negligentibus, sæpe sexto die à principio febricitare, sæpe septimo, non raro octavo, vel alio; & cum febris statæ periodi emanerint, ac cessaverint, acri purgantibus, se prorsus esse liberatos, eodemq; omnino victu utentibus, ex semine morbi reliquo, totidem diebus affectio febrilis prima redit. Non igitur ex vi morbi hic circuitus datur, sed ex residuo affectionis, & inordinato infirmorum victu. com. 2. in 1. de morb. vulg. 7.

Febris quotidiana. Vide Febris putrida intermittens.

Febris remissio sive Infebrecitatio, totum illud tempus est, quod accessionem sequitur: id ipsum tempus alii intervallum, alii declinationem, submissiorem, vel ablationem nominant. de morb. temp. cap. 6.

Febris reversiva est, non acuta, sed diuturna, imperfectas habens solutiones, quæ postea rursum exoriuntur.

Febris sanguinis, est febris simplex, Synochus non putris dicta, in qua sanguis secundum naturam se habens, accenditur quidem, sed non putrescit, febris similis ephemeris, & quæ ex inflammationibus inguinum accidit; nam & inguinis inflammatio, ex bono sanguine, sed accenso, fit. 2. de cris. 12. Putrescit quidem interdum sanguis, sed ex eo simpliciores fiunt febres, quàm ex aliis humoribus; similem verò accessionum proportionem assumunt, qualem

tertiana febres ostendunt. Quod si sanguis supra modum affetur, pars ejus subtilior, ac pinguior, in flavam omnino convertitur bilem: quæ autem crassior, in atram: ut in carbunculis contingit, in quibus sanguine supra modum effervescente, ad melancholicum humorem fit transmutatio. 2. de differ. febr. cap. 9. Presentem itaq; febrem videtur reponere in ordinem febrium Synocharum non putridarum, quo etiam numerat febres diarias. 9. meth. 2.

Febris hecticæ, quæ facillè discutitur, opposita est febrì hecticæ, quæ difficulter solvitur: ut enim illa fit, ita hæc facta est. 8. meth. 1.

Febris semitertiana, sive Hemitritæus, *μεινέται*, est, quæ ex quoridianâ continuâ, & tertianâ intermittente, complicatis confunditur, 2. de diff. febr. cap. 7. fit ex pituita, & flava bile sibi proportionè respondentibus & equipotentibus. Ibid. cap. 8.

Febris significatio, Græcis *ἐννοουμένη*, est primus insultus, accessionis tempus indivisibile, exactè jam primum, lib. de morbor. temp. cap. 6. quæ & Annotatio dicitur, 2. aph. 1. Vide Insultus.

Febris simplex dicitur, quæ à primo statim die, acuta fit licet, non tamen supremè, sed simplicissima & cum tenuissimis signis, invadit, quam Hippoc. *ὀξεία*, micem nominat seu, boni moris. 1. de cris. cap. 16.

Febris singultuosa est, in qua agri singultuendo, rodetem, acerrimèq; humore evomunt, nec a singultu, donec febris in totum soluta sit, vel propè, liberantur. 4. acutor. 69.

Febres spirituolas quidam nominant, (quas Pemphigodes aliter appellant) ob difficile anhelitum, in quibus siquidem magnus creberq; spiritus redditur. comm. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris

Febris syncopalis, *συνκοπή*, est, ubi propter maximam crudorum succorum copiam, adeoq; oris ventriculi, propter offensionem, præcordia instantur, totum corpus ampliore mole, quàm pro naturæ modo, cernitur, cum color ad albidius, vel lividius, vel nigrius, seu plumbei coloris tendit, pulsus minores, obscuri, & inæuales, & syncope etiam solet apprehendere agros stomachica. 12. meth. 3. Est & aliud syncopalis febri genus, quod non ex crassorum & crudorum succorum copia fit, sed ex tenuibus succis, qui ocysimè exhalant, in quâ agri syncope similiter opprimuntur. 12. meth. 6. Priorem vocat Avic. syncopalem humorosam; posteriorem, syncopalem minutam.

Febrem Synochon Græci Medici appellant, in qua una similisq; serè accessio ab initio ad finem perpetuò manet; cum enim accessionis remissio ex ferventium humorum transpiratione contingere soleat, & verò in Synocho, ob vehementem stipationem, illi non transpirent, febrilem proin necesse est multorum dierum fieri accessionem. 9. meth. 2. Vel ea est Febris synochus, quæ omni magnâ mutatione usq; ad judicationem caret; hæc Latinis Continens dici potest. Caterùm, etsi una sit idea hujusmodi febrium, à qua Synochos eas nominant; natura tamen earundem minimè simplex, unaq; est; quædam namq; earum manifestam habent putredinis notam, quædam verò prorsus non habent; quæ ex diariarum febrium genere sunt, illas vocamus Synochos putridas; has Synochos non putridas: Barbari hanc vocant Synocham, illam Synochum. Galenus 9. meth. & 2. de differ. febr. indiscriminatim utrâq; voce utitur, & Synochi & Synocha, utraq; sub Synochi nomine comprehendens. Atqui Synochus febris,

bris, & Synoche, *Græcè οὐνοχῆ, & οὐνοχῆς*, h.e. Continens, & Continua differunt, quod in Synocho nulla sit fervoris remissio, in Synochis autem singulis, accessiones in remissionem sensibilem terminentur, neutra tamen ad infibricationem pervenit. 2. de cris. 6. Vide Synocha.

Febris tabida. Vide Marasmus.

Febris tertiana exquisita, est ea, qua tertia quoque die, accessionem faciens brevem, cum frigore invadens, sudore, bilis vomitu, & biliosa dejectione terminatur in infibricationem. Eadem sit à bile putrescente, cui si aliquid dictorum deficit, non exquisita, sed simpliciter tertiana dicitur; quod si intermissio sit minor, & accessio longior, dicitur tertiana extensa. 2. de differ. feb. 8. & com. 2. in 6. de morb. vulg. 25. Vide Febris putrida intermittens.

Febres Tritæophyes, *τρίταοφύες*, h.e. tertianarum naturam referentes, sunt, qua tertio die invalescunt. 2. de diff. febr. cap. 2. Vide Tritæophyes febres.

Febris Typhodes, *τυφώδης*. Vide Febris Helodes.

Fellis folliculus, est vesica fellis. 5. de loc. aff. 7. Vide Cyltis, & Choledocos.

Femen. Vide Interfemineum, & Perinæon.

Femur, à ferendo, quod totius corporis reliquum ferat, & sustineat veluti onus, idem ferè quod crus, os, magnitudine cunctis animantis ossibus præstat supra ex coxendicis, infra ribia ossi alligatur, cujus cervicis duo sunt exigui processus, quos Trochanteres vocant, quorum exteriorem, qui longè major est, Gluton, h.e. Natem appellant. lib. de ossib. cap. 21.

Fermentatio. Vide Fervor.

Ferina desipientia. Vide Desipientia ferina.

Fervor, sive fermentatio, affectus est, ab atra bile proveniens,

veniens, ubi amplius incaluerit aut propter putredinem, aut febrem phlegmonodem, quam nullum animal, ne ipsi quidem mures gustaverint; terra quoque raditur ab ea; ac partes, qua ab atra bile raduntur, omnes in altum attolluntur. 14. meth. 9.

Fibræ, seu Villi, sunt tenues quædam & subtilissima nervorum, & ligamentorum propagines, filamenta, aponeuroses, & denervationes, quibus opitulantibus (perinde ut manus digitus) nervi & musculi actiones suas obeunt. 9. de usu part. 2. & 1. de placit. cap. 10.

Fibula. Vide Cnemi.

Ficationes. Vide Sycofis.

Ficatum, i.e. Jecur, sic dictum est, quod omnium animalium partium compactissimum, ad coquendum difficile, tardèq; permeat, propterea mactandi animalis jecur, multarum ficuum siccarum esu, præparatur, ut evadat se ipso melius, cum animal ipsum, caricas assatum comederit; quâ solâ ratione factum est, ut hanc appellationem sortiretur. 3. de aliment. facult. cap. 12.

Ficosus tumor, est tumor in mento natus, ex crassiori humore, & serosiori tenuitate, quam Varus. 5. de compos. med. loc. cap. 4.

Ficus in oculo, est tuberculum quoddam, à crassiori humore oculi partibus affectis adhærescente, com. 3. in 3. de morb. vulg. 48. Græci οὐνα ἢ οὐνάδες, eruptiones ulcerosa sunt, rotunda, subdura, rubicunda, quas dolor comitatur: sit hoc malum, magnâ ex parte, in capite, sed & reliquo etiam corpore: sit etiam in ano, & Marisca dicitur: in palpebris adhuc sit, & dicitur etiam οὐνοῖς, quod scilicet locus granorum referat similitudinem, unde ficosam appellant palpebram.

Fistula,

Fistula, *ὄρυξ*, est angustus & longus sinus, lib. de tñ. mor. cap. 5. per similitudinem dictus à musicis instrumentis, quæ oblonga obtinent cava; fistulæ nominari solita. 2. progn. 64.

Fistula urinaria, Urethra, Græcis est meatus in peane, per quem urina redditur & ex corpore excernitur. 4. aph. 76.

Fistulosus, seu flatuosus nervus. Vide **Cavernosus**.
Flatuosus morbus. Vide **Hypochondriacus**.

Flatuosus spiritus, qui & **Flatus** dicitur, tumorem excitans flatuosum, crassus ac vaporosus est vapor, neutiquam tenuis; ille enim aëri austrino, hic vero aquilonari aëri assimilatur: hic in nobis secundum naturam est, & proin conservandus; ille vero seu crassus extenuandus ac corrigendus. 2. ad Glau. 6.

Flava bilis. Vide **Amara**.

Flexus variciformis, est plexus ille venarum, & articularum in testibus, in cuius primis flexuum partibus sanguis fingerus continetur, qui in ultimis ejusdem flexus vasibus ad ipsos testiculos, non amplius ruber planè, sed quodammodo albicans exiguum adhuc requirit, ad perfectam substantiæ seminis generationem, quod ei à testiculis ipsis accedit. 1. 9. de usu part. cap. 4. Vide **Glandulosi** asistentes.

Fluctuatio cum sonitu, Græcè *κλύδων*, symptoma est facularis concoctricis & retentricis, nec arctè satis, nec sufficienti tempore complectentis, eamq; ob rem insufficienter etiam concoquentis alimentum: undè ed diutius in ventre gravitas ex alimento manet, quod tardiùs concoquitur, præsertim cum nihil in eo continetur, quod veri ins flatum possit, ventriculo vehemèter perfrigerato existente.

Flu-

Fluxio, quædam est inflammationum causa, nempe quæ perinde ut inflammationes, non admodum occulta, tamen si quandoq; nullâ sensibili fluxione præcedente, membrum cõfestim patitur inflammationē. **Affectio**, inflammationem quæ generat, **Rheuma**, i. e. fluxio vocatur, ipsa vero passio, dispositio Rheumatica. 2. ad Glau. 2. **Fluxio** insuper dicitur pilorum defluvium, quod tabescentibus magnâ ex parte, atq; ex diuturno morbo convalescentibus, evenit. lib. finit. med.

Fluxiones ventris vocat Hippoc. cum semper & assidue, humida dejiciuntur excrementa, sine teneismo, & lienteria. 1. de morb. vulg. 36.

Fluxus hepaticus est, in quo ob imbecillitatem hepatis, ab intemperie frigida inductam, alvi sedimina, aqua, in quâ nuper macerata caro abluta est, redduntur similitima. 5. de loc. aff. 7.

Fluxus muliebris, est sanguinis albi saniosi ex utero profluvium. 9. simplic.

Focile majus & minus. Vide **Cubicum**.

Focus febris. Vide **Febris focus**.

Fœtus (quo tempore in utero, semen, seminis speciem refert, ut in abortu & dissectione visum est) ab Hippoc. vocatur, ubi semen in uterum injectum, sanguine repletum fuerit, & Cor, & Cerebrum, & Jecur indistinctam quidem adhuc & informem, quandam tamen coagulationem, & magnitudinem alicujus momenti præ se tulerint, carneaq; appareat fœtus substantia, nec ampliùs seminalis; undè neque genituram ampliùs, talem formam appellat Hipp. sed fœtum. 1. de semin. cap. 9.

Folliculus fellis. Vide **Fellis folliculus**.

Fomenta, & **fotus**, sunt, qui per spongiæ, calidâ aquâ deco-

decoctionis alicujus simplicis imbutas, & expressas, alicui corporis parti fiunt. 2. de loc. aff. 1.

Foramen cœcum, idem est quod auditorius meatus. Vide Auditorius meatus, & Cœcum foramen. Cœcum dicitur, non quod revera cœcum sit, sed ob flexuosam meatus auditorii obliquitatem: quæ causa est, cur funiculum, aut setam porcinam in hoc ipsum foramen immisissam, transmittere non possis. 9. & 11. de usu part.

Foraminulenta ossa. Vide Cavernosa.

Foratio, est idem quod Perforatio sive Trepanatio, quâ utimur in fracturis Capitis, cum usque ad Cerebri membranas, Calvariam dividimus. 6. de compos. med. per gen. cap. 2.

Formatrix virtus, ex semine in uterum coniecto, statim temporibus, universas & singulas conflat partes, ejus, quod gignitur, hercle optima & summa ars, quæ omnia alicujus gratiâ molitur, sic ut nihil oriosum sit, aut supervacaneum. 1. de natur. fac. cap. 6.

Formica, aliâ Myrmecia, & selsilis Verruca dicitur. 2. meth. 2. Vide Myrmecia.

Formicans pullus. Vide Vermiculans.

Fornices seu testudines, quas Græci Psallidas, Latini locadæa vocant, est forma & figura concava, figurarum omnium ad patiendum difficilima, quâ forma multa edificia configurantur, ad cujus similitudinem, pars Cerebri intrinseca quedam efformatur, Fornix nuncupatur. 11. de usu part. cap. 15. Vide Camarion.

Foveola, est cavum ulcus, sed parvum, in nigro oculi, lib. finit. med.

Fractura. Vide Unionis solutio, & Rhegma.

Fractura caulatim sive ad instar diruptorum caulium

caulium, & in medio perfracti raphani facta. Vide Abductio.

Fricatio (τέξις) sicca est, cum corpus universum, solis manibus vel linteolo, nullo admisto humido, aut pingui corpore, fricatur; cui opponitur frictio humida, quæ fit per aqua & olei admisionem: ubi enim, cum oleo aqua confunditur, haud facîle solubili misione coit, ita ut, quibus corporibus ita inungitur oleum, necesse sit, & plusculum inharere aquam; sola enim aqua, quæ foris circumfunditur, facîle defluit, & quæ in poros ingressa corporis, nullam habens ansam, promptè effluit, nisi oleum admisceatur. 3. simplic. cap. 25.

Frigus, non eodem modo in sanis, & ægris sumitur: in ægrotantibus enim aliud est, rigere, aliud, horrere, aliud, algere; Accessionis etenim insultus alius cum rigore, alteri cum horrore, alteri cum sola frigiditate oritur. Quod si quis, cum nulla concussionè & agitatione corporis perfri-gescit, nec corpus, nec omninò cutis inaequaliter, & præter voluntatem eidem moveatur, perfrictio dicitur: non tamen hic riget, nisi motum concussionis inaequalem, & cutis, & totius corporis sentiat, idq; Rigor, πῖρ & dicitur; si verò cutem quidem perturbet, & per quosdam insultus quatiat, corpus autem totum non commoveat, Horror, & Horripilatio, Græcè πένος nominatur. Et proin Horror, affectus solius cutis talis existit, qualis totius corporis passio, existit Rigor. lib. de trem. & palp. cap. 6.

Frons, μέτωπος, est pars faciei supra oculos sita, & ad tempora usq; protensa, substantia musculosâ, & osse subiecto (quod Coronale vocant) constans, superposita superciliis, pilis nuda, inter utramque aurem sita. lib. Introduct. cap. 10.

Fugaces fructus, aliàs Horarii, & Horæ dicuntur, sunt, qui nascuntur eo tempore, quod Horam vocant. Est autem Hora, Græcis id anni tempus, in cuius medio Caniculam exoriri contingit. Tempus porro hoc, est dierum quadraginta, quo tempore horarii fructus constant, nonnulli jam declinantes, alii incipientes, alii in suo vigore, aut ultra vigorem, aut citra consiscentes. Vocant autem ipsos horarios, non solum quod dicto fiant tempore, sed (ut mea fert opinio) ut ita ab his, qui ad reponendum sunt idonei, distinguantur, quando & triticum & hordeum, semina verealia, & omnia, æstivam quidem atq; anniversariam habent generationem; sed non citò corrumpuntur, sicuti propriissimè horarii dicti fructus, ut cucurbita, mora, pepones, melopepones, persica, & alia id genus, quæ si quis in hyemem servare volens, exsiccata reposuerit, eo etiam modo veterem naturam, in contrarium imitabuntur. 2. de aliment. facult. cap. 2.

Fuliginosus vapor est, qui ex deustione assarorum elevatur. lib. de usu puls. 7.

Fuligo. Vide Fumus.

Fumus & Fuligo, vapores sunt, qui elevantur, ille quidem ex materiis semivivis, hic verò ex immodicè assu, ustisq;. Est namq; fuligo, vapor terrestris, fumus, mistio quædam ex terrestri, aqueaq; substantia. 8. meth. 5. utrumq; materia, ex qua oritur, adustum excrementum, quod in sublime fertur, significat, non secùs ac in febribus fuliginosum excrementum, expirationis & contractione arteriarum, natura, ex corpore expellit. 3. de prasag. ex puls. cap. 7.

Fulva. Vide Dichroma.

Fonis brachii vena, est pars vena humeralis, quæ protenditur, secundum diversas adjutorii (i.e. ossis humeri) partes.

partes. lib. de anat. viv. & de ratione cur. per sang. cap. 16.

Fungos, vocant crassas palpebrarum eminentias item ex capitis vulneribus quæ nascuntur, & ægrè sanantur. Gal. com. 3. in 3. de morb. vulg. 49.

Furcula superior, & inferior. Vide Claves.

Furfuratio, quæ & furfur, & πικρία appellatur, est, cum quibusdam se scalpentibus furfuribus similia, ex capitis cute decidunt, à vitiosis succis nutritiis provenientia. 1. de compos. med. loc. 6. ubi affectus hic Pityriasis dicitur.

Furor. Vide Melancholia.

Furor ægrotans, amatorius, qui ex amore fit; perinde atq; is, qui ex Musis, πῶτον δὲ dicitur.

Furunculi, Dothienes, ὁδοὶ Græcis dicti, tumores sunt præter naturam, ex genere phlegmonum, ex similibus humoribus, quibus & Vari genti, exerentes sese per universum corpus. Duplices sunt, aliqui, ut ita dixerim, variosi, duri, & ægrè concoctiles; aliqui inflammatorii, adnexas habent febres, ubi tumor in magnitudinem excrescit, & in pus transmutatur. 5. de compos. med. loc. c. 7. Estq; furunculus mitis quidem, cum in ipsa sola cute constituitur; malignus verò, cum alrè exoritur, Phymati, i.e. tuberculo similis, à quo solà duritie differt. 1. de tumorib. c. 15.

Fulaneus morbus est, qui omni loco & tempore fit. Gal. lib. finit. med.

G

GANGLIA. Vide Ancos.

Ganglia, γᾶγγλιον, Avicenna & Paulus vocant glandulas, apostemata sunt glandulosa, sicut ut vellana, & nux accidunt, super manus & frontem, compressa digitos effugiunt, & mox redeunt, & aliquando multiplicantur, quandoq; impositione, & forti alligazione lamina plumbea

L 2

curantur & discutiuntur: passionēs has etiam Contra-
ctiōnes vocat Gal. 5. de compos. med. per gen. cap. 7. Paulus
lib. 4. cap. 16. Vocantur etiam & Gangilia, quasi concre-
tiones, & contortiones quadam, ex lento & mucoso humo-
re accrescente & conglomerato, quod propriū nervorum
alimentum est. 2. de artic. 56.

Gangræna, γὰγγραινα, est alicujus membri mortificatio,
ex magnitudine inflammationis, quæ adhuc sit, non autem,
quæ jam facta est. 2. ad Glauc. 9. Nam cum omnino membrū
effectum est demortuum, ita ut punctum, vel sectum, vel
ustum, non sentiat, quæ patitur, statim id ipsum rescindere
oportet, quæ sanam partem vicinam attingit, sed quod ita
affectedum est, denigratur; quod verò in medio est constitu-
tum, ita ut tendat ad mortificationem, Gangræna no-
minatur. Ibid. Vide Syderatio. Hippocrates Gangræ-
nas quoq., emortuarum venarum torporem, nominat, qui
ex nimia inflammatione consequatur. 2. de fract. 24.

Gargareon, sive Gurgulio, Cion Columna, Cur-
gulio, est ea gutturis pars, quæ faucibus adjacet, cum se-
cundum naturam se habet; cum autem morbo afficitur,
ita ut ejus extremitas phlegmone laborans, sit similis acino
uva, dicitur Uva: quando tota hæc pars afficitur, Cion
Columna. Dicitur & Himās, Græcis γαργάρων, γαργάρων,
uov, uovis, iud. 4. de loc. aff. cap. 3. Id ipsum Gargareon
quia ad vocis modulationem fit, ideo à quibusdam ple-
ctrum, πλῆκτρον, i. e. vocis refractorium appellatur. 7. de usu
part. cap. 5. Hanc eandem partem, Columellam, Sta-
phylem, & carnosam particulam summo ore de-
pendentem vocant, 6. de compos. med. loc. cap. 3. Vide
Columella, Pharynx, Staphyle, Epiglottis.

Gastrocnemion, est posterior tibiæ pars carnosæ, seu
tibiæ

tibiæ venter, (ut anterior tibiæ pars carnis expers, dicitur
Anticnemion, ἀντιγαστήριον,) Græcè γαστρογαστήριον καὶ γασ-
τρογαστήριον, Sura appellatur. lib. de muscul. diff. cap. 32. &
2. de anat. adm. cap. 4. Vide Sura.

Gastrostrophia, i. e. abdominis sutura. 5. de anat. adm.
cap. 6.

Gemelli. Vide Nates Cerebri.

Genæ, aliàs Malæ, γένους, faciei pars sunt, quæ inter
nasum & aures sitæ sunt, quæ benè coloratis & ingenuis,
pudore suffusis, rubent. lib. Introd. cap. 10.

Genion. Vide Mentum. lib. de muscul. dissect. cap. 2. Vide
Mentum.

Genitalis meatus, quem varicosum assistentem
vocant, maxima illa via est, quæ genituram, à testibus
haustam, ad Coli radicem deferit. 1. de semin. cap. 15.

Genituram, appellat Hippoc. illud, quod in abortu re-
jectum, vel dissecto utero exiens, seminis speciem represen-
tat, non autem animal constitutum; id quod primū duo-
bus mensibus solet accidere, quo tempore neq. fœtum, neq.
embryon vocat, sed genituram. 1. de sem. cap. 9. Geni-
turam etiam aliquando appellat, membra genitalia, & in
seminis quidem uterum, in maribus verò, seminaria vasa
quæ nuncupantur. 3. de art. 41. Vide Cyema. Frequentius
autem genitura sumitur, pro semine recenter emisso, vel
in suis vasīs adhuc contento, Græcè γόνι. Hipp. lib. de natu-
ra pueri.

Genu, Græcè γόνυ, est femoris & tibiæ dearticulatio,
& artificiosissima connexio, & talis quidem, in quâ sinus
quidam prominens, alterius caput excipit, quod anteriori
parte, quod firmitus fieret, rotula, seu patella munivit, quam
ὀφθαλμὸν, & ὀφθαλμὸν ἰδέα vocant, quæ prohibet, ne femur cur-

variis, aut per declivia currentibus loco excidat, & dilabatur. lib. de osib. cap. 21. 22. & lib. Introd. cap. 10.

Gerocômica, ἡ γερωνική, est ea Medicina pars, qua senes regit, iisdemq; convenientem vitam ac victus rationem præscribit. de part. art. medic. cap. 5. De qua incertum, an ad ὑγίαινον, an ad ὁρεον ὡς ἰατρικὴν pertineat, cum senum corpus, neutrum sit, plures tamen eam salubris Medicinæ partem esse statuunt.

Gibba Hepatis. Vide Sima.

Gibbositas, quæ Græcis κόρυς dicitur, est distortio spinæ, in posteriore partem. 3. de artic. 2. Vide Cyphosis, & Incurvatio.

Gibbus est, ubi inter distractas vertebrae, vel una, vel plures illas permanserint; sit, ubi unica duntaxat vertebra, aut etiam duæ, aut tres, sese deinceps consequentes distrahuntur, eâ parte, quatenus spinam cavari contingit. 4. de loc. aff. 5.

Gilva emplastra. Vide Dichroma.

Gingivæ, γίνγβα, carnes sunt, quæ sunt circa dentes. 9. de usu part. cap. 15. ubi primum è locellis suis & alveolis emergunt. 5. de compos. med. loc. cap. 8.

Ginglymos, species est Diarthroseos, quæ ossa, sese invicem ingredientia, conjunguntur, ita ut unum idemq; os excipiat simul & excipiat: sic ergo connectuntur, & G. ut vertebrae, inter se, ac cubitus, humerusq; colligantur. lib. de osib. in proem.

Glabrities. Vide Madarosis.

Glacialis humor. Vide CrySTALLINUS.

Glandium. Vide Thymus.

Glans, est finis, & extrema totius Colis pars; cutis, quæ eam vestit, præputium dicitur. 5. meth. cap. 13. Quamquam Aristot.

Aristoteles 1. de hist. animal. cap. 13. dicat, cutem, quæ Glandem integrit, carere nomine, & totum, quod ex ea cute, glandeq; constat, præputium appellat. Dicitur alio significato etiam glans, supposito, tum, quod clysteris loco sedi induitur. 6. de compos. med. loc. cap. 3.

Glandula, corpus quoddam carnis forme est, laxum & fungosum. Glandula (inquit Gal.) utiq; velut cunei quidam, vasorum divisionibus incumbentes, fulcrum ipsi suggerunt, ut à nullo violento casu afficiantur. 4. de usu part. cap. 20. Glandulam etiam suppositorium vocat, com. 2. in 1. prorrh. 6. Glandulam etiam Thymum dicunt, 3. de aliment. facult. cap. 6. Sunt autem propriè sic dictæ glandulæ, (quas Adenes vocant,) imbecilliores corporis partes, ad quas valentiores corporis partes, super vacuâ & sibi tum quantitate, tum qualitate adversâ transmittunt; quippe valentius est arteriarum, venarum, nervorum, musculorum robur; imbecillius autem, aut prorsus nullum, quam corporum glandulorum natura. 13. meth. 5.

Glandulæ laryngis, sunt corpora laxiora, & fungosiora ceteris glandulis, laryngi utrinq; adjacentes, facta à natura, ut partes omnes, quæ tum ad laryngem, tum ad fauces pertinent, humore ad ipsas largiter decumbente persunderent. 7. de usu part. cap. 17.

Glandulosi assidentes, vel astites, vel parastatæ, vasorum seminariorū plexus, seu flexus variciformis, plexus Capreolaris, & Hæderarius, 1. de sem. cap. 12. homonyma sunt, significantia duo vasa, venam scilicet, eiq; subjacentem arteriam, flexus multos numero æquales, instar capreolorum quorundam, variè complexorum efficientia, quo in implexu, sanguis & spiritus, qui ad

testes feruntur, diutissime coquantur, ipsumq; semen elaboratur, idem flexus postremi in testes terminantur, qui testes, laxi & cavernosi, chymum, qui in vasis incepit concoqui, excipientes, exactius percoquunt, & perfectam seminis formam ubi adeptus est, id ipsum per aliud vas, quod ad pudendum porrigitur, semen ejaculantur: quod vas spermaticum maribus latum & longum, seminis angustum & breve natura concessit. 14. de usu part. 10. & 11. Varicosum assidentem vulgus Vasa deferentia appellat, uti vasa sepe priora, præparantia. 1.1. de semip. c. 15.

Glandulosa corpora, primus Herophilus, ἀλωαδὰς νεφράτας, quasi glandulosos præfides, aut prostates appellavit: sunt illa, utraq; parte colli vesica, locata; in iisdem humor quidam, spermatis similis, crassus, viscosus, verum longè tenuior continetur, qui in coitu simul unà cum semine elabitur, reliquo autem tempore omni paulatim congeritur: cujus usus est, ut ad Venereum coitum excitet, & in coitu delectet; deniq; ut ad instar olei meatum urinarium humectet, & inungat adversus urinæ rosonem, & ne exsiccatus confideat, prohibeatq; quod minus per se lotium ac semen facile feratur, in masculis glandes hæc (alias vesiculæ seminariæ dictæ) notabilis magnitudinis sunt. 14. de usu part. & 1. de semin.

Glaucosis, γλαυκώσις, Glaucedo, est oculorum affectus, ex immodica siccitate, vel concretionem humoris crystallini, vel ex largiori ejus evacuatione (qua in computationibus accidit) progigni solitus, cæcitatem præ omnibus aliis, qui oculis accidunt, morbis maximè inferens. 10. de usu part. cap. 6. Glaucoma verò (γλαυκώμα) est naturalium humorum, in glaucum colorem mutatio. lib. finis. med. Diciturq; id oculi vitium, quod ortæ suffusione, ex humo-

humore circa pupillam valdè concreto, & resiccato contrahitur, & oritur: undè Glaucedo à siccitate est, ut Glaucoma ab humiditate: & propterea Gal. 3. aph. 31. dicit, Glaucoma speciem esse κοχυμάλου, i.e. Suffusionis; non tamen docet esse eundem morbum: differt enim suffusio, cum à Glaucedine, tum à Glaucomate; quod suffusio extranei humoris, & aliundè influentis concretio; glaucedo verò ipsius humoris crystallini est densatio, & resiccatio. Nec omnes suffusiones tantæ sunt, ut toti pupilla prætendantur, & visum ex toto adimant; Glaucoma verò crystallini universi est, atq; siccitas, per ipsum totum ex aquo diffusa, & ex siccitate concretio. Ad hæc, pleraque suffusiones curationem recipiunt, cum tamen nullum glaucoma curetur: uti nullus alius morbus, ab immodica siccitate proveniens, facile & plenè curatur.

Glaucedo. Vide Glaucosis.

Glaucoma. Vide Glaucosis.

Glene est, quod in superficie extremi ossis, tum capiti, tum sinuum, situm est, ab ocularis sinus similitudine sic dicta. lib. de ossib. in proem. Vide Articulus.

Glénoides, sunt duo sinus leniter cavi, in inferiore summa vertebra parte, (quos ab ocularis sinus similitudine sic appellant) similes superioribus: quanquam sinus superiores, (cum caput ipsum excipiant) non abs re sunt majores; infra verò minores sunt, qui vertebra secundam admittunt. lib. de ossib. cap. 8.

Glossocomion, aut Glottocomion, machina quædam est, in qua extenduntur & vincuntur fracta membra laqueis, ad justam eorundè distentionem. 7. de usu part. c. 14.

Glutia, Γράτυ γλῦτια; i.e. paræ nates Cerebri, sunt tenues ac prælongæ Cerebri eminentiæ, ex utraq; parte

illius meatus, qui spiritum ex medio Cerebri ventriculo, in Parencephalidis ventriculum transmittit, quarum concursus, hominum conjunctus inter se femoribus, sive natis, rectissime comparaveris. Sunt autem, qui Didymia, h.e. testiculis, ea assimilantes, malunt vocare Didymia, sive testes; quæ verò huius proxima, glutia. 9. de usu part. cap. 14.

Glutinatorium medicamentum, quod & sanguinariū, cruentis opitulans, & enæmon dicitur, est, quod vulneris oras committere & glutinare molitur. 3. de compos. med. per gen. cap. 2.

Gluton, h.e. Natem, appellant alterum ex duobus processibus cervicis, osis femoris; qui major, & exterior, & gibbus est. lib. de osib. cap. 21. Vide Femur.

Glycea medicamenta sunt, quæ vel purgant, & vel acres humores indulcant quasi & alterant. lib. de Dynamid. in proem.

Gnaton. Vide Echmyodes platysma.

Gomphos, Latini Clavus, affectus oculi est, in quo pupilla egrediens, pelliculas. Uvea, superficie tenus operit; unde ejus forma sit quasi clavus. lib. de ocul. cap. 11. Vide Clavus.

Gomphosis, Synarthroseos species est, cum ad instar clavi, os, osi, infigitur: vel cum os unum, alteri penitus est infixum, ita ut ne tantillum quidem (veluti dentes suis alveolis) moveatur. lib. de osib. in proem.

Gonorrhœa, est seminis invita & assidua excretio colore non extenso. Gonorrhœæ autem nomen planè compositum est, ἀπό τῆς πέρας, καὶ γόνιμα, quasi seminis genitalis fluor, ob imbecillitatem retentricem continentium ipsum corpus. 6. de loc. aff. 6.

Gracilis sive tenuis pulsus est, in quo longitudinis dimensio,

dimensio, quodammodo duabus reliquis dimensionibus præstat; in quo autem duæ reliquæ superant longitudinem, pulsus hujusmodi turgidus, sive crassus appellatur. 1. de differ. puls. cap. 5.

Grando, est tumor crassus, in partibus interioribus palpebrarum coagulatus, grandinæ haud ab similis. 1. de ocul. c. 9.

Graphioides, aut Belenoides processus, graphio, seu stylo, & acui similes, eamque ob rem styloides dicuntur, a columna specie, quæ partibus hujusmodi sese offert, tenues ossium capitū processus appellant. 10. de usu part. cap. 4. Præterea, Graphioides & styloides processus, est cubiti processus, quem à directo parvi digiti porrectum, à graphii seu styli modo, Græci dilactores sic vocant. 1. de anat. adm. cap. 10.

Gravativus dolor. Vide Dolor tristis.

Gravedo, sive Coryza, est tenuis & incoctus humor, qui per nares secernitur. 2. progn. 49. Hunc Gal. docet non esse pituita speciem, ut quidam falsò asserunt, sed excrementum, à Cerebro destillans, tenue, aut crassum, quod tum in senibus, tum in iis, qui ratione quavis sunt perfrigerati, plurimum acervatur. 2. de natural. fac. c. 9. Vide Coryza.

Graveolentia. Vide Beneolentia.

Gravis, seu gravativus dolor. Vide Dolor tristis.

Gressuram, γρηξάρα, vocat Hippocr. eorum id, quod inter inguina utriusque cruris est, cujus mediam partem τὸ ἐν τῷ αὐτῷ nuncupat, Latini interfemineum, eò quod duobus feminibus interjacet. Est intestinum, seu intercapedo, quæ ab exortu pudendi, usque ad anum pertingit, ubi etiam vesica collum collocata est. 4. de artic. 45.

Grumus, Græcè θρόμβος, est concretus sanguis. lib. de atra bil. cap. 2. & lib. de tumor. cap. 2.

Gui-

Guidez venæ. Vide Apoplecticæ.

Gula. Vide Oesophagus.

Gurgulion. Vide Staphyle, & Gargareon.

Guttur. Vide Larynx.

Gutturulos, i.e. *ἑρπετόχους*, quasi gutture milos, vocat Hippocr. eos, qui prominentia in anteriorem partem guttura habent: guttur enim (*Γράσις ἑρπετόχου*) vel totam asperam arteriā nominat, vel fauces tantum 3. de artic. 8.

Gynæciæ, *Γυναικείας*, i.e. mulierum passionēs. lib. de Gynæciis.

Gynæcomaston, i.e. muliebriū mamma, & subjecta additaq; mamma pinguedinis, auctio est, præter naturam. lib. finit. med. *Γυναικοναστόν*, muliebrium mammarum summum incrementum; τὰ δὲ γυναικεία, muliebria sunt & menstrua mulierum purgationes.

H

HABITUS, est partium nostri corporis structura, constitutio, & compositio: quā ratione dicimus, Huius corpus esse habitus solidi, compacti, rari, cuius ratione etiā corpus rarum facile evaporatur. & syncopen incurrit, habitus verò densiores in morbis cunctatè diutiusq; laborant. 2. de rat. vict. 47. Præterea, Habitus nomen usurpamus, de omni re, quā cōstans est, & agrè amovetur: undè & sanitatem bonam habitudinem dicimus. lib. de bona habitudine. & 4. de rat. vict. 35.

Hæderarius flexus. Vide Glandulosi assistentes.

Hæmalopa, est cruenta suffusio, ad plagas oculi illata oboriri solita, 4. de compos. med. loc. cap. 8. & pro insugillatio in oculis, ex plaga aut ictu, aut effusio, sub contusum locum, sanguine. Undè Archigenes dicebat, Hæmalopa idem malum esse cum Hyposphagmate, nec in oculis

oculis duntaxat, sed etiam in omni alia corporis parte, posse contingere.

Hæmatosis, i.e. sanguificatio. Vide Hepar, & Sanguificatio.

Hæmodia, est affectus, dentes, gingivasq; infestans, cum quāpiam & austeros, & acidos cibos ingesserit, adeoq; dentium quidam quasi stupor, cui porculacam manducatam mederi, experientia probat. 2. de loc. aff. 6.

Hæmophobus, i.e. sanguinis mittendi timidus. 9. meth. 5.

Hæmoptoicus is est, qui sanguinem spuro ejicit. lib. 7. de compos. med. loc. cap. 4. sive vomendo, sive rufiando, sive siccando, sive simpliciter expuendo, rejiciatur. 4. de loc. aff. 5.

Hæmorrhagia, i.e. sanguinis eruptio, & abundans effusio, quā si per magnum vulnus fiat, per largum obitur fluxum; sin angustum, manat per foramen, ut in venis secandis rivulose exire solet. Differt autem Hæmorrhagia a Hæmorrhoides, quod illa sit abundans effusio sanguinis ex venis indifferenter qualibuscunq; hac verò effusio sanguinis, ex aut, sedisve venis per dissultationem ac paulatim facta, ut quā ut plurimum memoratorum vasorum ob erosionem oriatur. lib. finit. med. Undè Hæmorrhoidas, sanguisualas venas, in ano existentes, appellant. 4. de art. 40.

Hæmorrhoides. Vide Hæmorrhagia.

Halituoſa, seu Vaporosa sunt, quacunq; per cutem foras exhalare apta sunt. Humidi, quā per vesicam; Sicca, quā per alvum. quippè a vincenſi in singulis eorum substantiā, nomina ipsis imponuntur. Contraria halituoſis & diureticis, dicuntur Emplattomena, quā exiguis meatibus cutis, & vesica inſtrentia obſtrunt, & ea, quæ per

per cutim, & urinas expurgantur, p.n. in corpore decimēt; quæ verò opponuntur solutivis, dicuntur stryphna, quod valenter adstringant. 8. meth. 2.

Halituosus vapor & spiritus, ex partium humiditatibus, ad summum concoctus, in tenuem halitum, virtute insiti & validi caloris lentè solutis factus, insensibili transpiratione in ambientem effluit; ubi verò calor imbecillior est, vel naturalis humor, cum semicoctus, cum crassus, cum glutinosus, atq; particula densior, ibi crassior excitatur halitus, quam ut transpirare possit. 14. meth. 7.

Harmonia in ossibus, species Synarthroseos est, in qua ossium structura, per simplicem lineam fit. E. G. Maxilla superioris, ad-hac narium & quædam etiam Capitis ossa, ad hunc modum inter se juncta. lib. de ossib. in præm.

Hebetudo, & offuscatio visus, est summa offusio visionis sine causa manifesta. lib. Introd. cap. 15. Græci vocant ἀσθησις, Arabes guttam serenam: differtq; ab Amblyopia (ἀμβλυωπία) in eo, quod magis in illa, quam in hac læditur visio.

Hæctica febris, duplicem habet significationem; sic enim dicitur omnis febris, quæ soluta difficilis est, (sive sit pituitosa, sive melancholica, opposita τὴν εὐσμίαν, h. e. febrī solutū facili.) Alterā verò significatione, speciatim magis dicitur Hæctica febris; quæ & putrida, & diariæ opposita, dicitur Hæctica, quod in habitu corporis ἐξω ἀπέλλαντ, tanquam in subiecto consistat: est enim hæctica febris, calor præter naturam in solidis partibus ipsius Cordis accensus. Vide Febris hæctica.

Hæcticus pulsus, perinde ut Febris hæctica vocatur, qui nō magnopere ullō modo varians, manet sibi in perpetuum

tuum similis, coheretq; nec solvitur unquam, quod torus corporis habitus, in ejusmodi febribus, & pulsibus, morbum induit. lib. de pulsib. ad Tyrones, cap. 8.

Hæcticus spiritus, seu inficus, & naturā partium substantia complentur, spiritui influenti opponitur naturali, & animali, in universo corpore, cum primis solidis corporis in partibus continetur, ex quo quippe composita sunt, iudemq; nec divisus, nec condensatus, nec è loco suo motus conservatur, resolvitur autem spiritibus influentibus intensus, ac in phreniticis, vel dissolutis, ut in lethargicis, vel iis, qui cardiaco affectu laborant. lib. Introd. cap. 18.

Hedra, sedes, anus, podex, dicitur & Græcis alio nomine ἀντρίαις, & ἡναιώσος: est autem meatus ventris inferior, continendus, & è corpore egerendus excrementis destinatus. Adhuc Hedra apud Hipp. lib. de vulnerib. Capitis, est ossis fractura species talis, ut in eo teli vestigium remaneat, atque appareat, quā telum infederit. Hippoc. lib. de vulnerib. Capitis.

Hedysma, i. e. unguentum odoratum, i. de compos. med. loc. cap. 2.

Hegemonica, ἡγεμονικά, i. e. principes animæ virtutes, sunt rectrices, & animales, quæ in capite collocantur, videlicet facultas imaginatrix, ratiocinatrix, & recordatrix. lib. de sympt. diff. cap. 3.

Helcydria, i. e. pustula ulcerosa, in capite genita. i. de compos. med. loc. cap. 9.

Heliolis, ἡλιόλις, insolatio, est corporis in Sole apricatio. Remedii genus est, veteribus Medicis usurpatum variis modis: alii enim ad Solem ejusq; radios exponebantur, sive stantes, sive ambulantes, sive jacentes, quo remedio, præmissa per alvū evacuatione, juvabatur Hydrotici, Ischiadici, Nephri-

Nephritici, Paralytici, Elephantici, Celiacici, Hysterica mulieres & albâ uteri fluxione laborantes, & Cephalalgici, ubi ex eo auxilio, corporis perspirationem uberiores, sudores, alvi adstrictionem, adipis consumptionem, tumorum laxorum, tum maxime hydropicorum detumescientiam, facilem respirationem, omniq; superflui humoris absorptionem fuissent consequuti.

Helos, sive Clavus, est callosum tuberculum, album, rotundum, capiti clavorum simile, toto in corpore proveniens, quod pedum cumprimis in plantis, digitisq; & calcaneis, accidit, & oculis. Vide Clavus.

Helodes febris. Vide Febris Helodes.

Helosis, est curva, ac reflexa palpebrae verso, utroq; oculi musculo convulso, partem Tarsi sibi continuam ad sese trahente; id quod in magnis morbis magnum malum significat. Ipsam hanc palpebrarum contorsionem Hipp. vocat Campylon. 10. de usu part. cap. 9.

Helminthes. Vide Elminthes.

Hemitritæos febris, ἡμιτρίτης & πυρετός, Semitertiana febris. Vide Febris semitertiana.

Hemicrania, aliâs Heterocrania, Græcis ἡμιγὰναι τὴν ἑτερογὰναι, affectio est dolorosa, circa dimidiam capitis partem, modò dexterâ, modò sinistram, (juxta suturam sagittalem qua terminatur) ut plurimum per circuitum exacerbatur, pleriq; circa temporum musculos dolentibus, quibusdam in vertice capitis, quidam verò aded vehementer dolent, ut ne manuum contractum faciliè ferant, in quibus pellicula Calvæ ambiens, læsa est. 2. de compos. med. loc. cap. 3. Estq; & aliud Hemicraniæ genus, quod Sphacelodes nominant, videlicet convulsorius, dimidia partis capitis dolor. 2. de loc. aff. 7.

Hemi-

Hemiplexia, ἡμιπλῆξια, i.e. Paraplegia. Vide Paraplegia.

Hepar, Latinis Jecur, est membrum princeps, quod in dextro hypochondrio collocatum, venarum omnium principium, & primum sanguificationis, sive hamatoseos officina, & instrumentum est, & nutrientis virtutis fons. 4. de usu part. cap. 12.

Hepatica vena. Vide Axillaris.

Hepaticus affectus, est jecoris imbecillitas citra phlegmonem, cum nutrimentum per vasa, qua in mesenterio sunt, veluti per ora quadam semicoctum attraxit, & per eadem, id ipsum semicoctum ablegat in intestina, unde oritur excretionis species, maxime similis lotura carniū cruentarum, ac recenter enectarum, seu, quod idem est, aquosi sanguinis: atq; hoc quidē symptoma semicoctorum ciborum vomitioni, ob p.n. affectum ventriculi que excitatur, proportionatum est. 3. de sympt. caus. c. 2. Eos igitur, qui sic affecti sunt, & quibus visceris hujus vires fuerint imbecillæ, Hepaticos vocat, affectumq; hunc, hepaticum fluxum, alium à Dysenteria facit. 5. de loc. aff. 7. Affectio hæc, hepatica appellata, veluti etiam & Cœliaca, & Stomachica, circa tumores præter naturam, circa ipsas partes contingit, ut docet Gal. 8. de compos. med. loc. cap. 6.

Hepiala febris, ἡπιᾶλα & πυρετός. Vide Febris Hepiala.

Hepsema, i.e. Sapa. Vide Aporhermon.

Herculeus morbus. Vide Cornitialis.

Hermaphroditus, complexus est masculini sexus & feminini, utroq; etiam simul genitale proprium obrinente. lib. finit. med.

M

Hernias. Vide Ramex, & Celas.

Herpes, aliàs Serpigo, est repens inflammatio, ex sincera flava bile, suam servante naturam. Quae ipsa bilis flava si cum sanguine per totum corpus deferatur, morbum facit, qui lèteros, i.e. Regius appellatur; sola verò quando ab aliis succis secreta est, & in aliquo externo membro consistit, Herpes vocatur: quae si crassa sit, totam exulcerans cutem, usque ad subjectam carnem, Herpes exedens, sive ἰδιόουδρον, sive Phagedaena; si verò tenuior fuerit, id, quod in superficie est tantum veluti deurens, generis sortitur appellationē, ac simpliciter & sine adiectione Herpes vocatur. Herpetis species altera miliaris, Gracis Cenchria vocatur, quoniam parva pustulae ac multa per summam cutem, similes milii, in ea excitantur, quae non protinus ulcus faciunt, quemadmodum alter, sed interposito tempore in ulcus abeunt. 2. ad Glau. 1. & 6. aph. 45. Est autem omnis Herpes ejusdem generis cum Erysipelate, atque huius quoque, magis cum eo, quod exulceratum est: differunt autem humoris tenuitate; est enim admodum tenuis, qui Herpetem excitat, aded ut non solum interiores partes, substantiā suā carnosas, transeat, sed etiam cutem ipsam, ad summam usque, cuticulam rûm erodat, rûm exedat, per quam si sudoris vice transiret, haudquaquam ulcus excitaret. 14. meth. 17. & 2. meth. 2.

Heterocrania. Vide Hemicrania.

Heterogeneum. Vide Dissimilare.

Heterorhythmum pulsus vocamus, qui alterius aetatis habet rhythmum. lib. finit. medic. Vide Pararhythmus.

Hexis. Vide Affectus, qui & Schesis dicitur.

Hiatuli, οὐδὲσσητες Gracis, ii sunt, quorum venter, inter-

inter comedendum in ore invenitur: quod accidit in vehementiore appetentiā, & fame nimia, in qua, venter nonnullis animalibus sursum procurrat; aded ut nonnulli foras repere sibi ventrem dicant, aliis verò cibos, quod adhuc mandunt, necdum satis eos ore confecerunt, famelicus ventriculus eripit planè invitis. 3. de natur. fac. cap. 8.

Hydroa, pustula quadam sunt genitalium partium, summam cutem occupantes, & exulcerantes. 3. aph. 21. Oriuntur, ut ipsum nomen ostendit, ab earum partium sudore acri, bilioso & mordaci, qui per facile iis in partibus putrescens pruriginem movet, cutemque velut ulceribus exasperat. Dicuntur & Intertrigines. 6. de simplic. cap. de Balauftio. Graci vocant ἰδρῶνα, & παρὰ τὴν ὕμηναν. Plinius vocat Attrita. Vide Sudamina.

Hidròs, sudor, ἰδρῶς, est humidum terria concoctionis excrementum, per cutem in aquae speciem erumpens. Vide Sudor.

Himàs, Gracis ἰμᾶς, affectus est Gurgulionis, à corrigiarum similitudine sic dictus, cum longior, gracilior, sicciorque evaserit; (talis enim Loro, quod Graci ἰμᾶς nuncupant, non ineptè comparari potest.) Differt à Cionide, quod in hac Gurgulio non extenuatus est, sed crassitiei, ex fluxione solito majorem, ut plurimum adeptus esse videtur.

Hippocratica facies. Vide Facies Hippocratica.

Hippocraticum scamnum, est machina quadam, quam Hippocr. consulit preparandam iis, qui in aliquā magnā urbe curaturi sunt. 1. de artic. 4.

Hippos. Vide Equus.

Hirquæ. Vide Anguli.

Homiomeres & Homæomeres, ὁμομερές, homogeneæ, i.e. similes, elementares, & primæ corporis nostri

particula, 6. de sanit. tuend. cap. 2. quas etiam prima corpora vocat, 8. de placit. 8. quæ in ejusdem nominis & essentia portiones omnes dividuntur. l. de morb. differ. c. 3.

Homonyma duplicia sunt, aliqua quidem nullo pacto inter se communicantia, & convenientia: ut, cum Canem dicimus terrestrem & marinum, atq; hæc æquivoca dicimus, alia verò, quæ cum synonymis, i. e. univocis aliquatenus conveniunt, quatenus ab uno factam appellationem habuerint. lib. 4. de vict. rat. 13.

Homoplata, aut Omoplata, aliàs opertas scopulas vocant, partes sunt, quas ii, qui toto thorace respirant, attollunt sensibilibus & notabiliter, ex difficultate respirationis, præcordia sursum variè & inæqualiter trahentes. 10. meth. 8. Vide Omoplata.

Homotona. Vide Continua, & Epacmafrica.

Horam, vocat Galenus id tempus anni, in cuius medio Caniculam exoriri contingit. 2. de aliment. facult. cap. 2. Vide Fugaces.

Horarii fructus. Vide Fugaces.

Horæctica medicamenta, quæ cibi fastidium auferrunt, & appetentiam ejusdem cient & intendunt. de Dynamid. in proem.

Hordeolus, est apostema, nascens in extremitate palpebrarum. lib. de ocul. cap. 9. Appellaturq; tubercula hæc, Crithæ, Hordeum, sive oculorum tuberculum. lib. de remed. par. fac. cap. 10. Vide Criche.

Horrida febris, periculosior, dicitur (apud Hippocratem lib. 1. de morb. vulg.) non simpliciter ea febris, quæ cum horrore invadit, (id enim innumerabilibus accidit febribus,) sed exquisitus hemitritæus, in quo videlicet magnam accessionis partem, horrores capiunt, eo maxime die,

die, in quo tertiana & quotidiana continua simul concurrunt. 2. de differ. febr. Vide Febris horrida.

Horror, est inæqualis concussio totius corporis, & punctio quadam quasi, seu ulceratio summa cutis, ipsiusq; carnis sensibilis, ab humore tenui & acri per illam transeunte. 3. de sanit. tuend. cap. 5. & 10. meth. 4. Vide Frigus.

Humeraria vena est, quæ in superficie brachii exteriori collocata juxta interiorem superficiem musculi Deltoïdis ad extremum ipsius protenditur. 3. de anat. adm. cap. 5. Hanc Omiaeam Græci vocant. 1. de anat. adm. c. 11. Dicitur autem humeraria, vel humeralis, quodd obliquior, à clavi: nla sensim recedens, abeat ad humerum. lib. de venar. & arter. dissect. cap. 6. Eadem Vena capitis, Cephalica, & Vena cubiti externa nominatur. Vide Cephalica.

Humerus, totum illud est, quod in eâ de articulatione continetur, quâ superior humeri pars, Epomis, & superhumeralis dicta, ad Collum vergit, & à posteriori parte, ossi scapulæ: ab inferiori autem, ei ossi, quod, dum totum Brachium attollitur, manifestum fit, & Ala nuncupatur, articulatur. 1. de artic. 4. & 62.

Humilis pulsus. Vide Latus.

Humor, & Succus, non idem est. Humor enim idem quod humiditas in corpore animantis est; Succus humiditas est, quæ in fructibus, quibus vescimur, continetur, & ex medicamentis vegetabilibus exprimitur. lib. de humor. com. 1.

Humor urinæ, idem quod ipsa urina est, sub quo nomine & substantia, & color urinæ continetur: præter hæc, quod in urina reliquum est, inhærens dicitur, & ejusdem contentum. lib. de urina, cap. 1.

Humorem mucosum, eum appellare consuevit Hippocrates, qui lentore quodam & albedine preditus, ad exangues partes, (ossa, & cartilagines) pro nutrimento mittitur, cum aded imbecilla illorum natura est, ut bene conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum relinquat. 3. de artic. 65.

Hyaloides humor, ὑαλοειδὲς ὕγρον, est humor oculi tertius, in posteriori illius sede collocatus, qui & Vitreus dicitur, & Hyelinus. Hic quantò crassior & albior est sanguine, tantò à crystallino humore, humiditate atq; albedine secedit. 10. de usu part. cap. 1. Vide Crystallinus.

Hyaruli. Vide Hiatuli.

Hyboma, curvamen, gibbositas, ὑβώμα, idem est ac νόστος: vox generalis est apud Hipp. significans omnem vertebrarum præter naturam factam distortionem & luxationem. 3. de artic.

Hydatis, Aquula, substrata superiori genere pinguedinis augmentum est, quâ fluunt præter naturam oculi. lib. finit. med. Sunt autem Hydatidæ, humiditates illæ, quæ circa unctuosæ & pinguis corpora per medium spatium, inter duas portiones tunica Perioestii, nascuntur, quæ corpora molliendarum suâ pinguedine palpebrarum gratiâ, à natura fuerunt creata. 10. de usu part. cap. 7.

Hydatodes vinum, ὑδατοειδὲς οἶνον, est, quod multâ aquâ dilutum jam, aut dilui potest. 5. de sanis. tuend. 6. 12. Vinum autem Oenodes vocant, quod multam sustineat aquæ mitionem, & imbecilles vires seriat. Cui opponitur ὀλιγόπορον, i. e. aquosum vinum, quod paucam sustineat aquæ mitionem. 7. meth. 6.

Hydatoides. Vide Crystallinus.

Hyderici, qui & Hydropici, & Utricularii dicuntur.

tur, lib. de atra bile, cap. 9. est ὅς, aqua inter cutem. 5. de loc. affect. 7.

Hyderos Phlegmatia. Vide Leucophlegmatia.

Hyderos, est species Hydropis, quæ Anasarca dicitur. 3. de sympt. caus. cap. 2.

Hydragoga medicamenta sunt, quæ aquam utriculariis, & hydropicis, educunt. lib. de atra bil. c. 6. Inde Hydragogia, Latinis Aquæ ductus, sanguinis lationem per venas (nomine à similitudine fluminis, ad rivos translato) significat, quæ sit spiritu, unâ cum caliditate per ventrem exeunte, ac deinde secum contractas nutrimenti particulas deferente. Gal. in Timæum Platonis, fol. 578.

Hydrelæum, est compositio ex aqua & oleo, ὑδρέλαιον, incerta autem & multiplex misturæ ratio, ad dolores capitis ex febre, & vomitionibus cõueniens. 2. simpl. 25.

Hydrenterocele, Hernia species est composita, quando videlicet, unâ cum intestino, aquosus humor in scrotum descenderit. lib. finit. med.

Hydrocele. Vide Enterocèle, Celas, & Sarcocèle.

Hydrocephalon, est tumor p. n. ab humore aquoso, collecto in parte aliquâ corporum eorum, quæ capus continent. lib. finit. med. Is humor porro tribus in locis colligitur, aut inter Cutem & Pericranium, aut inter Cranium & Pericranium, aut inter Cranium & Cerebri membranas; aliqui addunt, ex Aërio, quartum locum, inter Cerebrum & ejus Membranas, sed tunc nullam recipit curationem, puerulis maximè familiaris morbus est.

Hydromphalon, Græcis ὑδρομφάλων, coitio & concretio est lenti humoris, in umbilico, qui sub tunica ibidem congeritur, & continetur. lib. finit. med.

Hydrophobus, i. e. aqua timidus: ὑδροφόβος dicitur

proprie is, qui ex morfu canis rabidi, aquam reformidat. 9. meth. 5. Inde Hydrophobia, i.e. aqua timor, ex rabidi animatus mordicatione prognatus. Vide Pſychrophobus.

Hydropici. Vide Hyderici.

Hydrops, ὕδρωψ. Aqua inter cutem, in quo per cutem extentam, sive aer & flatuſ, sive humor aliquis in profundo conclusus continetur: si igitur in membrana abdominis interiore, Peritonæo Græcè dictâ, aer recludatur, fit Hydrops species, quæ sicca ab Hippocr. vocatur; si verò humor, fit Ascites, qui & Hydrops aquosus ab eodem dicitur. 4. aph. 11. Hydrops tres sunt species: prima, Ascites, acutius, quæ fit, cum inter membranam Peritonæum, & intestina, plurimus aquosus humor coacervatur, qui locus, aquoso humore, uris ad modum impletus facit, ut hanc speciem Asciten, i.e. utricularè appellant; Barbari corruptè à voce, Asciticum. Altera, Tympania, τυμπανία, & τυμπανίτις dicitur, qui fit, ubi flatuſ ac spiritus copiosus, in iisdem ventris locis congregatur: hoc nomine à tympano, omnibus notissimo instrumento, appellata est, si enim pulsatur venter inferior, instar tympani sonum edit. Tertia, Anasarca, ἀνασάρκωσις, & ἀνασαρκώδης dicta, fit, quoties per totum corpus humor pituitosus diffunditur, adeo ut instar spongiarum, aut papyri, universa caro permadida appareat, ideoq; in Anasarcâ, totum corpus intumescit, ex albedo pallet, &c.

Hydrops aquosus & siccus. Vide Hydrops.

Hydrops matellæ. Vide Diabete.

Hydrops in vas urinale. Vide Diabete.

Hyelinos. Vide Cryſtallinus.

Hygia, ὑγίεια, i.e. sanitas, est affectio, constitutioq; partium, cujus ope functiones secundum naturam edimus. 1. meth.

1. meth. 9. Inde Hygiene, ὑγιεινὴ, salubris Medicina pars est, quæ sanitatem tuetur, & imminentes morbos præcaveat. lib. Interod. cap. 7.

Hygrocyſtocele, i.e. aquosus simul, & varicosus ramex, est dilatatio vasorum, restem nutrientium, & lenti humoris copiosissimi, in Scroci aliquâ parte, collectio. lib. finis. med.

Hymen, Hymenæon. Vide Colliculum.

Hyoides, sive Hypsiloides, sive Lambdoides, à similitudine, quam cum Υ & Λ, Græcis literis obtrinet, dictum, est os gurguris capiti incumbens, rectum & leniter cavum, lingua basis, & fulcrum velut firmissimum. lib. de muscul. dis. cap. 13. Id ipsum & Pharyngætron vocant. lib. de vocal. instrum. dis. cap. 6.

Hypelata, Catotherica, sive dejectoria medicamenta sunt, quæ renes, vesicam & gibbam jecinoris partem, cum multo vitioso succo refertam, expurgant. 7. meth. 13.

Hyperbolica figura corporis est, quoties quatuor membra, Græcis νόδα dicta, nempe crura ac manus aut summè extenduntur, aut immodicè inflectuntur, ipsa item spina, cujus partes vertebra quoque in cervice existunt, cum plus nimium incurvatur aut extenditur. 1. progn. 13.

Hypercatharsis, ὑπερκαθάρσις, superpurgatio, immodica est, violentiori epoto ex medicamento facta purgatio: in causa ergo est vis nimia medicamenti, quod vasa ad ventrem attrinentia mordens, aperiens, & continenter irritans atq; cōvellens, corpora tota, eorundemq; vires omnes, naturales cumprimis, enervat & dissolvit. In ὑπερκαθάρσει porro primum flava bilis, deinde pituita, demum atra

bilis, postremò sanguis (quippè quem sanguinem naturæ habet familiarissimum) excernitur, initio tenuissimus, demùm crassissimus. Vide Superpurgatio. Si verò humoris vel sanguinis evacuatio spontè fiat, à naturâ, vel sanguinis, vel humorum multitudine aggravatâ, & ad eorum, quæ onerosa sunt, evacuationem excitatâ, & modum obtinere nequeunte, Hypercrisis dicitur, seu Supervacuatio. 3. prorrh. 53.

Hypercrisis. Vide Hypercatharsis.

Hyperoa, ὑπεροία, est pars oris superior, modicè concava, foraminulis percussa, per quæ, à Cerebro pituita ad os descendit. Latine Palatum, & basis Cerebri, osse sphænoide firmata.

Hyperfarcion ulcerus est, cui caro supercrevit; veluti Hyperfarcosis, ὑπερφάρσις, carnis excrecentiâ. 2. meth. 2. & 3. meth. 6.

Hypezochotes membranæ, sive subcingentes, sunt, quæ tela araneorum similes, naturâ simplices, internam utramq; thoracis regionem subcingunt; quæ verò recto ad jugulum usq; perferuntur, Diaphragmantes, i.e. intercipientes, sive intersepientes; ubi autem pulmonibus cohaerescunt, hujus operimentum dicuntur. 5. de anat. adm. cap. 8. Has ipsas pleurae tunicas, omnium spirationis instrumentorum communes esse, communemq; iis largiri tunicam, scribit Gal. 7. de anat. adm. c. 2. Vide Cingentes.

Hypnoticum medicamentum, ὑπνῶτικόν, est, quod somnum conciliat, soporemq; & Cataphoram eorum, molitur; refrigerat enim corpus, & sensum ed usq; stupefacit, ut si paulò liberalius ebitur, mortem etiam inducat. 5. simpl. cap. 19. Vide Narcoticum.

Hypocaumata, caloris nostri fomites, alimenta

nomi-

nominant, juxta dogma eorum, qui animalium vitæ, causam, censent ignem esse, qui rursus suis pabulis, tanquam alimentis, alatur, ut lucerna flammâ, oleo. 1. aph. 14.

Hypocheomenes, i.e. suffusi. 6. de sanit. tuend. cap. 9.

Hypochondria, i.e. subcartilaginea, aut quasi dicas, sub cartilaginibus polita, sunt partes illæ, quæ sub ventriculi ore, ad partem exteriorem apparent: cujusmodi sunt muscoli, qui expansi, membrana prætenui, veluti aranea, quam Peritonæon vocant, incumbunt, extrinsecus verò cute cõteguntur. Aequivoco autem cum his vocabulo, etiam interiora viscera vocamus hypochondria, quoniam & ipsa sub cartilaginibus notharum costarum ab interiori parte existunt. lib. Introd. cap. 10. In priori significato, dictum, Febres ab Hypochondriis moderatæ, i.e. omnium febrium acutarum, quæ ab Hypochondriis proficiuntur, sunt minutissima: in posteriori significato, quando nomine Hypochondriorum complectimur ventrem, jecur, lienem, & septum transversum, quædam malignæ, quædam mites sunt. comm. 2. in 3. de morb. vulg.

Hypochondriacus, sive flatuosus affectus, qui & simpliciter Melancholia dicitur hypochondriaca, morbus est ex tertio Melancholia genere, à ventriculo & finitimarum partium ex affectu p.n. ortum duens, prævis symptomatibus stipatus, inprimis metu & morosità. Eundem alvi dejectiones, vomitiones, proba concolitio, & rudius levant. 3. de loc. aff. cap. 7. Græcis ὑποχονδριακὴ κατὰ χολίαν.

Hypochyma, (alias Hypochylis,) est crassi humoris coactio, in cornea membrana, vel inter cornicis tunicam, & crystallinum humorem, juxta pupillam concretionem. Quæ in re Hypochyma à Glaucomate differt, quod

τὸ

τὸ πῶχυμα sit humor illic concretus; γλαυκωμαῖς autem alteratio humoris crystallini, in glaucum colorem ab humiditate quadam intra ipsum congesta: Veteribus Medicis item sunt uterq; ille affectus: differunt interim tūm eo, quo dictum, modo; tūm quod suffusione laborantes, lucem videant multam, aut paucam: qui verò γλαυκωμαῖς & ἀπὸ γλαυκωμάτων patiuntur, lucem omnino nullam cernant. Est autem suffusio duplex, una propriè dicta, quæ est oculorum per se suffusorum morbus, ab humore crasso pupillam obscurante; altera verò per sympathiam in ventriculo, in quâ oculi non primò, & per se patiuntur, sed visa quadam, visis propriè suffusorum similia, iis obversantur, quæ, ut dictum, est per consensum suffusio, (ut illa per essentialiam,) sive à ventriculo sursum ad oculos ascendendo, sive à Cerebro deorsum, sive à toto corpore, ut in febris. Vide Glaucofis.

Hypogastrion. Vide Abdomen.

Hypoglossis, medicamentum est, leniens, levigans, & corrigens asperitatem asperæ arteriæ: quin & omne, quod in viis spiritalibus inflammationis reliquum est, concoquit & persanat: sic dictum, quia lingua subditur, eoq; paulatim liquecente, asperæ arteriæ summū madescit & irrigat: de quibus sublinguaribus præsidii Gal. fusè 7. de compos. med. loc. Vide Arteriæ. Hypoglossis etiam dicitur inferior linguae pars, quæ subjectam attingit maxillam.

Hypophoræ, sunt fistulae & vitia profunda, quæ dehiscunt, ut sinus, ulcera, aliq; huiusmodi omnia, quæ ex defectu, repletionem desiderant. lib. Introd. cap. 3.

Hypophysis, seu Hypochysis, i. e. suffusio. 3. meth. 2.

Hypopyos, Græci ὑπόπυος, ὑπόπυος vocant, quibus pus in oculis congregatum est, quod vacuari solet, divi-

sā tū

in tunicâ corneâ paulò supra locum, quo committuntur inter se tunica oculi universa, quem alii Irim, alii Stephanon, alii Coronam vocant; differtq; ab Hypochymate, quippè in quo non pus, sed levis quadam nebula, tunicæ oculi interponitur. 14. meth. 19. Quod autem Hypopyon sub oculis fiat, nomen ipsum indicat, idem enim est, veluti si quis Hypophthalmiam dicat, quod ipsum sub oculis sonat. Est autè ex genere effusionum, & Ecchymomatium appellatarum; quales appellat Hipp. & alii, affectionem circa utem, cum tenuibus ipsius venis contusis, sanguis per fissuras effunditur, non uno loco acervatim, nec statim ita excretus, in grumos coit, sed postquam per Diapedesin effusio ista est facta: tunc enim, temporis progressu, cōtingit livescere & denigrari oculum, parvis nimirū grumulis, ex disperso in multas cutis partes sanguine, coactis. s. de comp. med. loc. cap. 1. & lib. de virtute Centauræ, c. 4.

Hypophthalmia, & Hypophthalmium. Vide Hypopyos.

Hyposarca, aliàs Hyposarcidium, & Episarcidium, species Hydropis est, in qua habitus totius corporis, pituita plenus redditur. 4. de rat. vict. iii. Vide Anasarca.

Hypophthalmata, plagas oculi illatas, & obortas ex eis cruentas suffusiones, appellant, tū in ὑπόπυος species. 4. de compos. med. loc. cap. 8.

Hypospadiæ, ὑποσπιδίαι, ii sunt, quibus ob vinculum, quod ad finem virgæ habent, meatus seminalis est comortus, & ob læsa genitalia steriles sunt, non quòd semen fecundum non habeant, sed quòd in virgæ flexibus, semen hærens, ejaculari prorsus nequeat: quam rem curatio ipsa comprobat, vinculo enim abscisso generant. 15. de usu part. cap. 3.

Hypo-

Hypostasis, sive sedimentum, est id, quod in urina residet, tanquam crassior urina portio, & in sano quidem tertio concoctionis excrementorum, in agris vero morbidi succi pars, ab urina liquore secreta & in fundo subsidet, lib. de urinis, cap. 16. Licet generaliter, quicquid subsidet, atque in imo cuiusque liquidioris excrementi subsistit, hypostasis dici queat. Ipsa hac crassior urina pars, si ad supremam superficiem terminatur, dicitur Nubecula; si ad mediam regionem, Suspendium; si profundiore parte inferiorem locum occupet, dicitur Hypostasis. Ibid. cap. 21. Quae si divulsa non sit, sed continua, apud Hippocratem dicitur plana; quod si per omne tempus sui similis est, ita ut, quemadmodum primo die, ita & insequentibus in diebus sit cocta, insuper quae sedimentum & humorem urinarium habet non distantem a se, sed totum sibi aequalem, & quae continuè sibi similis perseverat, æqualis apud Hippocratem dicitur. Ibid. cap. 38.

Hypsiloides. Vide Hyoides os.

Hypothenar, i.e. subvola, pars ea manus est, quae opponitur volæ manus, quæ Thenar dicitur. lib. Introd. cap. 10.

Hysteria, i.e. Uterus, Vulva, Matrix, serius gestandi sive generationis organum, foris nervosum, intus carnosius, dicitur, & sicut quoddam postrema sit partium omnium. lib. finit. med. Unde Hysterica mulier, i.e. ab utero suffocata; & affectus, Uteri suffocatio, sive spirationis ob uterum ablatio vocatur, quo interdum mulieres, sine sensu immobiles jacent, cum nullo aut parvo, & quam obscurissimo pulsu; interdum mitiori existente malo, sentientes & moveri potentes, atque integrè ratione; tamen animi defecatione, & difficili spiratione laborantes, crura etiam &

brachia

brachia contracta habet. 5. de loc. aff. 5. Præfocatas etiam uterarias vocant, i.e. utero laborantes. com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. Hinc etiam Hystericalgia, uteri dolor: Hystericus Typus, & morbus, Accessionis est retardatio, cum posterior accessio serius invaserit, quam præcedens.

I

IANITRO R. Vide Pyloros.

Ianitrix vena, i.e. vena Porta. 6. de placit. cap. 5.

Ichor, est renue excrementum ulceris, ut sordes crassum. 3. meth. 3. Vocat etiam Ichores Hipp. tenues, acres, aquosas & mordaces sanguinis humiditates, sanguinis veluti vehicula. 4. de rat. vict. 2. Appellat insuper Ichores, superfluas sanies, quas corpus concervat, ex quarum evaporatione, non solum capitis dolores oboriuntur, sed etiam suffusorum symptomata, aliquibus vero & Comitialis convulsio concitatur. 6. de sanit. tuend. cap. 9. Dicuntur adhuc Ichores, aquose humiditates in Coryza & Catarrhis, quales defluunt a capite in nares. 2. de rat. vict. 4. 4. Græcum nomen ἰχώρ Latini quidam vertunt Ierosum humore, quidam aquosum, quidam tenuem, alii vero saniem interpretantur. Ichoroides autem sanguis non simpliciter tenuis & aquosus ab Hippoc. vocatur, sed qui venenosus aliquæ & malignæ facultate infectus sit. Galenus ex Platone: Ichor autem, sanguinis quidem, mitis; nigra vero bilis, acris & ferus. Ichoroides quoque sanguis vocatur, in se ipso pravam ac tenuem humiditatem continens, mordacem & erodentem, non aqueam & morfu carentem. comm. 2. in 6. de morb. vulg. 38. Vide Sordes.

Icteros, est discoloratio ex flava bile, sui servante naturam, unda cum sanguine per totum corpus delata. 2. ad Glauc. 1. Sic dictum hoc malum, vel ab ave, quæ Græcis Icteros,

Icteros, Latinis verò Galbula dicitur, hac enim si fessetur, sanari malum dicunt, & avem mori: vel ab ave, quæ **Ictinos**, ἰκτίνος & Græcis, Milvus Latinis appellatur, oculi siquidem, hoc vitio laborantium, milvinis oculis similes, aurei coloris videntur: vel à mustella sylvestri, quæ auricolores oculos habet, & Græcis ἰκτὶς, Latinis Viverra nominatur. Dicitur etiam Regius morbus, quoniam multis (quod genus portio in Regum deliciis erat) curabatur, rebusq; omnibus hominis mentem exhilarantibus. Aurigo quoq; nominatur a Celso, ab auri colore, quem bilis, per universum diffusa corpus, refert. Arquatus deniq; nuncupatur, quod ejusdem coloris respectu, cælestis arcus similitudinem habeat.

Ictus, est arteria motus, tactui occurrens. Intervallū autem, est tempus interpositum, inter duos ictus, quo distenditur, contrahiturq; arteria. de pulsib. ad Tyrones, 6. 4.

Idea morbi, i.e. morbi essentia. 3. de cris. 4.

Idiopathia, ἰδιοπάθεια, proprius affectus est, qui & πρωτοπάθεια, i.e. primarius affectus dicitur, ex adverso distinctus ab affectu per consensum, ἀπὸ συνεπάθειαν ἢ ἀντεπάθειαν factum, quem alias vocant secundarium, seu posteriorem. 1. de loc. affect. 3. Per consensum autem affici tribus modis membrum aliquod dicitur: vel propter viciniam; vel propter familiaritatem generis, vel operis. Propter generis societatem quidem, & affectarum partium substantia propter similitudinem, E.g. ubi nervosum nervoso, venosum venoso consenti operis, cum mamma & thorax, partibus genitalibus con- dolet. com. 3. in 3. de morb. vulg. 4. Vide Sympathia.

Idiosyncrasia, i.e. temperamenti corporum proprietate & convenientia. 3. meth. 2. & 7.

Jecur.

Jecur. Vide Hepar.

Jecoraria vena. Vide Cava vena.

Jecoris vena. Vide Choledocos.

Jejunum intestinum, secundum est intestinum in ordine, quod à Duodeno (quod vocat) intestino multifariam in orbes convolvitur, vasorum complurium serie cōtextos. Dicitur autem jejunum, ἵγις, vel ἵγις, quod semper inane maneat & cibo vacuum reperiatur. 6. de anat. adm. c. 9. & 5. de usu part. cap. 3.

Ignem, suo more Hippocr. febrem vehementissimam appellat. comm. 3. in 1. de morb. vulg. 19. Unde etiam Græcis ἰκτὶς τῷ πυρὶ ὁμοίος nominatur.

Ignis facer, i.e. Erysipelas. 8. de placit. 4. & lib. de purg. med. fac. cap. 5. Vide Sacer ignis.

Ile, alias νεφὸν, locus appellatur, qui est inter thoracem, & os coxæ, propterea quod νεφὸν, i.e. cavum, & vacuum, depressumq; est. 2. de his, quæ in medic. 16. Eundem locum etiam Græci λαπαφὼν appellant, qui inter thoracis, & iliorum ossa subsidet, propterea quod eo loco, cingulum circumdatur; unde & λαγὼνας ἱστὼν etiam nominant. 2. de fract. 70.

Ileon, εἰλεὼν, intestinum est, ordine à vetriculo tertium, quod incipit, ubi jejunum desinit: diciturq; εἰλεὼν, à multis anfractibus, & circumvolutionibus. Idem verò & λεπτὸν, h.e. tenue, simpliciter dicitur, nomine duobus etiā superioribus communi. A qua parte obstructa, & inflammata nomen desumpsit morbus peracutus, qui Ileos, Græcè εἰλεὼς appellatur; sed nihil vetat in crassiori intestino colo, eundem affectum progigni, mitiorē interim, minusq; mortiferum. com. 2. in 3. de morb. vulg. Licet aliqui eundem in pleniore intestino factum vocent εἰλεὼν, in tenuiori εἰλεὼς,

N

(cum prius $\chi\epsilon\gamma\delta\alpha\lambda\epsilon$ & diceretur) quod per eum intestina convolvi videantur: unde quidam Latine Ileosin, Volvulum dixere; Chordapsum autem, quod qui manum loco dolenti admovent, ex tensione, chordam attingere videatur. 3. aph. 22. & 6. aph. 44.

Ilingus, est tenebrosa vertigo, qua fit, cum humores crudi, cum flatuoso crasso spiritu, in capite moventur; multoties precedit Epilepsiam, & Apoplexiam. 3. aph. 17.

Illegitimæ costæ, aliàs Nôthæ, spuria, & mendosæ dicuntur, 5. de anat. adm. cap. 1. cartilaginea ad modum, sunt quatuor ultima costæ, qua ad pectoris os non pertingunt. 8. de anat. adm. cap. 1.

Illisio. Vide Collisio.

Illofus, & Strabifus, seu Strabilismus, sunt invicta, musculorum palpebras moventium, concussiones, 2. de sympt. caus. cap. 2.

Ilium, $\lambda\alpha\gamma\theta\alpha\gamma\alpha\upsilon\delta\omicron\gamma\omicron\upsilon$, est apophysis, osis sacri superna, & ampla, continens intus ventris imi partem plurimam, tangensq; ilia. Os enim sacrum, tres habet apophyses rectas, nec deorsum, nec sursum repentes, videlicet in specie sic dictum Ilium, coxæ & pubis os: tamen os totum, sæpe os Ilium vocamus, quod id magnitudine & crassitie præpolleat reliquis.

Imās. Vide Gargareon.

Imbecilla corporis pars est, vel que à primo ortu suo & naturā est intemperantior, vel que ex precedente aliquo morbo intemperiem contraxit, vel que ex presenti affectu intemperata reddita, promptius verò in iis partibus imbecillis supervacaneum, qualecunq; id sit, & morbidum congeritur & suscipitur, quàm in membris fortioribus. 11. meth. 20.

Immu-

Immutatus morbus est, cuius longior est accessio, & minor satis remissio; quo genere antiqui Typum quotidianarum, & semitertianarum reponbant. l. de Typis. c. 3.

Impetigo, $\lambda\epsilon\chi\lambda\upsilon$, est summa cutis asperitas, cum multa prurigine, squamis & furfuribus. lib. finit. med. Agrestes verò impetigines nominant, qua à medicamentis imbecilliter siccantibus nihil juvantur, à validis irritantur. 6. de compos. med. per gen. cap. 2. Ea autem impetigo, quæ cum pruritu fit, etsi non aspera, sed lenior, quàm vel Psora, vel Lepra est, aded ut, si solâ salivâ quotidie desinatur, sanescat; ubi increverit, extremam curem in furfures resolvens, in Psoram transit, atq; deinde in Lepram, ubi pro furfuribus, piscium quasi squamula concreverunt, & per frictionem decedunt. 5. de compos. med. loc. cap. 5. & cap. 7. Nec tamen est is morbus, quem Gallicum, seu Neapolitanum, seu Hispanam scabiē vocant, ut alibi mihi sortè ostendendum erit. Cæterum, $\lambda\epsilon\chi\lambda\upsilon$, Lichenis nomine etiam Impetiginosum affectum, Mentagram Romanis appellatam, multò magis serum & agrestem, Plinius comprehendit, non squamis, ut Lepra; sed sædo cutis furfure, totos præmum vultus, deinde verò & collum pectusq; & manus occupans, oculis tantum immunibus. Celsus Lichenem, non Impetiginem interpretatur, sed Papulam; cuius iidem du. s. sicut Lichen, differentias statuit, scilicet tam & mitiorem. Nam quæ ab eo describitur Impetigo, Lepra est.

Impetum facientia. Vide Continentia.

Implicatus affectus est, in quo multa sunt affecta partes: nam potest idem homo, non solum laborare ex thorace, sed etiam ex pulmone, capite, ventre, jecinore. com. 2. in 3. de morb. vulg.

Imum ventrem, vocat Hipp. regionem ventris imam, qua umbilicum ac pudenda interjacet; ita ut in hac tria fororum Abdomen dividatur, in Hypochondrium, & loca ad umbilicum attinentia, & imum ventrem: 2. aph. 35. aut, sicuti Anatomici faciunt, in Epigastrium, Regionem umbilicalem, & Hypogastrium.

Inæqualis, & inordinatus pulsus est, qui nec ordinem, nec periodum circuitusve rationem ullam servat. Est autem pulsus equalis & ordinatus, quando, pari numero, pulsum aequalium intercurrit pulsus unus impar, qui aequalitatem corrumpit, proportionem circuituum observat. lib. de puls. ad Tyron. cap. 6. Inæqualis autem deficiens pulsus est, in quo nulla servatur aequalitas, motus ipso semper deficit. 1. de differ. puls. cap. 12.

Inanes corporis partes vocantur, quaecumq; inter extremam thoracis costam, & femoris ὀστέον & ossa habentur; inanis siquidem videtur omnis talis sedes, si eam cum supernis, infernisq; partibus, utriusq; ossis conferas. 1. progn. 1.

Incentiones, idem est quod inflammationes. 3. de hū. quæ in medic. 30.

Incidentes dies. Vide Decretorios.

Incisio. Vide Unionis solutio.

Incisorii dentes. Vide Dentes, & Tomi dentes.

Incoctionem, vocat Galenus, coctionis, haud in ventriculo tantum, sed in vasis quoq; & jecore, & universo corporis habitu, factam frustrationem. lib. de med. att. const. cap. 15.

Incrementum morbi. Vide Ascensus morbi.

Increscens. Vide Continua.

Incubus. Vide Ephialtes.

Incurvatio, alias Gibborositas, est distortio spinæ in

in posteriore partem, ex Panis & Tuberculis immaturis in spinâ exortis magnis, & duris, & diuturnis. 3. de art. 2.

Index digitus, est proximus à Pollice, nomen suum ab usu sortitus. lib. Introd. cap. 10. Dicitur & Index, dies contemplatorius, qui eam habet naturam, ut qualisnam dies, cujus est index, sit futurus decretorius, pronunciat velut & indicat. 1. prorrh. 1. & 2. aph. 24.

Indicatio, est juvenis comprehensio, simul cum comprehensione nocentis eveniens, sine observatione & rationcinatione, lib. ad Thrasib. cap. 1. quippe ipsam sequentis, si-ve agendi, & ejus, quod fieri debet, Indicationem dicimus. Ergo, Ex ipsâ rei naturâ exordiri, atq; ita, quod sequens sit, citra experientiam invenire, idem est quod indicatione invenire. Ut si quærat, de sanitate quid sentiendum sit? primum perpendere oportet sanitatis naturam, quæ, quia bona omnibus mortalibus videtur, facit, ut judicemus, eam à nobis servandam esse; quamobrem sui custodia, sanitatis indicatio est. Idem verò & in morbo agendum, qui, quoniam totus præter naturam est, & toto genere malus, indicat & ostendit, se tollendum esse. Ibid. & lib. 3. meth. med. cap. 6.

Indicatoria. Vide Prognostica.

Indices, & Spectabiles dies, consueto more appellat Hippoc., in quibus signum aliquod judicationis appareret, alio quopiam ex diebus decretorii futura, quos ipse 3. progn. 4. per quaterniones digessit, singulis septimanis bipartito sectis. 2. aph. 24. Græcis ἡνδρα, & ἑωρῆσται, h. e. indices & contemplabiles nuncupantur, quod majorem vim & potestatem habeant, ad præagiendam, contemplandamq; futuram crisin, quam ad judicandos mor-

bos; licet in eis aliquando perfecta crisis possit accidere, ut dies quarta, undecima, decima-septima.

Indicia, & signa certa, Prognostica, illa sola nominantur, ex quibus licet certo colligere aliquid de salute & interiectione infirmi, quæ comprehendens uno capite, dicitur esse significationes virium gubernantium corpus, quo pacto robore valeant, aut deficiant, in quibus interim etiam cruditaris & coctionis signa continentur. 3. progn. 39.

Inflammationis nomen propriissime dicitur de tumore partium carnosarum, conjuncto cum renitentia, tensione, febris, calore, dolore, & rubore. lib. de tumor. cap. 2. Fit phlegmone vel propter coincidentiam, vel propter impactionem, obstructionemque omnium vasorum, sive ob circumstantes quasdam moles, vicinarumque partium molestias, quæ meatus occupant. Tandem etiam ex abundantia sanguinis oboritur inflammatio multoties. lib. de totius morbi temp. c. 3. Dicitur verò Inflammatio, Phlegmone, multoties esse aliud nihil, quam Phlogosis sive Inflammation. Est igitur inflammatio omnis, genus si spectes, immoderata caliditas; in specie autem, est cum sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinem obrinente, ad particulam aliquam universim fluente, atque ob multitudinem edomari nequeunte, vehemens dolor arripit hominem, (nisi membrum sensum omnino hebetem habuerit,) pulsus in profunda molestus accidit, tendique omnino ac contundi membrum appareret, & vehementem calorem persentit, adeo ut comburi videatur, & refrigerari desideret, talisque molestia in summa accidit, qualis ex balneis oritur, aut ex igne, aut quovis alio modo calefactis. Multaque sunt hujus species; nam aut affluente sanguine, aut flavâ bile altera, ambobusque simul humoribus alia tertia oritur phlegmone. 2. Glauc. 1.

In-

Inflammen. Vide Inflammatio.

Inflammaria lassisitudo, & Lassisitudo contusiva phlegmonodes, musculorum est affectio, quæ manibus, cruribus, lumbis, spina, musculis, &c. ubi plurimum laborem pertrulerint, accidit, inique, qui ex vehementi clamore, organa vocis, i.e. arteria aspera caput, laryngem, & fauces oblasas habent, vocemque raucam effecerunt. 7. de comp. med. loc. cap. 1.

Inflatio. Vide Physis. 14. meth. 7.

Infundibulum. Vide Choana.

Infractiones oculorum, affectus est, in quo palpebrae inverruntur. com. 5. in 6. de morb. vulg. 2.

Inion, est ea capitis pars, quæ Occiput dicitur, principium medullæ spinalis, ad spiritus modum in multos ramos divisa, ex qua sexaginta fere proveniunt nervi: Gracis τὸ ἰνὼν, terminatur futura quarta occipitalis. 1. 2. de comp. med. loc. cap. 1.

Initiatix. Vide Antegressa.

Innominatus morbus, qui medio loco, inter Lethargum & Phrenitidem consistit, aliàs dicitur Coma pervigil: est, in quo ægri connivent oculis, somnolenti stertunt, oculis fixis intuentur, difficiles & tardi ad respondendum, stultè loquuntur, & remerè nugantur: lib. de puls. ad Tyron. cap. 11. quem affectum, cum longo tempore perduraverit, Typhomaniam vocant. 1. prorrh. 1.

Innominata cartilago. Vide Cricoides.

Innuens, circumnuens pulsus est, qui inequalis est in una distentione. 1. de differ. puls. cap. 20. & 4. de caus. puls. cap. 10.

Inordinata febris est, quæ omni periodo, & certo circuitu caret. 5. de placit. cap. 2. Aliàs Erratica dicitur. 8. de placit. cap. 6. Vide Erratica.

N 4

Insanire, est desipere citra febre[m].

Inspiratio, est externi aeris intra thoracem facta attractio, 4. de loc. aff. 7. ad nativi caloris conservationem, & spiritus animalis nutritionem, 7. de usu part. cap. 9. Duplex est, lenis, & coacta. Lenem, & non coactam appellant, quæ in bene valentibus, nullaq[ue] vehementi agitatione motus cernitur, ac solo peragitur Diaphragmatis motu. Coactam verò, quæ tum in morbis nonnullis, (in primis in Apoplexiâ forti) tum in exercitationibus paulò vehementioribus accidit, in quâ protinus omnes etiam scapularum partes simul attolli conspiciuntur. 2. de placit. c. 4. Inspiratio, & exspiratio, εἰσπνοὴ καὶ ἐκπνοὴ, oppositi motus sunt: ille est, quo distensus thorax per asperam arteriam, necessariò in pulmones aërem exteriorem attrahit, tribus de causis, ut refrigeret, ut ventilet calorem nativum, & ut spiritum animale[m] gignat; hic est, quo thorax contractus, eundem aërem exprimit, ut, quicquid in ipso fuliginosum, fumosumq[ue] ex humoribus genitum fuerit, id exprimendo elidat. Utriq[ue] nomen Respiration, & Respiratus, αἰσπνοὴ, 4. de loc. aff. 7. Per inspirationem autem, attrahit in se homo exteriorem aërem, per os, in pulmonem; per raritatem autem cutis, & carnis, in arterias. Horum motuum uterq[ue], tam ille, quo per os, quàm is, quo per cutim fit aeris attractio, uno nomine Inspiratio appellatur. Per expirationem verò, per eosdem meatus, per quos aërem recipit, eundem remittit; qui cum per os remittitur, Exspiratio; cum per cutis meatus, Transpiratio, Perspiratio, Diffusio, Transpiratus, Perspiratus, Diffusus, ἀναπνοὴ dicitur. 8. de placit. cap. 8.

Instrumenta prima censeantur, quæcumq[ue] ex similibus partibus, simplicis alicujus operationis gratiâ facta sunt; quæ

quæcumq[ue] verò rursus ex his componuntur, etsi unitotius instrumenti actui quàm maxime inserviant, inter secunda connumerantur: musculus enim & vena, & arteria, inter prima instrumenta numerantur; digitus verò inter secunda, atque hoc magis pes, & pede magis crus. lib. de morb. temp. cap. 4. Unde instrumentales corporis partes sunt, Cerebrum, Cor, Pulmo, Hepar, Venter, Splen, Oculi, Renes. Ibid. cap. 3. Instrumentales autem morbi fiunt, vel naturali harum partium formatione permutatâ, vel non serrato numero partium ea componentium opportuno, aut utriusq[ue] parti convenienti magnitudine sublatâ, vel quoddam utriusq[ue] ut naturalis positus expetebat, ipse cohereant. Ibid. cap. 6. Vide Similare.

Insultus accessionis, est indivisibile illud tempus, quo accessio primum invadit: quod alii febris significationem, annotationem, & Epifemasiâ vocant. lib. de morb. temp. 6.

Intemperis morbofa, Græcis νοσώδης ἀνισοκρατία, partium similitudinum morbus est: fit, ubi qualitates primæ, seu elementa ipsa, à naturali symmetria, & commoderatione, deflectunt. Non autem citra rationem adjectum est, Morbofa; duplex enim existit intemperies, ex Gal. 2. de temperam. Aia enim est naturalis, seu sanitaris, & alia morbofa. Sanitatis sive naturalis est, quæ à media temperie paululùm abest, citra evidentem interim functionis noxam; vel i. quâ nulla functio animalis adhuc manifestè leditur, licet imbecillior reddatur, tunc equidem intemperior sanè est, sed nō agrotabit homo. Quod si quis hoc denegaverit, huius alteri fatetur necesse est, vel omnes homines agroare semper, vel unam esse omnium intemperiem: quod utrumq[ue] absurdum est. Morbofa verò intemperies

est, cum animal ob naturalis temperamenti vitium aggratatur: quæ si omnibus corporis partibus equaliter insit, ut in Hæctica febre, equalis intemperies appellatur, & dolorem non efficit; secus verò dolorem efficit, & inæqualis dicitur, ut docet Gal. de inæquali intemp. 1. de sanit. tuend. lib. de constit. art. & cap. 8. artis parva.

Interceptiones venarum, Græcis dicuntur ἀποδόσεις τῶν φλεβῶν τῆς ἀποτομῆς: sunt oppletiones vāorum, à copiâ sanguinis; vena enim tūm supra modum oppleta fuerit, premi virtutem, gravariq; est necesse, atq; in extinctioni agi periculum nativam caliditatem; quippè quæ ob multitudinem, & copiam, suffocationi quidpiam simile patitur. 4. apb. 23. Ubi verò intercipiuntur, quæ sunt in animali, arteria, & ita oppleta sanguine fierint, ut nullus in ipsis vacuus relinquatur locus, in quem, dum attolluntur, aërem externum attrahere possint, tūc strangulatur atq; extinguitur calor innatus: & qui ita affecti sunt, subito sensum & motum totius corporis amittunt, lib. de caus. morb. cap. 3. nequeuntibus spiritibus naturales pertransire meatus, atq; ob id ab Hipp. interceptiones spirituum nuncupantur. 4. de rat. vict. 27.

Intercidentia. Vide Coincidētia, & Paremprosis.

Intercidentis. Vide Decretorius. Intercidentis autem pulsus est, cum inter duos ictus, ordinem elegantem servantes, ictus medius intercurrit, lib. finit. ned.

Intercipientes membranæ. Vide Cingentes, & Hypezochoræ.

Intercostales muscoli, ἀντὶ τῶν ὀστέων, sunt musculi, inter medias costas sitæ, quorum binæ sunt in singulis costarum intervallis, alter externam partem spectans, alter interiorem. Extremi thoracem dilatant, à inspirationem;

nem; Interni contrahunt ad expirationem, 5. de caus. respir. 8. de anar. adm. & 7. de usu part.

Intercurrens pulsus est, qui inæqualis est, inæqualitate crebritatis. 1. de diff. puls. cap. 12.

Interfœmineum, quod Perinæon Græci vocant, est media illa pars corporis, quæ inter totum id, quod inter inguina utriusq; cruris est, (quod gressuram solet Hipp. appellare) interjacet, quod duabus feminibus sit interpositum. Sive est intercapedo, quæ ab exortu pudendi usq; ad anum pertinet, ubi etiam vesica collum collocatum est. 4. de artic. 45. & 2. de fract. 43.

Intermissionem febris vocat Gal., cum febris in quietem desierit, 1. de cris. cap. 3. & ad infœbricitationem devenit. Græcis ἀναψέξις, 3. de cris. cap. 4.

Intermittens pulsus est, qui inæqualitate constat raritatis & parvitatæ, alio atq; alio utrobq; modo. Habet raritatis inæqualitatem, quod quies sit longissimè producta; parvitatæ autem anomaliæ, quod distentio minimè dilata. 1. de differ. puls. 12.

Internodia. Vide Phalanx, & Digniti.

Intersepientes. Vide Hypezochotes.

Interseptum, ea est pars narium, quæ alas, seu pinnulas narium nominatas, internamq; illam cavitatem, in duas partes discriminat. lib. introd. cap. 10.

Interstitium, est duodecim horarum spatium, in quo febris terminatur. 2. de cris. 9.

Intertrigines. Vide Hydroa.

Intervallum. Vide Ictus, Ablatio.

Intestinum. Vide Entera.

Intestinum cœcum, τὸ πρῶτον, est intestinum à ventriculo, ordine quartum, parvum velut venter quidam, & proin

proin figurâ à reliquis differt; nec enim, ut reliqua, oblongum est, sed in modum ventriculi rotundius: ex qua figurâ efficitur, ut unâ tantum parte pertusum, & uno foramine, tanquam oculo, præditum esse videatur; pervium tamen est, quodq; ad ipsum ex tenui intestino, ileo, descendit, facile in Colon delabitur.

Intestinatorum difficultas, est velox exitus eorum, quâ comeduntur, & bibuntur, quâ talia rejiciuntur, qualia fuerunt devorata. 4. aph. 12. Propriè Lienteria dicitur, 6. de loc. aff. 2. & duabus porissimum notis à Cœliacâ dispositione discernitur, siquidem lientericis alimenta prorsus cruda, qualia sumpta sunt, infernè prodeunt, tantâ tamq; manifestâ cruditate, ut alimenti assumpti genus apertè dignoscatur; verùm in Cœliaci, jam adepta sunt aliquam coctionem, & diutius in ventriculo morantur, neq; tam citò per alvum descendunt. Cruda tamen sunt & aliquando fetida, non mordacia, sed quod sapius excreta, animi deliquium inducunt.

Intumescencias, quas οἰσμήματα Græci vocant, Hippocrates omnes tumores præter naturam vocat, quos inflammationes, & durities, & intumescencias, distinguunt. 3. de his, quæ in medic. fiunt. 30.

Inviolata membrana. Vide Membrana dura.

Inviscatio oculi, est quadam viscositas, quæ in illius albedine, aut nigredine hærens, ex vulneribus ejusdem oborta, palpebram cum pupilla, vel utraq; palpebras simul jungit. lib. de ocul. cap. 9.

Involucrum cordis. Vide Membrana Pericardios. lib. de ven. & art. diss. cap. 2.

Involutum intestinum, quod & Ileon, & Tenue dicitur. Vide Ilion, & Tenue.

In-

Inustio in ventre, oritur, propter acrem eorum, quæ ingesta sunt, caliditatem, ob quam & febre contingit: Colliquatio verò fit febrili a caliditate, absumptâ pinguedine, colliquatq; molli carne. 4. acut. 112.

Ionthos Græcè, Latine Varus, tumor parvus & durus, in faciei cute ortus, à crasso videlicet succo congregatus. 5. de comp. med. loc. cap. 3.

Iris oculi, aliis Stephanon, & Corona, est medius ille oculi locus, quo committuntur inter se tunicae universæ. 14. meth. 19. Sive, Iris est oculi tunica mollissima, alba, desinens in circulo, ubi & aliæ omnes subjectæ sunt tunicae, & album nigro conjungitur. 10. de usu part. cap. 2. Inditum ei fuit nomen, ab arcu celestis similitudine.

Isarodes bilis. Vide Bilis pallida.

Ischias, & Ischion. Vide Coxa, & Arthritis. 2. meth. 2. & 15. de usu part. cap. 8.

Ischiadica vena est, quæ supernè descendens, ad partem cruris intemam tendit, & occultatur, quod usq; ad malleolum veniat exteriorem. lib. de anat. viv. Eadem hac vena, externa malleoli dicitur, & Ischiadica, quod scēta Ischiadicis conferat.

Ischæma, medicamentum est, ad sanguinem fluentem continendum, supprimendumq; 5. de compos. med. loc. c. 14. Græcè ἰσχμα, paulò diversum à πόνος ἰσχυρὸς & ἰσχυρὸς: hoc enim non sanguinem modò supprimit, sed & inflammationem arcer; illud verò tantum sistendi sanguinis causâ usurpatur.

Ischuria, ἰσχουρία, est urina suppressio & retentio: Dysuria, in quâ urina redditur cum difficultate: Straguria, cum guttatim destillat, quam & Urinæ stillicidium appellant. de constit. art. 6. & 8. de placit. 6. Fit autem urina sup-

suppressio, vesica, vel externere non valente, vel ejus collo conclusio: duplex est, proprie aut improprie dicta; illa jam definita est, hæc est illud symptoma, cum urina in vesica omnino non venit, deperditâ scilicet renum actione. Cololum porro vesica clauditur, vel propter obstructionem à sanguine concreto, tum crasso pure, tum calculo, tum topico, tum aliquo germine carneo, ibidem enato, vel propter conniventiam, ab aliquo tumore præter naturam, aut cum immodicè est repleta. 3. de sympt. caus. cap. 2.

Ilis emplastrum, est Cephalicum emplastrum. 2. de comp. med. per gen. cap. 18.

Isthmus, est regio communis gula & gutturi angusta & longa, in qua utriusq; osculum ascendit: Corpus vero hunc locum ambiens, Pharynga, i.e. fauces vocant. lib. de musc. diss. cap. 15. Isthmus ea pars corporis est, ait Gal., quæ os & gulam interjacet; per metaphoram ita nominatur, deductam ab iis, qui proprie dicuntur Isthmi; cujusmodi sunt angusti quidam terra processus, inter duo maria sita. Unde Paristhmia, i.e. Tonsilla, sunt inflammationes locorum, & parvium, ad hunc Isthmum pertinentium; 2. aph. 26. quâ ratione id quod uos & & & idem erunt, h.e. latitudo & capacitas, quæ inter stomachum, & laryngem, i.e. guttur, interjacet.

Ichmoidea ossa. Vide Cavernosa.

Judicium, sive Judicatio. Vide Crisis.

Judicatoria signa; ab Hippoc. vocata sunt, sudores, rigores, sanguinis fluxus, multum alvi profluvium, similiter vomitus, dolor capitis repente invadens, vehemens spirandi difficultas præter rationem, cordis morsus, quadam in Hypochondriis circa insignem dolorem iensus, vigiliae vehementes, delirium, nox absq; ratione molesta, accessio anti-

anticipans, lacryma involuntaria, nihil patientibus oculis, neq; ex tristitia provenientes, rubor faciei, labrum inferius agitarum, livida vel obscura & tenebrosa quedam ante oculos observantia, hallucinationes quedam male, vel nasus repente rubescens, parotides, aut omnino aliquis in articulum decubitus generatio, & similia, quatenus subitam mutationem in morbo in melius pejusq; fieri ostendunt. Judicatoria signa appellantur: ita enim morbum judicant, ut cocto morbo, futuram sanitatem; crudo autem, vel perniciem, vel morbi longitudinem decernant. 1. aph. 12. Vide Decretorius.

Jugale os. Vide Zygoma.

Jugulares venæ, & & & sunt duo rami magni & insignes, vena cavea a gibbo Hepatis exorta, qui postquam ad dextram Cordis aurem sanguinem tulerint, ab eo, tanquam ab initio, progressi, ad collum recto tramite festinant; in quo sunt duæ magnæ & insignes vene, quæ ob id Jugulares vocantur. 2. acut. 10. & lib. de ven. & art. diss. cap. 7. Dicuntur etiam externæ, superficialiæ, Apoplecticiæ, Guidez, manifestæ, à quibus quippe superficialiæ ferè omnes colli, & capitis partes nutriuntur. 2. acut. 10.

Jugulum. Vide Claves.

Juleb. Vide Zulapium.

Juxtaingina, i.e. Cynanche. 1. aph. 12.

Ixiæ, Varices, sic dicuntur ab Aristotele οἱ ἰξοὶ: sunt tamen, qui differre putant, vocantes nigros, venas omnes dilatatas, in quacumq; corporis parte; istas vero eas modo, quæ in cruribus habentur: sed discrimen nullum censendum est.

LABOR, ab Hipp. sæpius consuevit sumi pro exet-
citatione, interdum pro dolore, deniq; etiam pro
quâlibet noxâ & læsione. com. 5. in 6. de morb. vulg. 10.

Labrum, sive Labium, χαλθ, est oris extremitas
musculosa, id ipsum alternatim claudens, & aperiens;
unde quod in labiis prominet & quasi propendet, πρὸ χαλθ
dicitur. 11. de usu part.

Labyrinthus. Vide Cœcum foramen.

Lactes, apud Hermolaum barbarum, & Plinium si-
gnificant & sunt molliora intestina, potissimum in homi-
ne & oye, per quæ cibus & chylus labitur; sed apud Aristo-
telem, Gazam, Budeum, & Galenum 5. de loc. aff. cap. 7.
Lactes sunt & significant omentum, reti aucupario simile,
seu pingue illud, quod intestina superiora ambit. Id
ipsum Nostrates in piscibus lactantiis, & lactumas
vocant.

Lacuna. Vide Choana.

Læves arteriæ, Arteriæ venosæ, & Venæ arte-
riolæ, per pulmonum substantiam propagatæ & dispersæ
propagines sunt, quas omnes natura per anastomosen, ad
unum principium applicuit, sinistro Cordis ventriculo, in
quo siquidem caloris est principium, ut per eas refrigeratio
continua, Cordi compareretur. 7. de usu part. cap. 9. Vide
Arteria.

Lævitas intestinorum, Græcis λαιότης dicitur, est
velox, & sine ullâ omnino præcedenti transmutatione, cibo-
rum dejectio, eveniens aut propter exulcerationem super-
ficiarum ventriculi & intestinorum, aut propter poten-
tiæ retentricis eorundem imbecillitatem; quorum primum
ex mordacibus substantiam tenuem habentibus humori-
bus

bus fit, qui in pueris etiam Aphthæ, i. e. oris ulcera con-
citât; alterum verò ex magnâ ventriculi atq; intestino-
rum provenit intemperie. 3. aph. 22. Vide Intestinorum
difficultas.

Lagochilos. Vide Lagophthalmos.

Lagonas. Vide Ile.

Lagophthalmos, i. e. leporinus oculus, est, cum
superior gena aded retrahitur, ut oculus, dum clauditur,
totum non contegat, estq; affectus in partibus instrumen-
talibus, non in magnitudine, sed in defectu, non ut superva-
caneum, sed veluti deficiens, cujusmodi mutila, & curvâ
omnia, sicut in labris, sic & in oculis, cernitur. Hinc etiam
Lagochilos dicitur, qui leporinâ habet labia. lib. introd.
cap. 3. & lib. finit. med.

Lambdoides, sutura capitis posterior est, & transver-
sa, quâ occiput incipit, à λ litera Græcæ similitudine ita
nominatur. lib. de ossib. cap. 1.

Lambdoides os. Vide Hyoides.

Laminas, communi vocabulo Anatomici appellare
consueverunt instrumenta, ad secanda corpora accommo-
data; cujusmodi etiam sunt, scalpella, spatulæ, am-
phimela, spicilla, oricularia, melorida, quæ & ex ligno
densiori, & aliquando ex buxo, confici solent. 6. de anat.
adm. cap. 10.

Lana succida, i. e. non lora, quæ & cefyperon dici-
tur. 14. meth. cap. 7.

Laparon, Græcis molle & vacuum; Hypolapa-
ton autem, subvacuum & submolle significat. 3. de
diffic. respir. c. 12. Sumitur & pro ventris dolore. com. 3. in
6. de morb. vulg. 32. Vide Ile.

Lapideum os. Vide Lithoides.

Lapis specularis. Vide Diaphanes.

Lapis in vesica. propria passio est ferè puerorum, qui ob edacitatem non paucos crudos humores coacervant; ex quibus pars crassior, unà cum urinis ad vesicam perveniens, fit lapidum generationis materia: acervatur verò hic crudus humor, sæpe ob edacitatem & ingluviem, ut in pueris; sæpe etiam ob potentia concoquentis imbecillitatem, ut in senibus. 3. aph. 26.

Larynx sive guttur, est suprema bronchii pars, seu bronchii caput, prima aspera arterie pars, summo ori continua, primum vocis instrumentum, lib. de vocal. instr. diff. cap. 2. ex cartilaginibus, musculis, nervis, & substratâ membranâ constans, c. 4. quæ larynx in collo extare apparet, ad sensum, tangentibusq; dura sentitur, & sursum nobis translucens fertur. 7. de usu part. c. 5. ἀγογὴ Græcè.

Lassitudines, νόσος, Græci vocant affectus, ex multo vehementi motu corporibus vel totis, vel partibus, quæ amplius laborarunt, oboriri soliti: undè Acopa medicamenta, quæ lassitudinem tollunt, appellatur, 7. de compos. medic. per gen. c. 11. Lassitudinis species tres sunt, ἐκκωδύς, τὸνός, & ἀσθενήσις, Ulcerosa, Tensiva, Inflammatoria: quæ notis & signis propriis distinguuntur; in Ulcerosa enim Lassitudine, ulceris sensus, cum moventur partes, se exhibet: in Tensivâ, incendi tendiq; sibi videntur, qui laborant: in Inflammatoriâ, accensa, inflammata confusaq; apparent membra.

Lateralis morbus. Vide Pleuritis.

Latum os. Vide Dorsum.

Latus musculus, μυοδὲς πλάγιος, apud Gal. lib. de muscul. diff. c. 1. est latus ille musculus, qui sub cute in collo habetur. Incipit, in priori quidem parte, ex laborum

ac

ac buccarū; in posteriori verò, ex spina regionibus, toti cuti, quæ circa collū est, in orbem subtenus & membranosis, ut interdum membrana potius, quàm musculus videatur.

Latus pulsus est, qui pulsū naturali, in latitudine major est; Longus, qui in longitudine, Altus, qui in profunditate. Econtrâ Angustus, Brevis, Humilis. l. de puls. ad Tyron. cap. 2.

Laxius intestinum, i. e. Colon. 2. aph. 40.

Lea, seu lenia medicamenta sunt, quæ partes asperas leniunt. l. de Dynam. in proem.

Lemmata, sunt propositiones per se credibiles, quas vocare consuevit Aristoteles dignitates, vel proloquia, vel postulata. 2. acut. 20.

Leno, sive Linon, Græcè ληνὸν, est regio in summo vertice Cerebri, ubi duæ venæ invicem congregiuntur à torculari similitudine, propter tenuem membranâ. Vide Torcular.

Leporinus. Vide Lagophthalmos.

Lepidoides sutura, λεπιδωδὲς, vel conglutinationes, Galenus futuras juxta aures vocat, quæ in ossibus, ad squamæ similitudinem structis, habentur. Fiunt hæ duobus inter se ossibus coherentibus, non per suturam quidem, sicuti Coronalis & Lambdoides, sed paulatim syncipitis ossi, instar squamæ attenuatum descendit, atq; in id os, quod infra ab auribus ascendit, subintrat. lib. de ossib. cap. 1. Squamosæ agglutinationes nuncupantur, 9. de usu part. c. 18. Mendosæ adhuc & temporales dicuntur. Ibid.

Lepra, λέπρα, est cutis mutatio in habitum præternaturalem, cum asperitate, & pruritis, & doloribus, nunquam & squamis decedentibus plures corporis partes depascuntur. lib. finit. med. Lepra, & Ploza, seu Scabies,

affectus sunt valde affines & congeneres: ita ut Psora nihil aliud sit, quàm mitior Lepra; est enim Psora ad Leporam quadam quasi via, ut Lepra ad Elephantiasin, si magis humor uratur, malignior evadat, & morbus diutius protrahatur. Uterq; affectus pruritus habet inseparabilem, sed in Lepra tantus est, ut ager etiam vehementissimè scalpendo, nullo modo juvetur, sed omnis porius generis ulcera & phlegmonas accersat, quod cutem exasperet, & subjektam illi carnem, multò quàm in Psora profundius depascatur. Unde & squamulas procreat, quales in Psora non generantur, quæ fursuracea tantum corpora ex se remittit, ut quæ à minori gignatur intemperie, & humore minus crasso, terrestri, assato, & maligno. Ab eisdem illis squamis dicitur λεπρε, quasi λεπιδ, i.e. squamosa; ab Avicenna dicitur Albaras nigra, & Impetigo excoriativa, quod cutis in cortices quasi squamasq; resolvatur. Leporam hanc Celsus lib. 5. vocat Impetiginem, quam in quatuor species distinguit, quæ à superiori Impetigine plurimum distat.

Lethargus, Græcè λήθαργος, & λήθαργία, passio est Phrenitidi contraria, siquidem in ea inexpugnabilis dormiendi necessitas adest, perinde ut perennes vigilie Phreneticos infestant. Dicta autem Lethargus, quod eo corruptis, omnium rerum oblivio accadat. Somnus siquidem, si longius producat, difficilemque habuerit expergesactionem, Coma dicitur, si verò solo tempore naturæ modum convenientem excesserit, & non habuerit difficilem expergesactionem, somnus longus rectè nominatur, qui sit refrigerato primo sensorio, Cerebro ipso: quæ refrigeratio cum fortis fuerit, mista quidem humiditati facit lethargicas passiones; cum siccitate verò,

Cata-

Cataleptæ, i.e. deprehensiones vocatas, 2. aphorism. 3.

Leuce, λευκή, i.e. alba Vitiligo, 2. meth. 2. seu corporis & pilorum in album colorem mutatio, præter naturam. lib. finit. med. & 1. de compos. med. loc. c. 1. Neq; verò ad solam cutem, sed & ad subditam quoq; ejus carnem, vitium hoc pertinet. Fit porò cutis & caro alba, & pituitosa, qualem Polypodes & locusta, ceteraq; crustacea, exangui & albâ carne prædita obtinent. Id ipsumq; malum videtur esse, quod Nostrates Leporam albam, Avicenna Albaras album nuncupavit. Differt à Lepra, & Elephantiasi, quod hæc sint cum asperitate cutis, rosione, pruritu, & squamulis, Leuce verò cutem habeat lenem sine ulla aspredine & rosione.

Leucoma, λεύκωμα, i.e. oculorum albugo, 1. de remed. par. fac. est cicatrix oculorum altior, magisq; profunda; sicuti quæ superficialis est, οφθαλμία dicitur.

Leucophlegmatia, i.e. alba pituita, Aqua inter cutem; sic dicta, quod sui quidem ratione semper sit alba, sed propter mixturem quorundam aliorum humorum, verum mutet colorem. 7. aph. 29. Eadem est cum ea Hydropis specie, quæ Hypofarcidium, sive Anasarca dicitur, οίδημα & λευματίας. lib. Introd. cap. 13.

Lichene affectio. Vide Impetigo.

Lien. Vide Splen.

Lienteria. Vide Intestinorum difficultas.

Ligamentum, Græcis σύνδεσμος, est corpus nervosum, quod ex osse omnino ortum habens, inseritur in os, aut in musculum. Nomen ipsi ab usu est inditum: 1. de motu musc. cap. 1. quod & Copula dicitur. lib. Tigni, cap. 9.

Ligatio, dicitur de obstructis articulis & difficilibus artuum motibus, quos Græci Ancylas vocant. 7. de compos.

med. per gen. cap. 6. Est & affectus, qui interdum naturaliter accidit, membranis linguam continentibus durioribus & brevioribus statim à primo ortu factis; interdum ex acquisitio, ob cicatricem quampiam duriores ex ulcere contractam; quam Græci ἀνωδύλωσος vocant: qui hoc malo laborant, tardè sermonem explicare incipiunt: atq; ob id, hoc virii genus, Latinis ligatio linguæ dici potest.

Lingula. Vide Epiglottis.

Linon. Vide Leno, & Torcular.

Linospermon, i.e. semen lini. 1. de aliment. fac. 32.

Lipodermus, defectus est pellicula tegentis glandem Colis, adeo ut distrahi amplius non possit. lib. finit. med.

Lipopsychia, i.e. animi deliquium, idem quod Liporhymia, λεποψυχία, ἢ λεπτορρυμία, solis differunt gradibus, quod ex ipso liquet nominis erymo: Liporhymia vitalis facultatis defectum, Lipopsychia animalis facultatis exolutionem significat; attamen utriusq; facultatis defectu, omnium virtutum exolutio contingit, ut sensu motuq; destituantur agri, non minùs quàm animo: quale advenit iis, qui, nisi frequentius nutriantur, resolvuntur. 12. meth. cap. 5.

Lipothymia. Vide Lipopsychia.

Lippitudo oculi est, cum horum album rubescit, & palpebra attolluntur, cum dolore connivent, & agere manus ad motas ferunt. lib. Introduct. cap. 15. Vide Ophthalmia.

Lippitudo dura. Vide Sclerophthalmia.

Liquabilia medicamenta vocantur, cum quæ ignis contactu colliquantur, cum quæ ex humidis quibusdam, velut aqua, aceto, vino constant. Igne liquescit propolis, cera, resina, ladanum, sebum, chalbanum: Aceto solo liquecunt cirra ignem, gummi, ammoniacum,

cum, sagapenum, opopanax. 3. de comp. med. per gen. c. 5.

Liquida alvus, in qua liquida dejiciuntur. comm. 2. in 2. prorrh. 3.

Lithiasis, i.e. calculi morbus, renihus & vesica familia, in quibus quippè partibus calculi ut plurimum generantur. lib. de renum aff. dign. cap. 2. Dicitur & λιθίας, oculi morbus, in exteriori parte palpebrarum, in quâ alba quedam & crassa, callis aut lapillis similia apparent, oculum pungentia.

Lithoides os, λιθοειδής, i.e. lapideum, 9. de usu part. cap. 10. est, quod utrinq; ad aures positum, petra speciem referens, lambdoides sutura sinibus terminatur, in quo inest processus columna similis, ad acus styloide similitudinem: undè Styloides, Belenoides, & Graphioides, γράφειδής, βελονειδής & γραφειδής appellatur, sub quo auditorius meatus continetur. lib. de ossib. cap. 1.

Lobi, i.e. fibra, quibus, tanquam digitis, Hepar, ventriculum, & Pulmo, Cor ad unguem complectitur. 4. de usu part. cap. 8. & lib. 7. cap. 10. & 7. de anat. adm. cap. 11. Dicitur & lobus, imia & carnosus aurium pars.

Localia medicamenta, quæ Topica dicuntur, medicamenta sunt, quæ extrinsecus applicantur corporis partibus, quibus herclè non prius utendum, quàm totum corpus purgaveris, venamve incideris, si redundancia in toto corpore subest, alioquin implebis potius corpus, quàm vacuabis. 13. meth. 22.

Lochia, λοχία, dicuntur omnia, quæ à puerperâ post exclusum foetum & secundas exeunt, Aristoteles vocat purgamenta: sunt autem reverà τὰ νῆαυα ἡμῶν, à quibus etiam solâ ratione differunt, quod hæc ante partum, illa post partum, sic appellantur. lib. de atra bile, cap. 8.

dundat, noctu domo egressi, urbem circumeunt, quadrupedum more incedentes, lupos imitantur ululantes, donec dies illucescat, defunctorum monimenta quaritant, adaperiunt, cadaverum frustra arripiunt, secumq; collo gestantes, fugiunt die vivos homines, nocte insequentes mortuos.

Lycoides. Vide Lupus.

Lyparia febris. Vide Febris lyparia.

Lytheria, i.e. solutoria signa, qua magni & vehementis morbi solutionem firmam solent precedere. i. de dieb. decret. cap. i.

M

MADAROSIS, *μαδαρώσις* à *μαδάω*, i.e. Glabrities, Calvitium, capillorum defluvium est, à cacochymia & viciosis humoribus proveniens, quales affectus sunt Ophiasis & Alopecia, qua omnes passionis sanabiles sunt, viciosis humoribus, qui ad radices capillorum harebant, vel resolutis, vel aliò translatis & vacuatis. 6. aph. 34.

Madorem & Pladorem, i.e. superfluentes humiditates, appellare consuevit Hippocrates, siue tenues, siue crassiores, cuiusmodi & pus est. 3. de fract. 19.

Magma, in specie mirobalanorum facem vocant, 7. de compos. med. per gen. cap. 7. Aliqui verò omnem unguenti faciem, qua expressa liquidiori materia utili relinquitur, & in fundo subsidet, *μαγύα* vocant. Extenditur quoq; nomen hoc ad omne unguentum spissum paucò liquore subactum.

Magna arteria. Vide Arteria aorta.

Magna febris. Vide Febris magna.

Magnus morbus. Vide Affectus gravis.

Magnus pulsus est, qui naturalem pulsum omnibus tribus dimensionibus superat; qui verò iisdem dimensionibus.

bus, à naturali pulsu superatur, parvus dicitur. i. de pulsu ad Tyron. cap. 2.

Malæ, carnea partes sunt, qua inter nasum & aures jacent, prisci Genæ dicuntur, lib. Introd. cap. 10. sic dictæ, quod rabentes ad mali similitudinem sub oculis leniter rotunda prominent. i. de artic. 3.

Malactica medicamenta sunt, qua induratorum solvunt duritiem: quemadmodum relaxantia, qua tensioni medentur, nuncupantur. 7. de compos. med. per gen. cap. 9. Malacticum autem emolliens dicitur eorum corporum, qua induruerunt, ac in quibus contentus est humor præter naturam, velut partes sunt scirrhusæ; quod verò à siccitate induratum est, humectari postulat quod à congelatione, calesceri. Græcè *μαλακτικὰ φάρμακα*. 5. simpl. 3.

Malagmata, aliàs Cataplasmata, vocant omnia pharmaca, qua forinsecus imponuntur, siue adstringendo condensent, siue indurent, siue emolliant. 8. de compos. med. loc. 5. Propriè autem Malagmata vocantur, qua partes præter naturam induratas emolliunt, moderatè sunt calida, nec tamen exsiccant, aut humectant insigniter. Nam, cum exactè mollientia, medium quodammodo ordinem inter humectantia siccantiaq; sortiuntur, proin moderato suo calore, indurescentium substantia, veluti fusionem quandam molliuntur; ubi verò diutius diffusa fuerint, digerentium medicamentorum loco esse possunt. 7. de compos. med. loc. cap. 1. Undè quidam nullum discrimen constituunt inter *μαλάγματα*, *ἐμπλάσματα*, & *τροχιάρια*. Porro, Malagmata aut mediis corporis regionibus, (qua propriè *ἐνδεδυμένα* Paulus appellat) ut Ventriculo, Fecinori, Lieni, Cordi, imponuntur; aut extremis partibus, ut Capiti, & articulis, admoventur.

Ma-

Maligna. Vide Cacoëthe.

Malleoli, sunt ima ab utroq; latere tibia, sura, partes gibba, ex parte exteriori, intrinsecus cava, carne carentes, extra alia prominentes, sub quibus utring; talus consine-tur. lib. de ossib. cap. 22.

Malleoli vena duplex est, altera interna, ad interio-rem tibia partem (Cream Latini vocant) procedens, ac inde ad malleolum, ad ipsum tibia extremum, pervenit. Hac & Saphena corrupto vocabulo, pro Saphena, i.e. ma-nifesta, dicitur. Altera externa, & superficialia, per ex-teriolem alterius ossis tibia, quod πρὸς τὸν vocant Græci, producitur, ad pedis pertingens articulum; unde Exter-na malleoli, & Ischiadica vena aliquibus dicitur.

Malthacode emplastrum, i.e. mollicinum, quo genere Hippocrates omne medicamen vocat, quod conna-tam humiditatem habet, qualis in pinguibus est & oleosis medicamentis, & quidem in ipso oleo, aqua, resina, & cera. 4. de compos. med. per gen. cap. 9.

Malum granatum, & Malum punicum. Vide Cartilago ensiformis.

Mammæ, (μαστὸς ἢ τῆθος Græci) est carnosae in pectore, ad utrumq; latus, eminentia glandulosa, semicir-cularis, in cujus medio papilla (Græcè θῆλη) extuberat, quam ambit circulus quidam subniger, qui φῶς dicitur, gignendi lactis vim à natura habens. 1. de sanit. tuend.

Mammillaris, μαστοειδὴς, est apophysis ossis tempora-lis, papillis mammarum, præsertim vaccinarum, similis: Ex-tuberat, & cavus est, quo aer in ampla & anfractuosa ejus cavitare conclusus, magis resonet auribus. Dicuntur etiam quibusdam Uteri cornua, νεφῆα dicta, μαστοειδῆς ἀνο-φύουες, propter similitudinem, quam habent cum mamma.

Man-

Mancum, & Mancinitatem, aliàs Cyllon, & Cyl-losin nonnulli, de omni membrorum distortionem dicunt: alii eam tantummodo distortionem significant, in qua, in interiolem partem, membrum inclinatur, quod cum acci-dis, necessum sit, ut summum ejus, & G. pes intro contor-tus, quasi mancus & mutilus appareat. 3. de artic. 87. Vide Cyllum.

Mandibularii, Manducatorii, Manforii, Masse-teres musculi, Græcè μαστῖγες ὤτερ, à mandendo sic dicti, alii sunt à temporalibus, quos Crotaphitas vocant; nam Anatomici, eos temporales, seu temporinos nomi-nant, qui ex ossibus temporum capitis exoriuntur, quos, cum intenduntur, committere ac claudere os manifestè conspicimus; alios verò, qui latius, inferioris maxillæ parti-bus, utring; alter, superjecti sunt, propterea quod in man-ducando, maxillam circumagunt, manducatorios vo-cant, cum illi, qui è superiori parte deferuntur, efficere id minimè valeant: attrahunt enim sursum eam tantummo-do, non traducere etiam hanc illac queunt: unde in com-mittendo quoque ore, ipsorum auxilio indigemus. 2. de artic. 5. & 4. de anat. adm. cap. 2. & cap. 4.

Mania, Furor, Insania, μανία, species delirii vehe-mentioris, 2. de caus. sympt. cum agri citra febrem insa-niunt, & mente alienati sunt; cui insania si adjungatur magnitudo & vehementia symptomatum, (ut, cum agri calcitrant, mordicis impetunt vel ingredientiæ, vel quoscunque obvios, ferarum more, disperpunt) Mania dicitur ex affata, vel atra, vel flava bile procedens. 3. de loc. aff. cap. 7. Quod si à sanguinis copia non purvente ori-ginem ducat, erit quidem Mania, sed cum risu, hilari vultu, & perpetuo cantu. Aliquando Hippocrati Ma-nia

nia idem quod Melancholia propriè dicta. Gal. 6. aph. 21.

Manifesta vena, ramus est vene à Corde ad furculas ascendens, qua per faciem, oculos, caput & nares dividitur, ut omnia membra nutriat, qua inde manifesta vocatur. lib. de anat. viv.

Maniodes paraphrosynæ, sunt vehementes insania, propter atra bilis malignitatem, cum flava bilis Cerebrum apprehenderit, febriq; vehementia assasum hunc succum melancholicum reddiderit. com. 1. in 1. prorrh. 10.

Manna, mel roridum, vel aërium: Mellis species est, non ignota veteribus, Galeno, Plinio, Dioscoridi; sed mellis nomine, & titulo comprehensa, ne quis eam ab Arabibus primum cognitam, proditamq; putet: sic enim de ea scriptum reliquit Galenus; In foliis, inquit, stirpium adnascitur quidpiam, quod nec eorum succus, nec fructus, nec pars existimari possit, sed roridum quiddam, nectamen continenter, neque copiosè pronascei soleat. Nec me præterit, per ætatem, in arborum, fruticum, herbarumq; foliis plurimum fuisse inventum, sic ut à ludentibus rusticis, Jupiter diceretur melle pluisse: præcesserat tùm nox frigidior, pridè calida, sicq; cœli constitutio diluxerat; quapropter inter rerum Naturæ peritos conveniebat, halitus, quos terra vel aqua exspirasset extenuatos & excoctos, nocturni frigoris beneficio coaluisse. Id in regione nostra rariùs evenit, in Libano monte quotannis, aded ut extensis pellibus arbores succutiant, & reciprocè quod profluit, ollas, & fictilia compleant: privatoq; nomine vocant *ἀπορροήν*, i.e. roscedum mel, & etiam *ἀερώδη*, i.e. mel aërium. Hæc Galenus 3. de alim. facult. cap. 39. de Melle.

Melle. Cuiq; igitur patere debet, totam Galeno Mannam, qua gustu prorsus mellea sentitur. Dicitur item & Manna thuris, (qua & succussio, & Pollen nuncupatur, 2. de artic. 44.) i.e. thuris mica, concussu elisa corticis parium participes, adstringendi vim totam & qualitatem possidentes. 5. de compos. med. per gen. cap. 2. Videtur aliquibus Mannam thuris nihil à thure trito ac lævigato differre; Mannam enim propriè appellant id, quod excussum est à thure, circa magna onera confrecto; auferuntur enim ab ipso fragmenta quædam parva corticis thuris. 4. de compos. med. loc. cap. 4. & 13. meth. 5.

Manus, (quas homo armorum loco obtinuit) sunt juxta Aristotelem, organum ante omnia organa; cum quodlibet organum aliud particulare possint recipere, 1. de usu part. c. 4. Manus autem, nunc totum artum superiorem, brachium scilicet, cubitum & manum significat; nunc extremam manum tantum. 2. de usu part. cap. 2.

Manus dolor, Græcis *ῥεγάρα*, Arthritis species est, quæ manuum articulos occupat: ut Gonagra, quæ genui & Podagra, quæ pedes.

Manforii musculi. Vide Mandibularii.

Marasmus, sive Ex morbo senium, est frigidum, & secum corporis temperamentum, non natura, vel annorum multitudinis ratione comparatum, sed febrili morbo: quod non in animalibus modò, verum etiam in stirpibus supra modum arefactis, visitur. 5. de sanit. tuend. cap. 9. Marasmus itaq; idem est quod Tabes, quæ non idem est ac febris rabida sive marasmodies; Marasmus enim absq; febre in decrepita aetate solet accidere, extincto nativo calore, & superveniente morte, quæ sine sensu doloris secundum naturam ex siccitate contingit: sicuti his, qui præ-

præter naturam tabescunt, altera advenit species, quæ Ex ægritudine senectus vocatur, in quam non solum senes, sed etiam pueros vidimus incidisse quamplurimos. Tabida verò febris non tantum sicca, sed calida est. i. de diff. febr. cap. 8.

Marcor, Marcor frigidus, torridus. Vide Febris marcida, & Ex ægritudine senectus.

Māris cæ, vênule sedū sunt, quæ aliquando foris extuberant ex ore hiantes, stato tempore sanguinem melancholicum excernunt: aliàs hemorrhoides dicuntur, quibus plus justo fluentibus, aqua inter cutem subsequitur, interdum delirescunt, & cœcæ cœcoppoides appellantur. Vide Sycosis.

Mārmārygas, i. e. oculorum hallucinationes. 3. de crisi. ii. cap. 7.

Māsseteres. Vide Mandibularii.

Mater dura, & pia. Vide Membrana dura.

Matrix, i. e. vulva, foris nervosa, intus carnosior, vas fœtus gestandi, à Græcis Hystera, quod omnium partium sit postrema, appellatur. lib. finit. med.

Maxillares dentes. Vide Dentes, Tomi, Incisorii.

Maxillæ sunt illæ faciei partes, quæ genis subjectæ ad inentum usq; descendunt, & hac in mucronem desinunt. lib. Introd.

Meatum, sive Porum simpliciter Herophilus appellat nervum opticum, qui à Cerebro ad oculum pertinet, sensibilis spiritus via, quod ejus solius foramen clarè cernitur. i. de sympt. caus. cap. 2.

Meatus auditorius est, qui in osse lapidoso est, satis involutus & anfractuosus, ne quid eorum, quæ extrinsecus incidunt, ipsi noceret, ipsasq; aures facile offenderet, proin-

in medio situs, extrinsecus quidem convexarum, intrinsecus autem cavarum. ii. de usu part. cap. 12. Constituitur autem in medio nervi quinta conjugationis, qui una cum duræ cerebri membrana, involucre velut suo, in auditus foramen incidit. Dicitur autem & hic meatus cœcum foramen, propterea quod anfractum illum, per quem nervus foras post aures excidit, haud possunt dissectiones perfecte perforare. lib. de nerv. diff. cap. 6. Vide Cœcum foramen.

Meatus genitalis est, qui genituram à testibus haustam, ad Colis radicem defert, qui juxta radicem vesicæ, varicosior conspicitur, unde ei nomen inditum est Varicosus alsitens. i. de sem. cap. 15.

Meatus varicosus. Vide Meatus genitalis.

Meconium, excrementum est, ex toto fœtus nutrimento, in utero, in urinaculo congeri solitum, toto uteri gestationis tempore. lib. Quod animal sit id. cap. 5. Est quoq; unniūvior, papaveris succus concretus, Græcis ὄνιον dictus. 3. simpl. 20.

Media, seu Mediana cubiti vena est, quæ communis est ei, quæ humeralis nominatur, & ei, quæ per axillam fertur. 3. de loc. aff. cap. 7. Dicitur aliàs purpurea, & nigra. lib. de anat. viv. Vide Communis vena.

Medianum, seu Mediastinum, sunt duæ membrana, utraq; parte, singula, totum thoracem suæq; roris, i. e. intersepientes, quæ posteriore parte spina, vertebri, anteriore verò, ossi medio pectoris insiguntur, sursumq; ad Clavæ, & deorsum ad ensiformem cartilagine[m] porriguntur, in duas partes totum thoracem dividentes, unde vulgò Mediastinum sive Medianum vocant; his enim mediis thorax dirimitur, 6. de usu part. & 5. de anat. admin.

qua membrana non aliter differunt, nisi quod in costis
transversis, i.e. succingentes appellantur; ubi verò recte
ad Claves feruntur, *Διαπεπταίνοντες*, i.e. intersepientes.
5. de anat. adm. Vide Diaphragmatones.

Medicari, generaliter loquendo idem est, quod me-
deri; propriè est idem quod purgare: neq. de omni me-
dicamenti exhibitione, sed de eorum tantum, qua purgant,
usu debito intelligitur. 2. de fract. 29.

Medicamentum, omne id dicimus, quod nostram na-
turam alterare potest. 1. simplic. 1.

Medulla spinalis, (sive Dorsi medulla, & Rachi-
tis, Græcè *σπίνα*, & vulgò Nucha nominatur) omni-
bus & singulis vertebri inexistens. 8. de usu part. cap. 4.
Cerebro, velut principio suo, continua, ejusdemq. cum eo
generis & natura, nisi quod ipso multò est durior & com-
pactior, potissimum in infernis spina finibus: eam tamen
perperam Medullam appellantur; cum medulla ipsa,
non modò spinali hac, verum etiam Cerebro ipso sit humi-
dior, mollior, & pinguior; quod verò in spina osibus conti-
neatur, coloremq. habeat medulla asinilem, ob id ipsam
medullam nominant; quo modo etiam quidam ipsam
Cerebrum vocitantur. 3. de alim. facult. cap. 10. Communi-
ter eam spinalem vocant medullam, additâ scilicet
medulla appellatione; interdum verò sine additione
simpliciter spinam nuncupant. 3. de loc. aff. cap. 10. Vide
Myelon.

Megalosphachnos, vocat Hippocrates non eos dun-
taxat, quibus ab ortu primo, magna & supra modum
aucta ipsa sunt viscera, sed quibus ea, ex affectu aliquo, in-
tumuerunt, sive scirrhum, sive phlegmonem, sive œdemā,
nacta sint. 3. acut. 9.

Me-

Melancholia morbus, est delirii species, ab humore
melancholico, (a quo etiam nomen sortitus est) in ipso Ce-
rebrī corpore p.n. contento, atq. id ipsum p.n. alterante,
concitata, qui ipse humor, si asseretur, Maniam facit, & su-
rorem. 3. de loc. aff. 7.

Melancholia flutuosa, sive hypochondriaca af-
fectio, morbus est, ex tertiâ melancholia specie, indican-
te nomine humorem, qui ipsius causa est. Cum circa
ventriculum prima inceperint accidentia, ipsisq. auctis
melancholica sequetur affectio, deinde alvi dejectione, vo-
mitu, probâ coctione, ructibusq. levatur is, qui laborat,
Hypochondriacum, flatuosumq. morbum ipsum nomina-
bimus. 3. de loc. aff. 7.

Melancholicam ecstasin, vocat Hippocrates mo-
tionem mentis, aberrationemq. vehementem & ferinam,
qua irrigante Cerebrum flavâ bile exusta & in nigram
permutatâ exoritur. 1. prorrh. 14.

Melancholicus humor duplex, alter propriè me-
lancholicus succus & sanguis dicitur, sex sanguinis cras-
sior, facibus vini haud absimilis, qui in terram effusus non
inducit fermentationem, nisi fortè in ardenti febre asseretur,
neq. ullius acidæ qualitatis est particeps, qui in meatibus
Cerebrī contentus, Comitialē morbum, in Corpore Ce-
rebrī, Melancholiā morbum generat. Vide Nigra bilis.
Altera Melancholia est tenuior, gustu acidā, terram ra-
di, attollit, fermentat; ampullasq. excitat, in specie attra-
bilis dicitur, quā præassata nascuntur, ferina deliramen-
ta cum & sine febre. 3. de loc. aff. cap. 7. & 2. de diff. febr. 9.

Meliceris, *μελικερὶς*, est apostematis species, humorem
melli similem membranâ conclusum habens, perinde ut
ἀδελιγμῶν, & *πυλινγῶν*, hoc quidem ab adipe, illud verò à

pulcrulâ intra membranam conclusâ nomen habet. Meliceride dissectâ, inibi contentus humor non aliter, quàm mel è favis, diffluit. Vide Atheromata.

Meliceratum, sive Aqua mulsa, aut Hydromel, est mellis & aqua compositio, vel ex aqua utriusq; portione, (ut viam urinæ paret, & ad distributionem agat,) vel alterâ alteram superante facta. 3. acut. 13. Licet quidam velint, uxiγαλov ἀπὸ τῆς ὕδατος εἶναι, & verustate differre, quod meliceratum sit Aqua mulsa subita & recens, h. e. ex tempore comparata; Hydromel autem inveterata, & recondita.

Melon, est tertius modus egresionis uveæ oculi, cùm tantum egreditur, ut palpebra minus pravealeant, & pilæ palpebrarum pungentes, clausis oculis, dolorem inferant. lib. de ocul. part. 4. cap. 11.

Membranam, Græci nunc ὑακίνα, nunc χιτῶνα, nunc ὑβρίνην vocant. Vide Tunica.

Membrana Adelon, quasi minus apparens, est quarta oculi tunica, à nonnullis inuenta, Amphiblestroidem tunicâ, quasi in summo excipiens, membrana minima simul & tenuissima, quam Hipp. non cognovit. lib. Introd. cap. 11.

Membrana dura, inviolata, crassa, cuticularis; Meninx dura, Mater dura, est, quæ calvaria ossibus ablatis, aut saltè apertis, Cerebrum in orbem contegens, primum apparet. Cui altera tenuis, mollisq; subnectitur, quæ pia mater nominatur, 9. de anat. admin. cap. 1. Utramq; Meningem vocant, solis Cerebri membranas nuncupatione hac reservatâ; tametsi Veteres, membranas omnes communiter, Meningas vocarent, Ibid. c. 2. quas etiam Vaginas vocant. 3. de artic. 33.

Membrana Pericardios, quæ & Tunica, & Do-

micio

micilium, & securum vallum, Theca item & Vagina, Capsula & Involucrum Cordis dicitur, est membrana, in cuius medio Cor est suspensum, quæ ex capite seu basi ipsius, ampla valdè exorta, post autem paulatim coarctat sese, eo planè modo, quo Cor ipsum, in quandam Coni acutiem desinit, ossi pectoris annexa, 16. de usu part. cap. 16. quæ Capsula Cordis, & Cordis Involucrum valdè appellatur.

Membrana Periostios, est involucrum tenue, & fibrosum, velut indumentum ossium, à natura conditum, lib. finit. med. ut per illud ossa sentiunt, generaleq; nomen est, quod pro varietate partium, specialia sortitur nomina: in Cranio enim πτερυγίον, in costis, ἀνέστωνος dicitur. Vide Periostios.

Membrana pinguis, i. e. Mesaraon, & Mesenterium. 10. meth. 8.

Membrana secundiformis. Vide Choroides.

Membrana Sigmoides, sunt tres illæ Cordis ventriculi dextri membrana, præpositæ venæ arteriosæ, à qua Pulmo alitur, intus foras spectantes, quas à figura literæ Σ Sigmoides appellarunt. 6. de usu part. cap. 14.

Membrana subcingentes, Vide Hypezochotes, Cingentes, Diaphragmantes, & Medianum sive Mediastinum.

Membrana Triglochina, sunt membrana in ventriculo Cordis sinistro, præfecta arteria venosa, (quæ in pulmonem distribuitur) foris intro pertinentes. Triglochinas appellarunt, non à figura aliqua, sed à mutua inter se ipsarum compositione, quæ cuspidum, telorum eminentiis, atq; angulis, quos glochinas vocant, penitus est similis. 6. de usu part. cap. 14.

Membra spiritalia sunt, Pulmo, Cor, Thorax, & duplex arteriarum genus, laxe & asperum. 7. de anat. adm. cap. 1.

Membrum simplex est, cujus quamcumque partem sensibilem assumeris, erit illa toti communis, in nomine, essentia & definitione, ut caro, & os. Illi oppositum est Membrum compositum. lib. de anat. vii.

Mendosæ costæ. Vide Illegitimæ.

Mendosæ futuræ. Vide Lepidoides.

Meninx, Græcè *μηνιγξ*. Vide Membrana dura.

Meningophylax, *μηνιγγοφύλαξ*, i.e. membrana custos, sic dicta, quod in curationibus capitis affectuum, meningas, ab injuriis, & graviore oblatione tueatur. Lamina anea est, firma, paulum resina, ab exteriori parte laxis, quâ Chirurghi, in vulneribus Capitis utuntur, quoties excidendum & attollendum est os, metusq; imminet, ne in ipso opere, Cerebri membrana negligentius, & ultra, quam res exposulat, premendo, ledatur & contundatur, ex quo sopores & graves inflammationes cum mortis periculo oriuntur. 4. de loc. aff. 2.

Menses, i.e. menstrua mulierum purgationes, quæ per uterum singulis mensibus fiunt, lib. de atra bile, cap. 8. quæ & muliebris fluxus, & uteri Rheuma appellatur, 3. de caus. sympt. c. 4. Unde menses moventia medicamenta sunt, quæ in pectus, aut fomentis, aut quovis alio modo vulvæ admota, non habent vim tam familiarium succorum attractricem, quam ut sanguinem extenuent, & mea tus uteri, obstructione liberent. 5. simpl. 20.

Mentagra. Vide Impetigo.

Menti eruptiones, sunt affectiones ulcerosæ & asperæ, in mento spontè nascentes: aliàs menti papulæ, & men-

mentagræ appellantur. 5. de compos. med. loc. c. 6. & c. 7.

Mentum, quod Græci *γένυον* dicunt, id omne est, quod labro inferiori oblongâ & orbiculari figurâ subjacet. lib. Introd. cap. 10.

Meri Arabibus, Gula Latinis, Græcis propriè *σισσιόα* & dicitur, & communiter *στόμαχ*; omni enim ventri, collum, instar Isthmi cujusdam, angustum præpositum, nominatur Stomachus. Meri autem communis quedam via est, quæ ab ore cibos & potum fert ad ventriculū, inter hunc, & fauces media. 4. de usu part. & 13. meth. c. 4.

Mesenterium, aut Mesaræon, utrumq; nomen ab accidentibus, naturali ipsius situ & peculiari substantiâ deductum; nam & medium inter intestina situm est, & omnes venas, ex jecore in ipsum descendentes (quæ ob id Meseraicæ dicuntur) vicinis arteriis, & nervis, quemadmodum etiam intestina singula, in orbem complectitur. 6. de anat. adm. cap. 6.

Mesenterii appendiculum, nominant illud unum Principium, in quo mesenterii venæ ac arteriæ (quæ veluti radices in arboribus, in concavam anfractuū partem, inferuntur) invicem coeunt, & in quo totum mesenterium cum intestinis continetur, ligamenti naturâ præditum, sursum tendens, adjacentes sibi habens venas, ad jecoris portas; arteriæ autem, ad eam spinæ partem, quæ in septum transversum & renes versum tendit. 6. de anat. adm. cap. 6.

Meseraicæ venæ. Vide Mesenterium.

Mesopleuria, i.e. intercostalia loca. lib. de musc. diff. cap. 23. Vide Intercostales musculi.

Metacarpium. Vide Brachiale.

Metalepticus, i.e. transsumptivus, vel translativus

motus, quem natura musculis quibusdam conciliavit. 7. de usu part. c. 14. Vide Transumptivus, & Euthyporos.

Metaprosis, transitus est, sive transmutatio, alicujus morbi, vel febris in aliam speciem: ut, si ex acuto fiat non acutus, tunc morbus acutus in tunc *μεταπρῶσις* fieri dicitur.

Metaphrenum, i.e. Dorsum, media est scapularum pars, cui stomachus intus subjacet: lib. Introd. cap. 10. cui Thorax configuratur, tanquam ad carinam navis. lib. Tegni, cap. 29. Vide Spina, Dorsum.

Metaporopœsis, est exiguorum meatuum statumque morbi mutatio, ad naturalem statum: idem plane significans, quod *μεταρροπῶσις*, à quo *μεταρροπῶσις* nihil differt. 14. meth. 4. Unde Metasyncriticum medicamentum, idem saepe quod anodynon, confirmatorium est, & persanat, lib. de Dynamid. in proem. & 7. de comp. med. per gen. cap. 11. ex alto quin & humores evocat & transfert. 1. de compos. loc. cap. 8.

Metasyncrasis. Vide Metaporopœsis.

Metastasis morbi proprie appellatur, cum ex parte una, in alteram, malum (morbus videlicet, causaque morbi) migrat: per abusionem, ipsius morbi solutio ita etiam nominatur. 5. aph. 7.

Metopon, *μετωπον*, pars faciei supra oculos sita, & ad tempora usque protensa, ex substantia muscosa, & osse subjecto constans. Aliis frons dicitur spatium inter supercilia & capillos inresectum, pilis nudum. Alii totum id spatium, quod ab oculis ad coronalem usque suturam extenditur, frontem & frontis os appellant.

Metrenchytæ, i.e. uteri clysteres, instrumentum est, per quod in uterum medicamenta immittimus; perinde ut Otrenchytæ, i.e. auricularii clysteres, per quos in aures

& Recti Syphones, alias Catheteras dicti, instrumenta sunt, quibus in vesicam aliquid infunditur. 5. meth. 11.

Methodica medicina est, quæ communitatibus, & similium speculationi unice intenta, omnes particulares affectus, ad generales duos, adstrictum, & fluentem, quas communitates vocant, reducit. lib. Introd. cap. 3.

Milphosis, *μυλφῶσις* idem est ac Madarosis, pilorum defluvium est ex palpebris, ab acri fluxione. Vide *μαδάρωσις*.

Mina Attica, & Aegyptia, habet uncias sexdecim, Romana uncias viginti. lib. de pond. & mens. cap. 3. Dicitur etiam Mina, Cordis capsula, & glandula. lib. de anat. viv.

Mochlia, traductio est osium ad naturalem locum, ab eo, qui præter naturam. lib. finit. med.

Modus morbi. Vide Morbi mos.

Mola, *μῶλα*, alias patella rotula, Græci *ἐντροχῆτις*, à figura similitudine, sic dictum est os latum & rotundum, tori genu suprapositum. Dicitur insuper Mola, caro informis, & inutilis, in muliebri utero concepta; quem conceptum inutilem, subdurus quoties fit, *μῶλον* sive *μῶλον* Græci appellant, i.e. scirrhum.

Molares dentes. Vide Dentes, & Tomi.

Mollicinum emplastrum. Vide Malthacode.

Mollientia medicamenta. Vide Malagmata.

Mollis pulsus est, in quo arteria quasi carnosior diutius contrectata apparet: durus, ubi siccior, rigidiorque, in modum Corii, l. de puls. ad Tyron. cap. 3. Mollitudo autem & durities, sunt tunica arteriarum qualitates. Ibid.

Mollities oculorum, (quæ & paralytis oculorum dicitur) morbus est, cum illorum voluntarius motus omni-

nd aufertur: quemadmodum cum minuitur, tremor & titillatio dicitur. Cum verò depravatur, ipsiusq; lacerti contorquentur, nec debere moventur, Spasmus nuncupatur. lib. de ocul. part. 4. cap. 7. Vide Paralysis.

Monoculum. Vide Cœcum intestinum.

Monohemera collyria sunt, quæ unius diei operâ, lippitudines apta sunt curare. 4. de comp. med. loc. c. 2.

Moram, i.e. Trivon, sive attritionem, Hippocrates appellat, callo obduratam sedem, quæ ex diuturna capitis brachii immolatione efficitur, in ea carnis circumjecta parte, in quam id primâ prolapsione incubuerat. 1. de artic. 21.

Morbidus rigor, corporis concussio est, sanis eveniens, à nulla exteriori causa violenta, sed ex ipsa dispositione corporis intus, in se, at cum aquâ frigidâ corpori assusâ rigor excitatur, non est morbidus rigor, uti cum ex ipsa corporis dispositione suscitatur. lib. de trem. conv. cap. 6.

Morbofum (μορβος) dicitur, ut corpus, ut causa, ut signum; nam corpora, quæ morbos continent; causæ, quæ eos efficiunt; & signa, quæ ipsos indicant, μορβος Græcis dicuntur. Gal. initio artis parva.

Morbus, νόσος, est dispositio præter naturam ladens operationes, 2. de cris. cap. 2. primò per se, & non per accidens, lib. de sympt. differ. cap. 1. Præter naturam, & contra naturam, idem sunt; utrumq; uno verbo παρὰ φύσιν Græci dicunt: nam & sævus Ictericorum color, & lentigo, & alius quivis etiam levissimus affectus, contra naturam est, nec tamen morbus dicitur, quando propter sui exiguitatem & obscuritatem summam, actionem non ladat.

Morbus Herculeus. Vide Comitialis.

Morbus magnus. Vide Comitialis.

Morbus puerilis, sive Comitialis affectus, ab infantem-

temperie cerebri f. b. iis provenit, quibus humidum natura est Cerebrum, teste Hipp. lib. de aere, aquâ & locis. ubi dicit, Pueris accidere convulsiones, & suspiria, quæ putant puerulum efficere, & sacrum morbum esse: ubi per puerulum, intelligit affectum comitalem. cœmm. 1. in 6. de morb. vulg. 5. Vide Comitialis.

Morbus regius, aliàs Arquatus, Aurigo, & Icteros dicitur, est bilis flava refusio in cutem & corporis superficiem, quæ proinde etiam hic tingitur, lutea q; sit: albæ quoq; ventris dejectiones sunt hoc morbo affectus. lib. finit. med. Vide Icteros.

Morbus sacer. Vide Comitialis.

Moria, & Morosis, sive fatuitas, Græcis μωρία, μωροῦς, est imminuta functio ratiocinatricis facultatis. de sympt. diff. cap. 3. Vide Fatuitas.

Mortifera facies est, de qua in Prognostico dixit, Naris acuta, oculi concavi, collapsa tempora. 3. acut. 54. Vide Facies Hippocratica.

Morbi mos, modus, cujus ratione morbus est benignus, vel malignus, tum ex propria sua specie, tum supervenientia propter symptomata. 1. de cris. cap. 3.

Moròs, μόρος, linamentum, seu linteam carptum, quod vulneribus, ulceribus, apertionibus corporis, seu siccum, seu medicamentis (quæ ob id ἐμώρως vocantur) oblitum, inditur; vel ad sistendum sanguinem, vel ad detergendum, siccandum, exedendum. Præterea moròs, linamenta vocant, & medicamenta, quibus foris impositis, vel eschara ulceribus inducitur, vel meatus obstruuntur, vel carnosæ partes, quæ circa ulcus sunt, exeduntur & consumuntur. 5. meth. 3. Vide Emmora.

Morùs naturalis, vel secundum naturam est, qui volun-

voluntatis imperium sequitur: sicuti qui involuntariè in corpore sunt præter naturam sunt. l. ad Thrasib. c. 26. Motus enim sensibiles, in animantium corporibus sanis duplices genere apparent; alii quidem ex arbitrio sanè, ac voluntate, ac impetu fientes, qui nervorum musculorumq; ministerio fiunt; atque hæc Medici voluntarias actiones appellare solent; alii motus Arteriarum & Cordis officio obeuntur, quos vitales nuncupant. Est & tertium quoddam motuum genus in venis, quod & naturale dicitur, & sensibus non percipitur. lib. de trem. & palp. cap. 2. Unde motus naturalis, & genus & species motus est. ibid.

Mox apparentia symptomata. Vide Absidentia, vel Absistentia.

Mucor. Vide Coxendix.

Mucosum humorem, appellare consuevit Hippocrates cum, qui lentore quodam, & albedine præditus, ad exangues partes, ossa scilicet & cartilagine, cogi consuevit, cum imbecilla ita Natura est, ut benè conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum quid relinquat: non secus atque in oculis membrana relinquunt & promunt de sese mucorem quandam, cum lippitudine laborant. Fit autem Natura imbecillior, aut ex propria intemperatura, aut ex multitudine humoris, qui ad partes confluit, ut in præternaturalibus tumoribus. 3. de artic. 65.

Mucro, est inferna Cordis pars, qua tantum protenditur, quantum Cordis magnitudo occupat spatium. 2. de placit. 4. Vide Basis Cordis.

Mucronata cartilago. Vide Cartilago ensiformis.

Mucus, mucor, est excrementum pituitosum, quod

à Cito

à Capite distillat, in gravedine Coryzæ, & aliis catarrhis. 2. de natur. fac. 9. Mucus sive Blena est crassior pituita. 2. de sem. c. 6. Mucum vocat Erasistr. phlegma frigidum & humidum albi coloris. 2. de natur. fac. 9. Hippoc. 4. de artic. 42. Vide Coxendix, Blena, Phlegma.

Muliebris fluxus, est humorum vitiosorum, ex toto corpore delatio & vacuatio per uterum ad multum tempus perdurans. lib. finit. med. Unde muliebria, sæpe notant menstruarum purgationum vacationem, qua per circuitum repetitur. 3. proorrh. 50. 5. aph. 28. Vide Menfes.

Mulsa. Vide Melicratum.

Multitudinis (qua & Plenitudo dicitur) nota sunt, vasorum distentio, gravitas universi corporis, pigris ad moriones & distentiones membrorum, ulceroſa & lassitudinaria sensio, vita prior in otio traducta, non sine ciborum ac potuum largiore ingestione, & solitarum excretionum suppressione. lib. de multitud. cap. 1. & lib. de cur. rat. per sang. c. 4. Est autem multitudo, omnium humorum æquabilis redundantia, vel solius sanguinis, qui interim non sincerus, sed cum aliis humoribus debita proportionem permixtus sit: cujusmodi exuperantia & excessus *ὑπερβολή* vocatur. Ea autem duplex est, una *πρὸς αἵμα*, vel, ut alii vocant, *κατὰ τὸ ἔχοντα*, i. e. quoad vasa, sive vasorum plenitudo, cum vena tunica, in tumorem impleta supra naturalem cuiq; modum se attollunt, iidemq; tensio accidit. lib. de multitud. c. 10. Altera *πρὸς τὸν αἵμα*, i. e. quoad vires, cum ægrī consueti tamen si saltē muna obeunt, sentiunt sese graves, pigros, segnes, atque ægrè mobiles. lib. de cur. rat. per sang. mif. cap. 4. Illa propriè Plethora dicitur, qualis athletarum est.

Musculi carnosī, sunt musculi recti, quibus nulla caro sub-

sub-

subest, unde ambientibus musculis candidiores sunt. *3. de anat. adm. cap. 7.*

Musculi cremasteres, i.e. suspensores, sunt duo graciles musculi, in utrumq; testem pervenientes, quorum alter à pubis, alter ab itum osse, per membranosum ligamentum tenuè exoritur, atq; illinc per meatum, qui ad testem devenit, perferuntur, & testem sursum atrollunt. *lib. de musc. diss. cap. 27.*

Musculi masticatorii. *Vide Mandibularii.*

Musculi Rhachyæ, i.e. spinales. *lib. de musc. diss. cap. 24.*

Musculi temporales. *Vide Croraphitæ, & Mandibularii.*

Musculus cuticulosus, vel carnosus cutis, quæ extremis cutis sedis partibus admiscetur. *lib. de muscul. diss. cap. 30.*

Musculus latus, *καὶ ὁ μὲν πλάγιος, ὁ δὲ ὀρθός.* *Vide Latus musculus.*

Musculus lacertus, *ἡ δὲ ὀρθὴ, ἡ δὲ πλάγια.* nervosum corpus est, ex permixta illi carne factum, ad partium corporis motum voluntarium. *lib. finit. med.* Estq; proprium instrumentum motus voluntarii in animalibus, *16. de usu part. cap. 2.* cuius substantia duobus constat, carne & fibris, positum simplicibus & secundum longitudinem ut plurimum exporrectis. Cujus tres sunt partes: caput, quod & principium appellant, in quod nervus & ligamentum inferi solent; venter carnosus magis, & musculum præcipue circumscribens; & finis, ex quo Tendo & Aponeurosis oritur, atq; in partes movendas inferitur. *1. de motu musc. & 12. de usu part.*

Musculus maximus, qui Ploa dicitur, est, qui ab

imæ regionibus exortum habens, ad humeri dearticulationem ascendit. *lib. de musc. diss. cap. 1. Vide Ploa.*

Mydefis, commune nomen est partium, quæ ex putrefactione corrumpuntur. *lib. Introd. cap. 15.*

Mydriasis dicitur, cum pupilla naturali suo colore conservatur, dilatatur magis quam natura poscit, ut Iridis circulo fiat proxima, & visioni noceat, & proinde est pupilla nimia dilatio. *3. merb. 2. & lib. Introd. cap. 15.*

Myelos, quasi medulla, *μύελος*, familiare ossis nutrimentum est, *2. de usu part. c. 16.* Substantia simplex est, humida, pinguis, alba, sensus expers, in cavissimum contenta, exanguis quidem, sed ex sanguine, in ipsas cavitates per venas illabente, ortum habens, quæ in Cerebro consistens, dicitur *μύελος ἐν ἐγκεφάλῳ*, i.e. medulla spinalis, vel *μύελος ὀστέου*, vel *μύελος ὀστέου*, vel *μύελος ὀστέου*, ad alterius differentiam.

Myla. *Vide Patella.*

Mylphæ, appellantur defluvia palpebrarum. *4. de comp. med. loc. 5.* Sunt quoq; pharmaca arida, quæ scabris palpebris conveniunt, & ad palpebrarum defluvia conducunt, & obtusè cernentibus, sive per aratem, sive ob crassitudinem frigiditatemq; humorum in oculis, aut deniq; propter statum redundantes, id accidat. *Ibid.*

Myocephalon, i.e. musca caput, est exigua uvea tunica porrectio, in nigro oculi, musca capiti similis, per ulcerationem facta, *lib. finit. med.* species est *τὸ ὄμμα ὀφθαλμοῦ*, i.e. procidentia oculi.

Myodes platysma. *Vide Latus musculus.*

Myopia, est affectio p.n. ab ortu contracta, quæ propinqua saltem cernimus, remota autè vel parum, vel omnino nihil. *lib. finit. med.* *μυωπία*, affectio, *μυωπία*, qui afficitur: differt

differt à Nyctalope, qui non naturâ, sed morbo talis evâsit. Vide Lusciolus.

Myracopa medicamenta (Græci μυράκωπα) sunt, quæ lasitudines tollunt, cum quadam odoris suavitate. 6. de comp. med. per gen. cap. 11.

Myrmecia, μυρμηκία ἢ ἀνιποχόρδιον, utrumq; malum, cutis est excresecientia callosa, & magnâ ex parte rotunda. Sed Myrmecia latiore basi & sesilis est, ac in scalpendo & attritu mordentis formica sensum efficit, ideoq; Latini Formica dicitur. Acrochordon autem basin angustiorē obtinet, ut chorda nexu suspensa esse videatur. Latini Verrucam vocant cum adjectione penilem, 2. meth. 2. quas Clavos, Callos, & Pylus vocant, quas tollunt à ceto acri maceratâ cortice arboris Itæa combustâ. 6. simplic. Vide Formica.

Myxis, i. e. meatuum conniventia. Vide Stegnosis.

Myurus pulsus, sive Soricis cauda, (qui soricis murisve caudam imitatur, quæ in acutum terminatur) est, cum e. g. secundus ictus primo est paulo minor, tertius secundo, quartus tertio, 1. de diff. puls. c. 11. & proin à figurâ, quæ in acutū terminant, nomen hoc Medici mutant. Ibid. Myuros pulsus vocant, qui ex magnis sunt minores, ex frequentibus rariores, ex celeribus tardiores. lib. finit. med. μυρμηκίων σφύγμων Græcè.

Myxa, μύξα, Latini Mucus, & Narium pituitæ pituirosus est de naribus stillans excrementum.

N.

NARCOTICA, sive Hypnotica, stupefacientia, somnifera, Græcè νάρκωτικά φάρμακα (Colica etiam, 5. de comp. med. loc. cap. 9. & lib. 7. cap. 5.) nuncupantur, h. e. somnum conciliantia medicamentis.

tempe-

temperiem sortita sunt, summè adversam iis, quæ sunt anodyna; refrigerant siquidem omnia corpus, & sensum eò usque obtupestiunt, ut, si paulo liberalius ebibantur, mortem asserant. 5. simpl. 19. Vide Anodyna, Colica, Hypnotica.

Nares, νῶτρες, propriè dicuntur concava nasi partes utring; posita, quæ meatum præbent spiritui & odoribus, licet quandoq; totus nasus νῶτρες à Medicis appelletur odoratus instrumentum: quippè si occlusis naribus, spiritum ore adducimus, odorem nullum sentimus; sin autem spiritum apertis naribus attrahimus, odor sensum protinùs movet: lib. de instr. odor. cap. 1. Nasus verò in se septum quoddam cartilagineum per media loca diductum habet, duosq; foramina satis conspicua, quæ propriissimè Nares dicuntur. Ibid. cap. 2.

Narium alæ. Vide Alæ narium.

Nasus. Vide Nares.

Nates, quas πύγες, & γλατὲς Græci vocant, sunt inferiores corporis partes postica, ad animalis facta quietem & sessionem, quam ob rem natibus carnosæ corpora substrata sunt, quarum gibba partes, quoddam orbiculares sunt, sphæromata, ceu modo orbium facta, Græcis appellantur. lib. introd. cap. 10.

Nates Cerebri. Vide Glutia.

Nativus calor, (quem & calidum innatū vocant, cuius vi omnia animantia vivunt & vigent) apud Galenum, est aut anima, aut primum & præcipuum animæ instrumentum, quo omnia, quæ sunt ad vitam necessaria, administrantur. Insi calor præsentia, vita est; ut absentia, mors; inequaliter in singulis corporis partibus dispersus; in Corde flagrantissimus, in Ventriculo & Præcordiis

Q

moderator; in Capite & Cerebro adhuc minor, in ossibus perexiguus; prout natura unicuique particula expedire & convenire adjudicavit. Hic fixus & in situs dicitur, h.e. à natura, in prima conformatione singulis partibus certâ mensurâ, & debitâ proportionem inditus. Cui calor fluens & adventitius opponitur, quem natura in Corde, tanquam in quodam penu, collocavit, unde per arterias cum spiritu & sanguine, vehiculis & pabulis velut suis, continenter depromitur, ferturq; in singulas partes, ut earum calorem nativum, fixum, insitumq; foveat, atq; instauraret. Idem ille calor influens, in merore, metu, verecundia initio, frigore, accessionum principii & somno, intro cum sanguine & spiritu ad Cor recurrit, & ob id talibus in affectibus & curis, & subditi illi partes frigent & pallent; contra in gaudio, & verecundia, jam vigente accessionum statu, ac vigiliâ, ac calor ad cutem copiosior effunditur, cum spiritu, & sanguine, & pronus calor, rubor, calor & nitor hic partibus inducitur.

Naturæ nomine, temperamentum intellexisse Hippocratem: idemq; esse precipuum, & maximè proprium Naturæ significatum, ab ipsa Natura substantiâ desumptum, cum sapissimè, cum libro toto de Natura humana, Galenus testatur, 3. aph. 2. ubi Naturarum has dicit ad astatem, has ad hyemem, malè benè se habere.

Naturalis motus. Vide Motus naturalis.

Naturales facultates, quæmodò duodecim, à Galeno in arte parvâ, distinguuntur in primas seu principes, & in secundarias sive ministras; primæ statuuntur tres, generatrix,eductrix, nutritrix. His omnibus singulis, alie quatuor interviunt, attractrix, retentrix, concoctrix, expultrix, quæ non in jectiore modo, sed in omnibus vel minimis

minimis corporis partibus, à primo statim ortu, insunt.

Naviforme os. Vide Scafoides.

Nausea. Vide Vomitus.

Nauseationes in venis, ναυσίωσες appellat Hippocrates, quas prius vocaverat exuccationes, h.e. sugillationes, cum vena (more eorum, qui nauseam patiuntur, & evomunt, sanguinem expuunt quasi & evomunt, cum ex propria imbecillitate virtutis retentricis, quam ex inflammatione multoties contraxerunt, cum ex ipsius sanguinis copiâ, & pravitate. 2. de fract. 24.

Nebulæ, Græcè νεφέλαι, sunt utriusq; oculi membranae tenues, & superficiariae albedines quasi & caligines; nam si crassiores sint & profundum petant, λευκώματα & albugines dicuntur. lib. de remed. par. fac. cap. 12.

Nephritis, affectus renum, sive ut similis sit, ut Intemperies; sive instrumentalis, ut Calculus; sive communis, ut Ulcus inflammatum; propriè tamen Lithialis, i.e. calculi morbus, Nephritis appellatur. lib. de ren. aff. dign. c. 2. Omnes verò homines, qui subindè difficulter mejunt, aut etiam suppressam omnindò urinam habent, ubi circa lumbos dolent, ac arenosa mejunt, nephriticos dicunt, quo calculo emicto, eorum protinus dolor, & urina suppressio desinit. 1. de placit. cap. 13. Undè nephriticas sive renales antidotos, & compositiones appellant, quas renibus affectis accommodant. 10. de comp. med. loc. cap. 1.

Nervum, quidam appellant omnia simularium corporum genera, in animalibus, quæ & ex sanguine sunt, & sensu carent, ut quæ ex ossibus oborta, ab Hippocrate Copula & Ligamenta vocantur. Insuper, quæ ex Cerebro & dorsali medulla prodeuntia, ab eodem propriè Nervi

& Tomi dicuntur. Deniq; ex musculus qui proveniunt, Tendones quoq; sic vocitant. Quidam igitur, omnia hac Nervos appellantes, primum ipsorum genus colligatorum esse ajunt; se undum autem sensibile, atq; electorium; tertium aponeurosin, h.e. nervorum propaginem, cognominant. com. 1. in 6. de morb. vulg. Nōq; autem dictum, & τὸ τῷ νότῳ, quod nutare & flectere significat, ut docet Galenus initio libri de motu musculi. Vide Tonos.

Nervum colligantem, Medici vocant νότον συνδεδεμένον, Hippocrates vocat ligamentum, seu συνδεσμός, Copulam, ex ossibus ortum ducit. Vide Nervum.

Nervi duri & molles, ejusdem quidem substantia, at non uniusmodi sunt usus: molles enim ad sensum, duri ad motum sunt destinati; non quidem, quod duri non sentiant, sed à duris hebetior & obtusior sit sensus, quam à mollibus. Mollium principium est Cerebrum; Duro-rum, spinalis medulla; ab hoc principio singuli, in suas sedes, à Natura mittuntur: molles quidem in organa sensuum; duri in musculos, dicunturq; molles, vel duri, sibi invicem simul, & ad Cerebrum collati.

Nervi optici seu visivi. Vide Nervi sensibiles.

Nervos sensibiles in genere vocant, qui ad sensuum instrumenta mittuntur. 7. de plac. 5. Proprie autem sensibiles vocant Nervos, sive Poros, nervos à Cerebro ad oculos descendentes, qui soli sunt conspicui & sensibiles via spiritus, 10. de usu part. 12. & proin eisdem Opticos vocant, 16. de usu part. 3. ab actione nomine deducto. lib. de nervor. diff. cap. 2.

Nervi vocales, sunt nervi gutturalis, qui ad instrumenta vocem concinnantia proprie pertinent; sic dicti, quod

quod iis vel incisis, vel laqueo interceptis, vox perire: non deferunt à nervis apud arterias existentibus, quos recurrentes nominant; ipsorum enim essentia pars sunt, & utriq; vocem efformant. 1. de loc. aff. 6.

Nervi voluntarii dicuntur, qui ex Cerebro, dorsiq; medullâ ortum ducunt: sicuti nervi, qui ex musculis, tendones; & qui ex ossibus proveniunt, ligamenta appellantur. lib. de ossib. in proem.

Nervus cavernosus. Vide Nervosum.

Nervi recurrentes, νότοι παλινδεσμούμενοι, sunt rami duri, nervorum sexta conjugationis, à Cerebro prodeuntiu, quorum dexter, circum arteriam, qua axillam adit; sinister verò, circum magnum arteria descendens truncum obvolutus, sursum revertitur. & recurrit quasi in laryngem, ad vocem efformandam: quare Galenus 4. de loc. aff. φωνητικός maluit appellare, i.e. vocales: ita enim sunt necessarii ad vocem, ut secti, vel intersepi, vocem prorsus aboleant; refrigerari verò, tantisper vocem impedian, donec calefacti, naturalem temperiem recuperaverint. 1. de loc. aff. 6.

Nervorum conjugatio dicitur, quoniam nervus non unus simplex, aut ἀπλῆς, à suo principio profisciscitur, sed omnes conjugati feruntur, ideoz, ab Anatomicis Nervorum paria appellantur, ac septem quidem paria à Cerebro, triginta verò à spinali medulla profisciscuntur.

Nervosum, νερῶδες, corpus est spermaticum, & exanguie, ad nervi naturam & similitudinem efformatum: licet enim Gal. tria nervorum genera dicat, initio lib. 15. de usu part. & comm. 1. in 6. τὸν ἐνδονεύον; præter illa tamen tria genera, sedes, uterus, vesica, & pudendum virile, nervosa dicuntur, cum tamen nullo prædictorum

generum contineantur, aut componantur; sed quodd nervosorum corporum similitudinem gerant; contrahi enim in angustum, & extendi in latum possunt: id quod corpori carnosum & pingui non convenit. Unde quidam Penem colem, nervum cavernosum appellant, ab eoq; penem & ipsum, totum cavernosum vocat, quodd arrigere, staccescere, item contrahi, extendiq; possit. com. i. in 6. de morb. vulg. 2.

Nervosæ discriminationes, sunt fines membranarum, quæ orificiis cordis adjacent. i. de placit. 10.

Nestes intestinum. Vide Entera, & Jejunum.

Neurotonus, dicitur is, qui in nervis vel tendonibus, sine discrimine, vulneratus est. 3. de comp. med. per gen. 2.

Neutrum corpus est, vel quod neutrius extrema dispositionis est particeps, vel quod utriusque, vel quod nunc hujus, nunc illius particeps, nunc salubre est, nunc insalubre. lib. de sect. cap. 6.

Nigra bilis, est humor melancholicus, qui, dum animal naturaliter se habet, quotidie gignitur, & proinde omnino alia est ab ea, quæ ex ustione ac velut assarione conflatur. 14. meth. 9.

Nigra vena. Vide Media, Communis.

Nigritia, & Nigror. Vide Contusio, & Effusa.

Nodi, quos Condylus Græci vocant, sunt extrema pars postbrachialis, à quibus digiti incipiunt. l. Inerod. c. 10.

Nomias, appellare Medicis mos est, putrescentia ulceræ, & non tñ vñdau, i. e. à pascendo, quodd putredo depascitur membra, & ad vicinas partes serpat, adeoq; una cum parte primum vitiatâ, & ipsas finitimas sedes corrumpat. 9. simplic. Vide Phagedænas.

Nothæ costæ. Vide Illegitimæ.

Nothon.

Nothon. Vide Tergum.

Notyæos myelos. Vide Myelos.

Nubis nomen, solent Medici, ab aère, ad urinas transferre, pro aliqua eorum, quæ in urinarum superficie pendunt, specie, aut evaporatione. Ut ergo in aère interim tempestas fit, ubi nubibus cōdensatus, ater & nubilosus dicitur, videnturq; nubes quædam per eum disjectæ, quo quidem tempore, nubium cernimus colorem, non exquisitè atrum, nec lucidum, sed inter hos medium; haud aliter nubes in urina, aliàs sublimamentum, ἰσχυρῶς πύλον, Latinis Nebula, Nubecula, nebulosæ suspensio, alba, nigra, media oritur ex evaporationibus, ad urina summam partem delatis. Ceterum, id omne crudum esse, & à flatuoso spiritu in altum efferri, Galenus docuit; quod verò perfecte concoctum, secretum, æquale & simile est, id certè, quoniam nihil flatu habet, in fundum vasis urinarii descendit, ac vocatur hypostasis.

Nucha, vulgò appellatur spinalis medulle initium, Græcè νωχία ἢ νωχίον. Vide Medulla spinalis.

Nutritum est, quicquid substantiam nostri corporis conservare & augere, & in eandem converti aptum est. 1. simplic. cap. 1.

Nutritio, est continuè effluentis substantiæ redintegratio; unumquodq; verò, eâ ipsâ substantiâ, quâ primum genitum est, ali etiam consuevit. i. de semin. cap. 16. Vide Prothelis. Vocatur autem omni illa alteratio, quæ alimenti in substantiam partis, quæ nutritur, transmutationem præcedit, concoctio; ubi verò jam parti apponitur, nutritio. 8. de comp. med. loc. cap. 6.

Nyctalops, νυκταλῶψ, lusciosus, ut est, qui die videri obtrusius, Sole occiduo acrius, nocte magis adhuc; vel con-

tra, die parum, vesperi aut nocte prorsus nihil, unde nocturna oculorum cœcitas appellatur. 2. meth. 4. l. de comp. med. loc. 3. & lib. Introd. Vide Luscius.

Nympha. Vide Colliculum.

O

OBAUDITUS, sive Obauditio, est vitiosa actio auditricis facultatis, proportionem respondentem vitioso visui veluti cum oculis, colore, figurâ, magnitudine, vel situ, mutata videntur: differt à Barycoia, quæ est audiendi difficultas, gravis auditus, seu diminuta audiendi actio: ut, surditas est ablata audiendi actio. Auferatur autem, minuitur, vel depravatur auditus, aut læsâ aliqua aurium particulâ, aut nervo, qui in hac à Cerebro pertingit, aut Cerebri eâ parte, quâ is nervus exoritur. l. de sympt. caus. cap. 3. 4. 5. Vide Barycoia.

Obliquatus pulsus est, qui oritur arteriâ non constitutâ in rectum: seu qui editur, cum arteria situs obliquus est. lib. finit. med.

Oblongum & depressum dicunt ossis caput, ad cervicem & sinum, cui inferitur, id ipsum referentes. lib. de ossib. in proem.

Obelæa futura, est cranii commissura recta, quæ à mediâ syncipitis futurâ, ad mediam suturam occipitis, secundum longitudinem extenditur. Græcis dicitur ὀβελία, ἢ παβελουδής, παφύ. Utrumq. nomen inditum est, quod veru aut sagitta, aut virga instar, rectâ incedit, Latini proinde rectam & sagittalem vocant. 9. de usu part. 17. & lib. de ossib. in proem.

Observatio, τῶνδεῖς, Empyricorum vox est, qui, quicquid observassent fieri in morbis, id ἀπορίσκειν, & quasi axioma nuncupabāt; ex quibus proximè artē constituiebāt.

Obstia

Obstipitas, est distortio spina, ad lateralem corporis partem, 3. de artic. 2. quam Scoliosis Græci vocant. Vide Cyphosis, κύρσις, Gibbus.

Obstructio. Vide Compressio.

Obstruentia corpora (Græcis ὀβυστήναι, generaliori nomine contrahentia, occludentia, & constringentia dicuntur) sunt, quæ ora vasorum occludunt, & sensibiles excretionem cohibent. Corpus enim stegnoticum, quod claudit, & continet in se, nec quicquam, quod sensu queat percipi, de sese emittit, Græcis ὀβυστήναι nuncupatur. Differunt à condensantibus, quod hæc poros & meatus corporis contrahant; Obstruentia autem & oppilantia, vasorum corpora claudant. 5. simpl. 14. Illa ὀβυστήναι; hæc ἀνυστήναι Græci vocant.

Obstupescencia est, cum ager humi jacens, nec dicit, nec agit quidquam, sed apertis oculis, quietus manet, similis iis, qui ex timore sunt attoniti. 7. aph. 14.

Occiput, ὀπίσθιον, ea est capitis pars, quæ à vertice, tanquam à centro circuli, unde capillorum proventus incipit, ad posteriorem Capitis partem, usq. ad Tendones, & Nucham descendit. lib. Introd. cap. 10.

Ochima τροφὴς, i. e. vehiculū nutrimenti, Hipp. vocat serosum recrementū, est aquosa & tenuis sanguinis humiditas, ad crassâ substantiâ chymi, per artas venas, in totū corpus ferendâ, à Naturâ comparata. 4. de usu part. 5.

Ochthode ulcera, i. e. verrucosa, quæ non maligna & contumacia sunt, sed solum labra callosa & dura habent. 4. de compos. med. per gen. cap. 5. Vide Dulcia ulcera.

Ocrea. Vide Tibia.

Odaxismus, ὀδᾶξιμός, est ille pruritus, qui conceptis jam intra gingivas dentibus, & erumpere festinantibus,

sentitur; quo solent infantes relatis ad os digitis, identidem eos mordere, & ipsi gingivas suas confricare. l. de nat. puer.

Odontalgia, i.e. dentium dolor. 2. meth. 2.

Odontoides. Vide Dentem.

Odontophylia, puerorum est dentitio, ubi scilicet & gingivis prorumpunt dentes.

Odoratum, Græcis ὀσφρηνός, nominant non solum odoris sensum, sed etiam vim ipsam, cujus odorandi officium est. lib. de instrum. odor. cap. 1.

Oedema, οἰδήμα, Hippocrati sunt, vel omnes præter naturam tumores, sive dolore caveant, durig, sint, quos sciurhos Græci appellat; sive dolore inferant, quos phlegmonas, i.e. inflammationes propriè vocat; sive absq; dolore laxi, atque molles sint, quos solos in specie οἰδηματά Græci nominant. comm. 1. in 6. de morb. vulg. 2. Et proin Oedema est tumor præter naturam, qui dolore caret, & digitis cedit: etsi aliquando apud Hippocratem, Oedema significet durum & dolentem tumorem. 1. progn. 29.

Oenodes vinum, i.e. vinum vinosum, quod multam sustinet aqua mistionem, & imbecilles vires ferit; aliàs Polyphorum, & multiferum appellatur, quod ut bene temperetur, multam exigit aquam. Contrario autem modo Oligophoron, sive pauciferum, quod ut bibatur, minimâ eget aqua mistione. 3. acut. 20. & 7. meth. 6. Vide Hydatodes.

Oesophagum, Veteres nominabant eam partem, quæ inter fauces, & os ventriculi superius, intermedia est; Aristoteles, & qui post ejus seculum scripserunt, Stomachum, nos Gulam appellamus: via est eorum, quæ cum devorantur, cum vomitione deiciuntur. 5. de loc. aff. cap. 5. Gula, Arabibus Mexi dicitur.

Oesy-

Oesyperus, i.e. lana succida, sive non lota. 14. meth. 7. Vide Lana succida.

Olecranos, quartus est musculus, qui per profunda adit cubitum, in medio gibberi interioris, inferiorisq; brachii. 3. de anat. adm. cap. 4. Ab hoc & Cubitus, & Cubiti os, Olecranos appellantur. Vide Ancon.

Oligophoron. Vide Oenodes.

Oligotrophia, i.e. parcior nutritio. 3. de sanit. tuend. cap. 8.

Omentum, ἐντὸν αὐτῶν ἢ ἐντὸν αὐτῶν, est corpus membranosum ex duplici peritoneo, seu plexu & adiposa substantiâ compositum, medium inter vasa, quæ in ipso continentur, quibusdâ autem multò infra quàm umbilicus consistit, quibusdâ ad pubis ossa descendit, cum in primum, seu ad Umbilicum, parva magnorum vasorum soboles, ex alto deferuntur, 6. de anat. adm. cap. 5. ex duabus tunicis densis, & subtilibus sibi incumbenibus, quàm plurimis arteriis & venis, & pinguedine non paucâ conflatum, gratiâ calefaciendi & ventriculum roborandi factum, 4. de usu part. 9. quod Epiploon, sive ἐντὸν αὐτῶν, Arabibus Zirbus, Antiquis Rete, quod ita adipe instructum Omentum, veri non sit absimile, indeq; & γάργυρον, σαρκώδην, pleriq; dicitur. lib. de nerv. & art. diss. cap. 1.

Omiæa vena, i.e. humeralis, ramus est vena cavæ claviculæ supergressæ, per omoplatam in brachium descendens; hanc Galenus interdum externam vocat, ad differentiam axillaris, quam internam nominat. Vide Humeraria.

Omotribes, sive Omphacinum oleum, i.e. crudum oleum, ex olivis immaturis expressum. 8. meth. 3.

Omoplatæ, (quæ & homoplatæ dicuntur, & Scoptulæ,

ptulæ, s. meth.) i.e. scapula, quæ humeri articulum constituunt; est enim in extremo scapularum insculpta capacitas, tantâ magnitudine, quanta ipsius brachii Capiti dearticulando, cui inferitur, esset aptissima. 13. de usu part. 10.

Omos, humerus, propriè dicitur id totum, quod in articulatione brachii, cum Omoplatâ apparet, adeoq; res verâ ipse articulus brachii cum Omoplatâ sic vocitatur.

Oncos, ὄγκος, apud Hippocratem idem est ac tumor, significat omne id, quod est supra naturalem constitutionem, incrementum. lib. de tumorib. cap. 1. Onchos verò & Poros, etiam quidam nostri corporis meatus vocant, i. simplic. cap. 1.

Oxyx, Græcis ὄξυς, idem quod πύλωρ, est puris collectio in nigro oculi, cum phlegmone, juxta Iridem. lib. finit. med.

Ophialis, est affectus capitis, quo capilli primum excrenuantur, deinde decidunt, in certis spatiis & capitis sedibus, in serpentis similitudinem. Idem cum Alopecia malum est, solâq; figurâ ab eo differt. Vide Calvities, & Madarolis.

Ophthalmia, lippitudo, frequentissima oculorum affectio, est inflammatio tunica seu pellicula, os capitis, & Calvariam ambientis, quam Membranam agnatam, adnatam, conjunctivam vocant, propterea, quod aliâ, quæ oculum ipsum constituunt, tunicis, forinsecus adnatâ sit; ligamentum in super totius oculi, ad circumscissâ ossis, & ob id omnia, quæ circum-circa oculos sita sunt, usq; ad malas, quandoq; in vehementi lippitudine atrollens & collicigans. 4. de compos. med. loc. cap. 2.

Opium, est papaveris lacryma & succus. 2. de antid. cap. 7. Unde opiata, medicamenta somnifera sunt, quibus opium admiscetur. Arabes vocant Allabiar.

Opi

Opisthotonos. Vide Distentio.

Opopanacem, vocant Panacis guttam & liquorem. 3. de comp. med. per gen. cap. 5.

Oppilatio. Vide Compresio, & Obstruentia.

Optici nervi, sunt primum nervorum par, quod cum troch. Cerebri panniculo, ad oculos descendit, iidemq; visibilem spiritum adducit. lib. de ocul. par. 2. cap. 3. Vide Nervos sensibiles.

Ordinatus pulsus est, quando ictus, pari semper numero, paribus partibus, statim procedunt circuitibus. lib. de puls. ad Tyron. cap. 6.

Orexis, ὀρεξις, appetitus, sive appetentia, est concupiscentia cibi & potus. Hipp. lib. 2. de mor. h. e. famem appellat, cum air: Famem meri potione solvi.

Oricularia. Vide Laminas.

Oroboides urina, quæ habet hypostasim similem orobis, eaq; fit à colliquatione & dissolutione carnis. lib. de urinâ, cap. 26.

Oros, dicitur à quibusdam τὸ ὀρόν, h. e. pars tota pedis superior, quam alii ποδὸς ὀρόν appellant, i. e. multorum ossium. Orros verò τὸν serum lactis significat, tum Perinæon, tum etiam sacri ossis extremum, ad caudam usq; protentum. Vide Gal. 1. 3. de usu part. c. 7.

Orthocolon, ὀρθόκονον, quasi rectus articulus, est articuli virium, quando ob durum aliquem tumorem, musculi partem aliquam insectentes, non sequuntur, sed perpetuo articulus tenditur, neq; insecti potest. 3. de art.

Orthopnce, ὀρθόπνοια, quasi recta spiratio dixeris, est magna spirandi difficultas, quæ non aliter fieri potest, quam erecta cervice, & thorace elato quod in quoq; accidit, qui velociter cucurrerunt: qui sic affecti, dicuntur ὀρθό-

ἰσχυροῦς. Idem malum ab alio symptomate, Asthma nuncupatur, à viscosis, & crassis humoribus, circa asperas in pulmone arterias, sine febre congregatis. 1. de difficult. respir. c. 11. & consil. 4. in 6. de morb. vulg. 4. Vide Anhelosi.

Os, ὀστέον, duobus modis dicitur: primum, quantum diducta labra patent; secundo & propriè, totum id spacium, quod dictis labris, ad imas usq; fauces interjacet, in quo dentes, palatum, lingua, gurgulio, & tonsillae duae continentur, quarum omnium partium, una tunica est, etiam naribus communis, à peritoneo prognata. 3. de usu part. cap. 5.

Ossa, ὀστέα, partes humani corporis durissima, siccissima, maximeq; terrestres & frigida sunt, quae sese mutuo, & alias partes omnes, tanquam fundamenta sustinent, & firmant, atq; ad universam corporis substantiam sustentandam & gestandam facta, quibus proin omnia adnascuntur, & stabiliantur. lib. de ossib. in proem.

Ossa alata. Vide Pterigodes.

Os Ballistae. Vide Astragalus.

Ossa cavernosa. Vide Ossa Ichmoidea.

Os cartilagineum (aut, sicut alijs placet, cartilago ossea) est, quod ad caput Cordis invenitur, ad quod omnium ipsius ligamentorum principia adaptantur. 7. de anat. adm.

Ossa colatoria, sive Colo similia. Vide Ossa Ichmoidea.

Os cubiforme. Vide Os Cyboides.

Os Cyboides, i. e. cubiforme, est, quod ab externis Tarsis partibus locarum, firmum in terra statuitur, & dearticulatur cavitati calcanei, ad finem adjacenti. 1. 3. de usu part. cap. 7. & 8.

Ossa

Ossa foraminulenta. Vide Ossa Ichmoidea.

Os frontis, quod vulgus Coronale vocat. Vide Coronale os.

Os humeri, quod Arabes Os adjutorii vocant. Vide Adjutorii os.

Ossa Ichmoidea, sunt ossa foraminulenta, & cavernosa, ad radicem & principium narium in meatu olfactorio posita, quae Natura variè pertusa velut spongiam & cribrum formavit; ne aliud corpus durum extrinsecus in illa incidat, insuper, ne viribus integrus aer frigidus inspiratus, rectè in Cerebri ventriculos sese insinuet; quin &, ut vapor odorem secum ferens, per ea foramina à Cerebro recipiatur, simul &, ut Cerebri vacuare posset se ab excrementis; haec quoniam ad Cribrum & Spongiam similitudinem perforata sunt, Ichmoidea, & Spongioidea proin dicuntur. 8. de usu part. cap. 6. & 7. de loc. aff. 10. Colatoria ad haec vel colo similia vocant, quod per illa crassum Cerebri excrementum purgetur & percoletur; sicuti viscosissima tenuiora excrementa, vaporis similia, in sublime lata per calvariae suturas excernuntur; crassiora autem prona feruntur, quorum altera pars in eas vias, quae ad os pertinent, influit, & per secretum ejicitur; altera, quae mucus dicitur, in nares, & per efflatum vehementem excernitur. lib. de instr. odor. cap. 2.

Os jugale. Vide Zygoma.

Os latum. Vide Spina.

Os magnum. Vide Spina.

Os naviforme. Vide Os scaphoides.

Os palati. Vide Sphenoides os.

Os petrosum, ἰσοειδὲς ὀστέον, sic dicitur pars ossis temporalis, protensis sutura lambdoidea sinibus terminata: sic

sic dicta, quoddam petra, vel rupi, duritie & soliditate sua, videatur similis.

Os sacrum, ὀστέον ἱερόν, duobus modis sumitur: primum latius, ut Coccygem etiam comprehendat, ut 12. de usu part. scribit, Os sacrum constare ossibus quatuor, tribus scilicet propriis, & Coccyge; hac enim ossa sibi unita per symphysin, efficiunt unum os, quod parte superna vocatur lacrum, inferna Coccyx. Deinde, sumitur pro ea tantum parte, quae revera sacra, i.e. magna & lata est, quae parte hoc os, cum osse ilio per synarthrosin jungitur, tunc ejus reliquum graulefcens semper ac tenuatum, in tres cartilagine acutissimas, quas Coccygem vocant, desinit. lib. de ossib. cap. 12. & 3. de artic. 10.4.

Os scaphoides. Vide Scaphoides os.

Ossa spongoidea. Vide Ossa Ithmoidea.

Oscitatio, & Pandiculatio, sunt mediocres motus virtutis expultricis Cerebri, 2. de sympt. caus. cap. 6. per quos contenta in musculis humida, flatulenta, spiritusque, flatuosi, expurgantur. 7. aph. 56. Per Oscitationem tale quid solis maxilla inferioris musculis accidit, quale in Pandiculatione in omnibus musculis symptoma est; utraq. enim evacuandorum in musculis halitusosorum excrementorum causa sit. comm. 1. in 6. de morb. vulg. 4. & 7. aph. 56. Quaeque illa; haec onogoliva Graece.

Osculorum apertio, Anastomosis, & ἰσχυρὰ ὁμιλία, fit cum in arteriis & venis per resudantiam; cum in ulceribus & vulneribus, quae sinuosa sunt, fistulosa, & angustiorificii, cum scilicet haec debescunt. 6. de comp. med. loc. 6. 2.

Ostocopi, i.e. ossium dolores, nominantur excitati, ob affectas membranas, quae ossibus adjacent, dolores & profundi, (i.e. in intimo corpore sentiri soliti.) & ossium ipso-

ipsum veluti dolentium inducentes imaginem, magnam ex parte ab exercitationibus evenire solent, interdum etiam a frigore, & plenitudine, quin & ab humorum cacoethia in lue Venerea. 2. de loc. aff. 8.

Ostracoderma, animal omne est, cui pro cute, testa est. lib. 1. de aliment. fac. 1.

Ostraga, instrumenti genus est, quo in ossium fracturis, collisionibus, & comminutionibus utimur. 6. meth. 6.

Otalgia, aurium dolor est, is cumprimis, qui ad profundum auditorii meatum pertinet. 2. meth. 2.

Otrenchyta, instrumenta sunt Chirurgica, quibus aliquid in aures infunditur. Aurifusoria specilla ab aliis quibus, a Celso strigiles, alias auriculares clysteres appellantur.

Oxelæum, i.e. compositio ex aceto, & oleo. 1. de compos. med. per gen. cap. 7.

Oxycratum, i.e. compositio ex aqua, & aceto. 1. simpl. 29.

Oxydercica facultas est, quae oculos, (ubi nullum insit illis sensibile pathema) male munere suo fungentes, corrigit & in integrum restituit, ac nimirum & in auribus & naribus, aliisque sensorii cunctis id ipsum praestat, & proin in auribus e.g. oxycos dicitur. 5. simplic. 23.

Oxygalax, i.e. acidum lac. 3. de aliment. 16.

Oxymel, non ex aceri mellis, mixture tantum compositio est, verum ex mulla paululum aceti accipiente. 3. acut. 24. & 4. de sanit. tuend. cap. 6.

Oxyregmia, i.e. acidus ructus, qui sine aliqua pituita, quandoque in ventriculo frigidior, & in quibusdam levicibus intestinorum, ex frigidityte ortum habentibus fit. 6. aph. 1.

Oxyrhodinum, quod & Rhodinum dicunt, est frontis linimentum, ex aceto, oleo, & rosacea placent à capiti phreniticorum, aut quacumq; intemperie calida laborantium, permixtum. 13. meth. 21.

Oxys, i.e. acutus, à quo οξύς πυγίλοι, οξύς νόστος, & οξύ νόστος dictum. Consistit autem acuti morbi essentia, non in celeri tantum motu, sed cumprimis in magnitudine & periculo. 2. aph. 23.

Ozæna, est ulceratio in naribus profunda, terri odoris halitus emittens. lib. finit. med. & 3. de comp. med. lor. cap. 3. Unde Ozæna ex ulcerum genere est, eoq; a Polypo differt, quippe qui in tumorum tantum genere est, non ulcerum; nascitur ex influxu humorum acrim, à Cerebro in nares facto, unde vel earum ala, vel interstitium, vel alia ipsarum partes exulcerantur.

P

PÆDOTROPICA, est Medicina pars, de puerorum sanitate, & regimine. lib. de part. art. med. c. 5.

Palatum, partem illam in ore altioris sedis cavam vocant, qua super foramina è naribus in ipsum pertinentia, sublinis est. com. 1. in 6. de morb. vulg. 3.

Palati os. Vide Basis Cerebri.

Palimuolus homo, dolosus est, qui aliud loquitur, aliud sentit, & qui facile sententiam mutat: ejusmodi quoq; morbus appellatur, qui speciem quidem & spem facit levationis, sed tamen intrinsecus malignus est. com. 1. in 6. de morb. vulg. 6.

Pallida bilis. Vide Bilis pallida, & amara.

Palma, est ea pars manus, qua Metacarpium, & Postbrachiale dicitur. 1. de musc. diff. cap. 21.

Palmos, Vide Palpitatio.

Pal-

Palpitatio, alias Subfultio, Græcis παλῦσις, similiter atq; tremor, motus est, quo partes palpitantes, citra & præter voluntatem nostram, nobis invito attolluntur, & deorsum aguntur, à crasso & vaporoso spiritu, quærente exitum. Differt verò palpitatio à tremore, quod nemo, qui artus movere non instituerit, tremat; palpitantes autem particula, etiamsi in quiete fuerint, nullusq; illis motus sit inducitur, palpitent: etenim supercilium palpebræ & oculus subinde citra omnem voluntatem attolluntur; tremor autem totius & integri membri motus est, ut totius manus, brachii, capitis; palpitat verò pars membri, ut vel sola cutis, vel sola arteria, ut censebat Praxagoras, vel solus musculus, ut Herophilus. Ad-hæc, quæ tremunt, eorum mutant locum; quæ autem palpitant partes, eundem obtinent, sed modò ampliorem, modò minorem; in se ipsas enim concidunt partes palpitantes, dum contrahuntur; aliò autem moventur, quæ tremunt. lib. de trem. & palp. cap. 4. & 5. Præterea, Palpitatio est contractio quedam præter naturam, in illis corporis partibus, in quibus ob substantia ipsarum mollitiem, distensio, dilatio, & contractio accidere potest. 2. de sympt. caus. cap. 2. Non enim os vel cartilago palpitant, quod dilatari non possint. Deniq; Palpitatio motus est toto genere præter naturam, Tremor autem, mixtus, ex motu secundum naturam, membrum movente, & motu præter naturam, virtutem ad violenter movendum proripiente & cogente. 2. de sympt. caus. cap. 2.

Palpebræ, sunt externa oculi partes, supercilium subiacentes, supernè, infernèq; interiores oculi tunicas contingentes: hæc inferior; illa superior dicitur. lib. introd. c. 10.

Pancoenus. Vide Endemus.

Pancratrium. Vide Pancreas.

Pancreas, Pancreon, Calicreas, & Calicreoti, corpus glandulosum, vel caro glandulosa est, in medio mesenterio sita, quam Natura quatuor vasis, vena, arteria, nervo, & vesica bilis, in orbem substravit; divisionesq; illarum muras replevit, ne ullum ipsorum facile scindatur, propter vehementem motum, sed molli cedente corpore, conquiescat. 5. de usu part. cap. 2. Hoc corpus vocatur etiam Pancratrium. 1. de motu muscul. 6. & lib. de ven. & art. diff. cap. 1.

Pancreon. Vide Pancreas.

Pandemus. Vide Endemus.

Pandiculatio. Vide Oscitatio.

Panus, i.e. tuberculum immaturum, quod aliquando & magnum, & durum, & diuturnū exoritur: 3. de art. 2. est tumor, non altus, sed latus, in quo quoddam pustule simile, panis similitudinem habens, inest: hinc Latini Panum appellant. Vide Phygethlon.

Papilla mammae, i.e. extremum mammae mulieris, quod ori infantis inditur. 15. de usu part. cap. 7.

Papula, nomen est, id, quae sponte exuberant in cute, exanthematibus conveniens, quae superfluis constant humoribus, atq; qualitatem illorum etiam non injuriā subsequuntur: cum tenuis humores sunt, exulcerationem potius, quam tumores creant; at crassi, in tumorem curim accollunt. com. 3. in 3. de morb. vulg. 51.

Paracentesis, i.e. punctio & apertio abdominis circa umbilicum, quae Hydropibus, & Herniosis adhibetur, ad aquam evocandum. 14. meth. 13. & 6. aph. 27.

Paracastica. Vide Continua.

Paracynanche. Vide Cynanche.

Para-

Paralysis, (quae & Paresis à recentioribus Medicis dicitur) est nervorum resolutio, cum nervi & partes corporis, omnino sensus & motus expertes sunt. 1. de sympr. caus. cap. 5. Fit, cum humorum multitudo indissolubiter in aliqua corporis parte, non principe, impacta fuerit, ut & Epilepsia, & Apoplexia partis dici possit. 4. acut. 27. Exquisita autem paralysis est, in qua nervi, & membra sentientia, omnino sensum & motum perdidērunt; imperfecta, in qua motus quidem perit, servato sensu; imperfectior, in qua incolumi motu, sensus aboletur: est enim paralysis motus potius, quam sensus affectio; quae si fiat in universo corpore, Apoplexia potius dicenda est, quam vera paralysis. Accidit insuper Paralysis oculis; ubi & mollities dicitur, cum oculus vel motu, vel visu, vel utroq; privatur, laeso vel Cerebro, vel nervo concavo, vel spiritu visibili. lib. de ocul. par. 4. cap. 13. Est insuper Paralysis imaginatricis facultatis affectio, qualis & Caros, & Catalepsis nominatur. 1. de sympr. differ. cap. 3. Vide Resolutio.

Paramelus digitus, i.e. digitus annularis. lib. de muscul. diff. cap. 22.

Paraphrosyne, pravus est erransq; motus virtutis imaginatricis Cerebri, qui delirium dicitur. 1. de sympr. differ. cap. 3. Differt verò ab Aneia, & Amentia, quod illa sit imaginatricis aut ratiocinatricis depravatus vel diminutus motus; haec verò earundem facultatum paralysis existat & resolutio.

Paraphimosis, vitium est Phimosi contrarium, cum videlicet ea, quae naturales meatus concludunt, opercula & regumenta ita diducta sunt, ut reduci nequeant: proprie dicitur de preputio retrorsum adducto, ut glandem tege-

R

re nequeat; quod malum ex nervi contractione maxime contingit, fit & ex immodica praputii siccitate. Ei contrarium visum Phimosi appellatur. lib. finit. med.

Paraplegia, sive *ἡμιπληγία*, est plerarumq; alterutro in latere corporis partium immobilitas, sensusq; privatio, quam etiam Apoplexiam vocat Hipp. com. 2. in 1. prorrh. 50. quod utraq; à frigidis & pituitosis fiat humoribus. Paraplegia, affectio unius partis corporis talis est, qualis Paraplexia totius. com. 3. in 1. prorrh. 26. Apoplexia, in partium resolutionem qua finit, Paraplexia appellatur, 4. acut. 27. & com. 2. in 1. de morb. vulg. 59. Apoplexia, à paraplexia, ut à toto, pars, differt; Apoplectici namq; prorsus & paraplectici sunt; Paraplectici vero, non omnino & Apoplectici. Adde, sanos mente, paraplecticos, resolutos parte unâ corporis, dextrâ, vel sinistrâ, Apoplecticos & mente, & toto corpore resolutos esse constat. lib. finit. med.

Pararhythmus pulsus est, qui (cùm quæq; atas proprium pulsum agnoscat) non convenit illi atati, in qua est ille pulsus, sed alterius proximioris: quemadmodum heterorhythmus pulsum vocamus, qui alterius atatis habet rhythmum. lib. finit. med.

Paratosis, est depravata visus actio, cùm oculis, colore, figurâ, magnitudine, vel situ, mutata videntur: veluti Amblyopia est diminuta actio visus, & cæcitas, visioq; ablata. 1. de sympt. caus. cap. 5.

Parastatæ, aut feminarii meatus, Latini astites nominantur, sunt, qui ex vena & arteria constant, in unam naturam confertis, semen confoventes, & perscipientes. lib. finit. med. Vide Glandulosi assistentes.

Parasyranche. Vide Cynauche.

Par-

Paregorica, i.e. mitigatoria medicamenta, qua non sanant, sed mitigant, ne malum crescat. lib. de Dynamid. in proem.

Paremprosis, quam & Periptosis, h.e. incidentiam & casum vocat, lib. 3. nat. à yévo, est intercidentia, sive coincidentia; cùm E. G. ea plenitudo, qua ex ingestione eorum, qua comeduntur, & bibuntur, in venis gignitur, à venis in arterias delabatur. lib. de caus. procatart. c. 3. Atq; universim paremprosis est, quando aliunde in aliud vas humor influit. 7. de anat. admin. cap. 16. Speciatim, transsumptio spirituum, ex arteriis, in venas, paremprosis dicitur. 1. de vena sect. contra Erasistr. c. 2. Vide Coincidentia.

Parencephalis, i.e. Cerebellum, & Encranion, est posterius Cerebrum, quod à priori & anteriori (propter sui magnitudinem) nomen totius sibi vindicare, crasse meningis duplicatione est diremptum. 8. de usu part. c. 1. Vide Cerebrum.

Parenchymata, Græci vocant carneam illam substantiam, qua inter vasorum interapedines recipitur, 7. de anat. adm. cap. 5. ut qua in Visceribus, in Jecinore, Renibus, Liene, & Pulmone visitur: quam substantiam Galepus non vult vocari carnem; ea enim solum caro dicitur, qua in musculo est; reliquarum nullam homines carnem vocant, præterquam admodum pauci: sed qua in visceribus, seu Jecinore, Renibus, Liene & Pulmone visuntur, eas parenchymata (quasi effusiones dixeris) Græci vocant; qua verò in Intestinis, Ventriculo, Stomacho, & Utero sunt, sine nomine relinquunt. 10. meth. 11.

Paresis, idem quod paralytis, i.e. resolutio. Vide Paralytis. Proprie contractio artuum, in quam passio colica terminatur.

Parietalia. Vide Bregmata.

Paristhmia, παριστάλα, Tōssilas, & amygdalas vocant, sunt locorum ad Isthmum (i.e. eam oris regionem, quæ os & gulam interjacet) attinentium inflammationes. 3. aph. 26. Paristhmia, Tonsillæ, & Uvæ, nihil aliud sunt, quàm inflammationes; Uvæ quidem, Gargareon; Tonsillæ verò, adenum, qui in principio faucium inter se oppositi sunt; Paristhmia, corporum eorum, quæ in faucibus continentur. lib. de tumor. cap. 17. Hoc ipso nomine non solum inflammationem, sed etiam faucium partem prædictam nominant Græci, quod locus ille, cui adjacent, Isthmus quæpiam velut angustus est, quum inflammatione tumet, & multo quàm antea angustior fiat.

Parocheteusis, Latinis derivatio, est, cum sanguis avertitur, atq; ad alia membra proximiora conversus, derivatur: si verò sanguis ad contraria revellatur, Antispasmi Græci, Latini Revulsionem vocant. 5. meth. 2.

Paronychia, abscessus est, qui ad latera unguium enascitur, 8. de comp. med. loc. cap. 2. quem Arabes Panaritium vocant, Latini Reduvias.

Parotides. Vide Eparmata.

Paroxysmus. Vide Accessio.

Partes inanes corporis sunt, quæcumq; inter extremam thoracis costâ, & femoris ossa continentur. 2. progn. 1.

Partus, τόνος, actio est partim uteri ipsius, adaucti fœtus gravitate, & excrementorum redundantia onerati & distenti, vi propriâ expultrice fœtum ejicientis; partim ejusdem fœtus grandioris effecti, & majori alimento, quàm quod in utero recipere possit, indigentis, atq; ex uteri angustia, adaucto nativo calore, ad suffocationis imminentis periculum averfandum festinantis, & (quum non suffi-

sufficiat illi amplius spiritus maternus, quem illa per arterias subministrat) ad exitum repente concitati.

Parulides. Vide Epiludes.

Parygron, i.e. humidum, seu liquidum medicamentum, quod medetur particula, parvâ adhuc phlegmone, conflanti, huic protinus impositum, ubi duritiem à dolore alienam pars affecta acquisierit; quemadmodum etiam, si phlegmonoso affectu omnino sit libera. 7. de comp. med. per gen. cap. 2.

Palsio, παλός, πάλη, generaliter quidem dicitur omnis motus, qui ab altero in alterum fit, sive secundum naturam fiat, sive præter naturam, quâ parte ab altero recipitur: hinc Visio, Auditio, Calefactio, Frigefactio, Humectatio, Delectatio, Dolere, Gaudere, Tristari, palsiones dicuntur, quorum essentia in fieri est, cum motus sint, cujus nulla sunt partes permanentes, sed dum sunt, solum sunt, solumq; in fieri & mutari essentiam suam habent: cum autem motus desit, non affectio aut palsio, sed affectum esse & passum dicitur, Græcis διαβόσις. Speciatim verò non solum, dum fit alteratio, palsio dicitur, sed dum facta est, & quæ motu absoluto superstes adhuc est, παλός appellatur; ut, ex vulnere cæcitas, ex contusione nigror, ex febre tabes; ex continuis vigiliis sapientia. Tertio, specialius adhuc non modò palsio, quæ fit, nec quæ facta est, sed quæ est præter naturam tantum facta affectio, Palsio vocatur, ut, ex vulnere cæcitas: quâ significatio, morbi, & Symptomata, à Medicis palsiones dicuntur. Vide Affectus, & Symptoma.

Pastilli, Græcis τροχίσκος, seu rotulæ & orbiculi, à figurâ sic dicuntur, medicamenta plana, in rotâ aut circuli formam coacta. 5. de med. per gen. 11. & 1. de anrid. cap. 9.

Pastio, i.e. *ulcus depascens*. 5. de med. per gen. cap. 3.

Patella, est os cartilagineum, & rotundum, gibbum, quâ femur Tibiæ connectitur; aliâs *Mola* dicitur, lib. de osib. 23. quin & *Rorula*, *Myla*, & *Epigonatis*, i.e. supergenualis appellatur. 3. de usu part. cap. 15.

Pathema, i.e. *passio*. Vide *Affectus*, *Passio*, & *Symptoma*.

Pathognomonica syndrome, i.e. *concurfus symptomatum*, *affectus p.n. index*. 1. de loc. aff. 1. Pathognomonica autem signa sunt, quæ & *homoidea*, & *homogenea*, ejusdem speciei, vel generis dicta, in una aliqua sola sunt affectione, & perpetuò soli illi insunt, tanquam soli propria, & inseparabilia, veluti quæ per spem excernuntur, affectionis tum pulmonum, tum thoracis, tum aspera arteria, tum gutturis, & tandem respirationis subservientium instrumentorum, signa sunt, quæ & in Respiratione, vitium per se & primum contraxerunt, non per consensum: atq; hæc signa sunt certissima, non autem ea, quæ perpetuò, sed non soli insunt, vel soli, sed non perpetuò. com. 1. in 1. prorrh. 2. Vide *Alsidentia*.

Pathologica, sive *Aetiologica*, *Medicina* pars est, quæ causas & symptomata, & morbos inquirat. Vide *Aetiologica*.

Pauciferum vinum. Vide *Oenodes*.

Pechys. Vide *Cubitus*.

Pechis, πῆξις, *Congelatio*, idem quod ἀσθένεια, h.e. *firmitas*, *stabilitas*, *fixio*; quum verò illa, quæ frigore concrevunt & congelant, firma quoq; fiant ac stabilia, ob id malum hoc (ubi corporis partes præ frigore rigent, adeoque stabiles sint) πῆξις, i.e. *congelatio* dicitur.

Pecten, est sinus ipse, quo muliebri pudendum clauditur.

tur. lib. Introd. cap. 10. Est adhuc *pecten*, ea plantæ pedis pars, quâ terram contingimus, & quæ post concavum ad digitos assurgit. Dicitur & *Pecten*, pars manûs, undè digiti procedunt. Ibid.

Pectorale os, medio pectore situm, costis utriusq; alligatum est; constat autem septem parvis osibus, per synarthrosin colligatis, quibus singulis singula costa connuntur; quæ tota pectoralis osis figura à nonnullis, quia gladii similitudinem representat, *Xiphoides*, i.e. *ensiformis*, lib. de osib. cap. 13. imò & *Sternon* appellatur. 7. de anat. adm. cap. 2. Vide *Sternon*.

Pectus, ea est corporis pars, quæ inter medias costas, & utrumq; latus jacet. lib. Introd. cap. 10.

Pedem summum, partem eam pedis vocat *Hippocrates*, quæ à planta & solo, usq; ad digitos & ungues porrigitur. 3. de artic. 106.

Pedicularis morbus. Vide *Phthiriasis*.

Pedion, i.e. *planum*, *planities*, seu *planta*, est pars pedis, quæ est ante digitos; quæ verò pars ante hanc sita est, *Tarsus* dicitur. 3. de usu part. 5. Arabicè *Rascetta*. Illud *metacarpio* manûs, hoc *Carpo* proportionè responderet. cap. 6. Atqui & interiorem summæ manûs regionem, & quantum infra pedem est, πῆξις Græci, plantam Latini dicunt. 3. de anat. adm. cap. 1.

Pelignus, est color lividus. 14. meth. 9.

Pelma. Vide *Pedion*.

Pelvis. Vide *Infundibulum*, & *Choana*.

Peltalis cartilago. Vide *Cricoides cartilago*.

Pemphygodes febris. Vide *Febris Pemphygodes*.

Penis, πῆξις, *virile membrum*, quod & ἀσθένεια, & πῆξις dicitur. 2. de sympt. caus. cap. 2.

Pen-

Pensilis verruca (vide *Acrochordon*) dicitur, quod imā sui parte usq; adeo sit angusta, ut pendere videatur; tota enim foras prominet, adeo ut excisa, nullam radiculam relinquat, angustiore basi prädita, summaq; chorda similis: à *Myrmecia* differt, quæ basin habet latiore, & nigro colore præditam, atq; ubi à Chirurgo tollitur, sanguinem fundit copiosorem, undè & *fessilis Verruca* appellatur. Vide *Myrmecia*.

Pepasmus, πεπασμός, est morbi, & eorum, quæ præter naturam sunt, veluti coctio quadam, maturatio, & ad excretionem præparatio, in quā quod assimilatur, paucum est; quod autem semicoctum & superfluum, multum. Quamquam alibi πεπασμός significatum latius extendens Galenus, omnem deductionem in mediocrem temperiem, πεπασμός appellat; & alibi omnem morborum πέψω in succorum alteratione consistere scribit.

Pephis. Vide *Pepasmus*.

Peracutus morbus. Vide *Acutus simpliciter*.

Per consensam morbus. Vide *Idiopathia*.

Perditio. Vide *Aborlus*.

Perfrictio, est idem quod rigor, horror, lib. de tremor. convuls. cap. 6. qui nativam caliditatem, ab humorum multitudine gravari ostendit. 4. acut. 26. Vide *Frigus*.

Perforatio, est sectio, in sparsosam pulmonis sedis capacitatem, ipsumq; usq; in pulmonis cavum penetrans; reliqua verò omnis divisio ipsius, vulneratio quidem dicitur, perforatio non item. 7. de anat. adm. c. 14. Nominatur quoq; perforatio, insignis quidam ventriculus, & meatus, qui ab anterioribus duobus Cerebri ventriculis in ipsum Cerebellum prorumpit, per quem Parencephalis Cerebro est communis & connexa. Cum enim Cerebrum sit

à pa-

à parencephalide, crasse meningis duplicatione diremptū, ipsumq; oporteret aliquā parte illi conjungi, quod prædictum meatum produceret, in unum prius locum utrosg; ventriculos terminavit; quem sanè quartum totius Cerebri ventriculum nonnulli nuncupant; alii rectius non ventriculum, sed perforationem nominant, ex qua cavitate, animalis spiritus, parencephalidi transmittitur. 8. de usu part. cap. 11.

Periaptia medicamenta sunt, quæ capitis dolori conferunt, Latinis Amuleta appellantur, quod de collo suspendantur, aut alicui corporis parti alligentur. lib. de re-med. par. fac. cap. 1. Vide *Amuleta*.

Pericardium, **Membrana**, & **Tunica** dicitur: **Membrana**, à substantia; **Tunica**, ab usu. 7. de anat. adm. cap. 2. Vide *Membrana Pericardios*.

Pericranios membrana, tunica est cranio superimposita, quæ ex duplicatione dura meningis undiq; connata & intrinsecus cranio adhærescentis, per suturas extra cranium egressa, ut cranium dura meningi & Cerebro artius vinceret, oborta, ipsi cranio extrinsecus in orbem circumfunditur. 8. de usu part. cap. 9.

Pericharia, h. e. subitum & vehemens gaudium; contrarium Ecplexiæ, quæ est subitus timor. Ex amborum occasione scimus multos interisse. 12. meth. 5.

Pericholus, i. e. biliosus, sive is homo fit, sive dejectio, sive urina, sive morbus. comm. 2. in 1. prorrh. 18. Consequenter autem excrementa, bilem tenuem circiter habentia, atq; ea circumvoluta, vocare *Perichra*, i. e. circiter colorata. Ibid.

Perinæon, quod & *Perinæum*, femem & inter-femineum dicitur. Vide *Interfemineum*.

Pe-

Periodus. Vide Circuitus.

Periostios membrana, est ea tunica, qua singulis ossibus proximè adjacet; aggregavit enim Natura ac circumjecit omnibus ossibus carnes, simulq; ipsa pinguis- sima quoq; parte extracta, terrestria atq; arida, & pinguedine omni carentia reddidit; atq; ex eo, quod extraxit, lentum ac tenax singulis, & in capitibus colligamina, quibus inter se connectuntur, & in longitudine circum undiq; tenues membranas produxit, qua circum ossa, h.e. ossium involucria, & periostia nuncupantur, quibus carnes aggregavit. 1. de semin. cap. 10. Est insuper Periostios membrana succingentem & costas circumdans, qua costis intus tenditur, ita ut inter costas & succingentem, media collocetur. 8. de anat. adm. cap. 10. Est quoq; Periostios oculi tunica, septima in ordine, qua totum oculum cum ossibus colligat, & simul quoq; moventes ipsum oculum musculos operit. 10. de usu part. c. 2.

Peripneumonia, seu Pulmonia, pulmonis inflammatio est, quam semper continua & acuta febris comitatur; Pulmo autem, cum viscus sit laxum & molle, fistulisq; inanibus undiq; infinitis cavum, cordi vicinum, a puriusiore proin atq; crassiore sanguine inflammatur, cum subtilis biliosusq; fluat ferè, nec cum viscere ullâ ratione coherescere possit. 4. de caus. puls. cap. 12. & 2. prognost. 64. Comitatur ipsam spirandi difficultas, tantaq; angustia, ut suffocari laborantes videatur, ac rectè sedere cogantur, calidâ sentiunt expirationem, multumq; aërem frigidum attrahere concupiscunt, atq; inter tusiendum, spurum variâ colore ejiciunt, insuper gravitatis cujusdam, thoraci incumbentis sensum sapè percipiunt, ac dolorem, ex imo ad ipsum

ipsum pervenire, & ad os pectorale, & ad spinam usq; extendi conqueruntur. 2. de loc. aff. cap. 9.

Periptosis. Vide Parempiosis.

Peritonæum, quod rî περιτονίδαι, à circumtendendo sic dicta, abdominis commune tegumentum, membrana est, quod alimenti vasis, cunctiq; in imo ventre contentis partibus prætendatur, tenuis est substantia, ex simplicium & primorum corporum numero, prætenditur tum visceribus, tum intestinis, tum vasis, qua inter septum transversum & crura habentur; tum etiam iis, qua interjacent, quale est vulva, & vesica, tenue admodum corpus, latis araneorum telis simile, abdomini superstratum. 1. de anat. adm. cap. 4. & 4. meth. 6. Arabibus Siphac dicitur.

Peritonæi vertex, membrana est, telis araneorum simili, inferioribus septi partibus circumjecta, continua, totam inferiorem septi transversî regionem subvestiens, eademq; circumharens. 6. de anat. adm. cap. 8.

Perittoma, περίτομα, est id, quod post completam coctionem nec confectum, nec assimilatum relinquitur, adeoq; corpori nec adnascitur, nec accrescit, sed per ipsius laxiora spatia, tanquam supervacaneum errat; unde nomen quoq; a Majoribus ei Perittoma est inditum, 1. de sanit. tuend. cap. 3. quod est idem ac excrementum, sive id spiritus, sive corpus aliud solidum sit.

Perniones, aliâs Chimethla dicuntur, sunt intertrimenta, & scissura manuum, & pedum, hyberno tempore a summis algoribus facta. lib. de med. fac. part. cap. 203.

Perona, Sura, Fibula quibusdam, est alterum os tibie exterius & tenuius: alterum enim, quod crassissimum est, & interiori in parte situm, ὑπόκνην Græcis, & eodem

cum totâ parte, nomine, Latinis Tibia appellatur. Galenus autem ex Hippocrate in τὰς γλώσσας dicit, Peronam diversa significare; aliquando quidem os totum membri, aliquando ipsius ossis epiphysin, interdum ejus protuberantiam, sive malleolum.

Petosis, h.e. oblasio, est privatio & impedimentum naturalis functionis, aut alicujus particula mutilatio. lib. finit. med.

Persistentes morbi sunt, qui eisdem horis accedunt ac remittunt. lib. de Typis, cap. 3.

Perspiratio, & Perspiratus. Vide Inspiratio.

Per viciniam affici. Vide Idiopathia.

Pes, nŕ, pars infima cruris est, qua multiplici ossibus constat, malleolis, talo & digitis.

Pestarium, Pessus, morsus, est lana concepta, aut pannus, aut bombax, aut lineamentum, ad digiti figuram rotundam factum, quod immersum in medicamentum aliquod, involutum serico, filoq; appensum, in utero inditur.

Pestilentia, febris pestilens, morbus pestilens, λοιμός, est morbus, non quidem patrius, sed Epidemius, contagiosus, perniciosissimus, communis, è communi causa natus, adventitius, praesentissimi periculi, quippe qui malignâ & venenatâ putredine, humores, vitales spiritus, & substantiam Cordis labefactat. Pestim itaq; excitat aër, totâ suâ substantiâ putris & corruptus, sive quod is inclusus non diffleat, sive à non humatis cadaveribus, & qui exhalant, vaporibus, & halitibus putridis non discussis, quod co inquinatus sit & corruptus. An verò corporum caelestium aspectus infausti, influxusq; pestilentem reddant aërem, dubitare malim, quam credere; praeter
tini

rim cum Medico, sensus magis sequenti, aëris mutationes pro omni sint Astrologia, ut est 3. aph. & initio prognost. & lib. de aquâ, aëre, & locis.

Petaloides urina est, qua habet hypostasim similem squamis piscium. lib. de Urinis, cap. 27.

Petia oculi, est sanguis fluens de aliquâ arteriâ, vel venâ oblasâ & sauciâtâ. lib. de ocul. part. 4. cap. 7.

Phacos, faciei macula est nigra, lentis similitudinem obtinens: Latini Lentiginem & Lenticulam vocant.

Phagedænas, φαγδαῖνας, Antiqui nominant ulcera maligna, qua semper majora & deteriora fiunt; vel quod cicatrice nullâ obducantur, vel quod facta cicatrix resolvatur subindè; sive propter influxum vitiosorum humorum, vel propter dispositionem partis latentem, longo tempore contractam, ex influentibus humoribus, sive ob aliquam dispositionem p.n. ossis eo loco corrupti: sed nobis sufficiat, ex iis ulceribus pravis, alia nominare Herpetes, qua summam cutem tantum infestant; alia Phagedænas, i.e. exedentes, qua carnem subjectam corrumpunt: nam quod putridum atq; depascens à nonnullis ulcus vocatur, non est propria ulceris differentia, sed passio implicita, ex ulcere atq; putredine. 6. aph. 45. & lib. de aquâ, aëre, & loc. cap. 2. Aliis Phagedænae sunt illa ulcera, qua partes vicinas continuo depascunt, non tamen eas putrefaciunt, & febres inferunt; quod si depastionem cum putrilagine sustinent partes, proinde aliis Nomæ dicantur, i.e. depastiones. 6. de compos. medic. per gen. cap. 1.

Phalacrosls, φαλακρόσις, calvitium, seu calvities, pilorum capitis defluvium est, propter humoris alimentarii penuriam, non autem humorum ob vitium; nam hinc

oritur Alopecia, Area, & Ophiasis. Vide Madarosis.

Phalanx, articulus est, is maximè, quo magnus digitus, osi Carpi propinquo, dearticulatur. 2. de usu part. 6. 9. Græcis *ὀνύχια*, *ῥαχίς*, *ῥαχίς*. Vide Digni.

Phalangosis, affectus est, quo pilorum subnascentium duplex, triplexve acies, in superiore, aut inferiore palpebra, provenit. lib. Introd. cap. 15. Ex quo videtur Author Introductorii phalangosin confundere cum distichiasis, quod falsum videtur, quoniam in distichiasis novi pili, & non naturales succrescunt; in phalangosi autem soli naturales pili sunt, qui inversi, negotium oculo facessunt; in quâ cilium intro spectat, pilorum acie simul cum eo inversâ, sic enim oculum compungunt: quibus duobus affectibus commune genus est Trichiasis, i.e. noxa oculis, inversis à pilis, proveniens; qui pili si recenter exoriuntur, distichiasin efficiunt; si nativi, & naturales, Phalangosin. Paulus.

Pharmaceutica, Medicina Therapeutica altera pars est, quæ medicamentis per os assumptis, affectibus p.n. medetur. 3. de comp. med. per gen. cap. 2.

Pharmacia, purgatio, *ῥαχίς*, *ῥαχίς*, duplicem habet significationem: primo enim significat humorum, qui sua qualitate molestant, evacuationem, sive naturâ, sive arte factam, per quamcumq; regionem, E. G. vomitum, sudorem, urinam, nares, tussim, alvum, uterum: secundo, solam vitiosi humoris evacuationem per alvum tantum, ope medicamenti factam, notat: prior significatio habetur comm. 4. in 6. de morb. vulg. posterior in Aphorism. commentis.

Pharyngæthron, apud Galenum nunc pro Pharynge

ge sumitur, nunc pro osse hyoide, seu portione maximâ Pharyngis. Vide Hyoides.

Pharynx, duo significat, nimirum primum fauces, (i.e. regionem intra os, ubi tum gula, tum aspera arteria extrema concurrunt, sive medium illud spatium inter laryngem & gulam, & ipsam asperam arteriam, cujus summum laryngem vocant.) Deinde, sumitur nomen hoc pro asperâ arteriâ, quin etiam pro ipsius asperâ arteriâ summo capite.

Phathnia, *ῥαχίς*, *ῥαχίς*, sunt ossa, dentes continentia: lib. de ossib. vel potius sunt alveoli, praeepiola, & cavitates, quibus per *ῥαχίς* dentes inferuntur.

Phaulon, simplicem & vulgarem victis rationem vocat Hippocrates; eam verò, quæ huic contraria est, exquisitam: inter utramq; autem mediam, hypophaulon, i.e. subvulgarem nuncupavit. 1. de fract. 45.

Phimos, & Phimosis, vitium quoddam in masculis est, Cels. lib. 7. cap. 25. in quo Colis glans aded præputio connecta, ut nudari non possit: huic contrarium malum, in quo propter cutem decurtatam, aut retrâ abactam, glans regi non potest, Periphimosis, vel Parephimosis appellatur.

Phimosis est, cum cutis palpebrarum extrinsecus ed usq; inflammatur, ut vicina regionis partes quoq; occupentur, & palpebra invertantur; cum verò mitior quidem in cute inflammatio est, at membrana, quæ intus ad Irim usq; extenditur, valde abbreviata, tunc intro palpebra convertitur: quod vitium cum utriusq; palpebris accidit, Phimosis, b.e. Capistratio nuncupatur, cum diducere eas ager atq; oculum aperire nequit. Idem morbus interdum in labiis oritur, & præputio, & ano, cujus

causa ubiq; eadem est. l. 3. de iis, quæ in medic. 32. Vide Paphimolis.

Phleborrhagia, i.e. venarum ruptio. 4. acut. 86.

Phlebotomia, i.e. vena sectio, aut sanguinis per venam sectam emissio. 11. meth. 1.

Phlegma, Latinis Pituita, Prodicto, Blenna, & Mucus vocatur, humor est frigidus & humidus, albi coloris, insipidus. qui cum in sensibus, cum iis, qui ratione quâvis sunt perfrigerati, plurimus coacervatur, autumno abundans. 2. de nat. fac. cap. 9. Vide Pituita, Gravedo, & Coryza.

Phlegmatia, significant sive propriè dictos phlegmonas, & inflammationes nominantur, sive etiam libeat febres unâ completi, secundum antiquam vocabuli acceptionem. 1. aph. 7.

Phlegmone, Græcis φλεγμων ή φλόγωσις, tumor p.n. est, in quo sanguis calidus copiosior in aliquam animalis partem procumbens, majora ejus vasa distendit, ab his ad minora procedit, à quibus exudat foras, in ea ampla spatia, quæ inter vasa sunt, ut etiam omnia, quæ in carne habentur, loca inania occupet. 10. meth. 6. Soler Hippocrates Phlegmonas appellare omnes inflammationes, etsi tumor præter naturam careant; sed ipso posteriores, nomen PHLEGMONES tumoribus præter naturam attribuunt, quâ cum inflammatione & resistentiâ, & pulsatorio dolore consistunt. comm. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Consueverunt Antiqui, omnem caliditatem p.n. phlogosin, i.e. inflamen, & Phlegmonem, sive inflammationem nuncupare. 2. ad Glauc. 1. 4. acut. 21. & 13. meth. 1.

Phlegmone erysipelatosa, est tumor præter naturam, à sanguine bilioso subortus, sanguine in prædominio

pec-

peccante, bile in subdominio. Econtrà Erysipelas phlegmonosum, in quo prædominatur bilis, sanguine in subdominio peccante, ita ut ab eo, quod in mistura exuperat, nomen ipsi tumori indatur. & Phlegmone erysipelatosa, vel Erysipelas phlegmonosum vocetur: ubi autem neutrum vincit, ibi vitium phlegmones, erysipelatosq; medium nominetur. 14. meth. 2. Vide Inflammatio.

Phlegmone oculi, tumor est circa oculos, cum rubore & caliditate multa, & motu difficili, & punctationibus conjunctus. lib. finit. med. Vide Inflammatio.

Phlogosis, i.e. inflamen, sæpè idem est quod phlegmone, sive inflammatio. 3. prognost. 71. Vide Inflammatio, & Phlegmone.

Phlyctænam vocant propriissimè, ubi per exulcerationem, vel etiam sine hac, exterior Ceratoidis tunica membrana tenuissima, & sublimis elata, intra se humorem collegerit, aut sub tunica spatio, crassior humor currens intumescit parit. lib. Introd. cap. 16. Inde ad pustulas per corpus erumpentes, à serosis humoribus ad cutem translatis, nomen transfertur. 2. progn. 60.

Phlyctides, sunt pustula, quæ in ardentissimâ febre, in vigore & statu, calore intensissimo existente, in ore generantur. lib. finit. med. Vide Febris pemphigodes.

Phocatos, instrumenti genus est, quo in fracturis calvaria utimur, à lenticula specie sic dictum. 6. meth. 6.

Phoenigmus, rubrificatio, est ruboris per medicamenta, in aliqua corporis parte, excitatio; quædam enim medicamenta eam vim habent, ut cuti admodum, ruborem concitent, caloremq; accendant, & si diutius immorentur, vesiculas excitent, tandemq; exulcerent; ab Arabibus proinde Vesicantia, & Vesicatoria appellantur.

Phoxos, est depravata capitis figura, cum caput acuminato est vertice, nec ad oblonga sphaera similitudinem, qualem secundum naturam humanum caput habet, formatum est. lib. de ossib. cap. 1.

Phrenitim, eam affectionem vocant, in qua Phrenas, i.e. mentem lasam esse vident. 1. prorrh. cap. 1. Est verò Phrenitis mentis alienatio cum febre acuta, quando Cerebrum propria primariâq. affectione laborat: si verò Cerebrum per consensum afficiatur, dicitur Delirium, & Paraphrenitis. 5. de loc. aff. 4. Est autem affectio hac, inflammatio in meningibus, & in ipsum etiam Cerebrum aliquando pervadens, adeoq. perpetuum cum acuta febre delirii efficiens. 1. prorrh. 1. Quid si febre adjuncta non habeat, tunc non phrenitis, sed vel delirium, vel mania appellatur; si verò perpetuum non sit delirium, tunc haudquaquam phrenitis dici debet, sed vel paraphrosyne, vel paraphrenitis, ut quæ tum à ventriculo, tum à diaphragmate, tum in summo febris vigore, excitatur, ac declinante paroxysmo, spontè cessat mentis alienatio. com. 3. in 3. de morb. vulg. 45. Unde omnia signa, quæ eam vel efficiunt, vel significant, dicuntur phrenitica. comm. 1. in 1. prorrh. 4.

Phrenas. Vide Diaphragma.

Phrenicæ venæ, sunt duæ propagines venarum, è trunco venæ cavæ superioris orientes, insertæ in diaphragma, ipsarumq. totum nutriendas.

Phtharticum. Vide Deleterium.

Phthiriasis, est scabies, circa palpebrarum radices, squamas furfuribus similes dimittens. lib. finit. med. Vocatur etiam morbus pedicularis, cujus generatio quibusdam contingit in capite acervatim, ex multis videlicet

hum

humoribus viscidis & calidis quidem, sed non ad talem tantamq. caliditatem progressu, ad quantam perveniunt acres Ichores, i.e. sanies. 1. de loc. aff. 7.

Phthisicus, Græcè φθισικός, is dicitur, vel qui phthisi correptus est & contabuit; vel qui quavis ex causa macilentus evaserit; vel qui ad phthisin naturâ proclivis, angusto scilicet adstrictoq. est thorace, collo oblongo, cui insuper à tergo operæ scopula, instar alarum, prominent, (unde φτερυγικός, h.e. alatus nominatur:) tandem, cui caput imbecillum est, organaq. respiratoria facile omnem ejus fluxionem recipiunt. comm. 2. in 1. de morb. vulg. 13.

Phthisis, Latinè Tabes, communiter sumpta, est diminutio & colliquatio corporis: Tabes verò propriè est à pulmonis ulceratione, thoracis item fauciumq. oblatione, quam proin tussicula & lenta comitantur febres, & corporis consumptio. Phthoë, proprio vocabulo dicta, est corporis consumptio ex ulcere. lib. finit. med. φθίσις & φθόν Græcis. Phthoën Athenienses nominant, ob pulmonis ulceram insanabilia, totius corporis cum parva febre factam extenuationem. 7. aph. 16. 5. meth. 15. & 1. aph. 12.

Phthisis oculi. Vide Tabes oculi.

Phthoë. Vide Phthisis.

Phthoria, φθόρια, i.e. medicamenta, quæ valent ad ejiciendos fœtus, vivos vel mortuos: alio nomine ἐκβολὰ appelluntur.

Phthoropœum. Vide Deleterium.

Phygethlon, inflammatio est adenum, quæ in inguinibus & aliis sunt, calore & celeritate generationis, ab aliis tuberculis distincta. lib. de tumorib. cap. 15. Phygethlon, est erysipelas inflammationis particeps, 2. ad Glauco. 1. figurâ

suâ illi pano similis, quo textores utuntur, atq; ided panus & panis dicitur.

Phyma, est phlegmone, glandulâ (sicubi fluxio in eas procumbit) citra ulceris occasionem, accidens, 13. meth. 5. qua statim augetur, atq; ad suppurationem venit. 2. ad Glauc. 1. Vide Tuberculum, Furunculus.

Physema, est resina species, quam & pitynam, & piceam nominant, expers pinguitudinis, admodum exsiccans. 7. de comp. med. loc. cap. 3.

Physiognomica signa sunt, qua hominum vultui & faciei impressa, rei naturam indicant. lib. Quod animi mor. cap. 6.

Physiologia, sive Naturalis scientia, 1. de elem. 5. Medicina pars prima, nomine sumpto à materia, qua cognitioni Medicorum subiecta est, ipsissimaq; est corporis humani Natura. lib. de part. art. med. cap. 6.

Phylis, apud Hippocratem nunc naturam, nunc temperamentum significat. 2. acutor. 31. Vocatur insuper Phylis, flatu aut flatuosus sive halituosus spiritus, succis pituitosis, in ventre à deficiente calore, in halitum solutis; qui cum per os excernitur, ructum creat; cum per sedem, sonorum silentemve flatum; cum verò neutrà parte emititur, symptoma creat, quod Empneumatosis, h. e. inflatio vocatur, ventre scilicet impotente ad excrementosum nebulosumq; excernendum spiritum; qui retentus propter magnam spiritus vim, & intestinorum latitudinem, graviter sonat, & murmur, quod Græci Borborygmon vocant, causatur. 3. de sympt. caus. cap. 2. Vide Clydonea.

Pia & dura mater. Vide Membrana dura.

Picatio, auxilium medicum est, quo partium corporis

ris pilos excindimus, cum maxime, cum quidam novacula præsidium formident, præsertim in gutture, usq; abrafis pharmacum aliquod applicamus. 1. de comp. med. loc. cap. 5. Aliqui verò, picationem & picam significare, inquirunt, symptoma depravata vitiosaq; appetentia, cum stomachus vitiosus & à natura alienos cibos concupiscit præter morem: quo malo mulieres gravida infestantur, ad secundum vel tertium usq; mensem; quarto namq; ferè eo liberantur: quod malum alias Citta, & Cittosa passio, ab ave, quæ Pica dicitur, denominatur. Vide Cittosa.

Pica. Vide Picatio, & Cittosa.

Picea. Vide Physema.

Picra simpliciter, sive Hiera picra, est idem ac medicamentum ex aloë, 4. de loc. aff. 2. quod sui amaritudine, morbos & humores expellit. lib. de Dynamid. in procem. Eadem & amara simpliciter appellatur. lib. de cur. rat. per sang. cap. 18.

Picrocholus homo, i. e. amarâ bile abundans. 2. acut. 29.

Pinguedo, est effusi alimenti, circa membranas maxime facta concretio, sensu carens. lib. finit. medic. Vide Adeps.

Pinnæ, seu Pinnulæ, sunt alæ narium. lib. finit. med. Vide Alæ narium.

Picuita, seu Phlegma, in genere dicitur & est omnis frigidus & naturâ humidus humor. 8. de placit. cap. 6. unus ex quatuor humoribus principibus, omniū qualitatis & saporis expers, nonnunquam verò & dulcis particeps fit qualitatis. lib. de atra bile, cap. 2. Scindapson Galenus jocandi gratiâ, nunc picuitam, 8. de placit. cap. 6. nunc Cerebrum nominat. 8. de placit. cap. 4.

Pityriasis. Vide Physema.

Pityriasis & Pityra. Vide Furfuratio.

Pityroides urina, quæ habet hypostasin similem fururi, & furfuraceam. lib. de urinis, cap. 28.

Pladarotes, sunt mollia veluti corpora vetusta, & maxime decolora, palpebrarum parte internâ nondum aspreddinem habentia. lib. Introd. cap. 15.

Plados, omnis humiditas redundans & excrementitia dicitur: sive tenuis ea sit, sive, in modum puris, crassa. 3. de fractur.

Plagulæ, quæ & splenia dicuntur, à splenis formâ, deligationum stabilimenta velut & firmamenta sunt: luxato enim, fracto, vel comminuto ossi, fascia imponitur, quæ confirmatum ac repositum os continent, prohibentque ab affecta parte inflammationem, presentem humorem repellendo, & adveniendi obfistendo, quæ Fasciæ, & subfasciaciones, & subligamina appellantur; supra has, ne dimoveantur ac divertant, plagule imponuntur, cerato aliquo imbutæ; quarum duplex est usus: alter, ut subligamina contineant; alter, ut ea membrâ circum expleant, quæ in acutum desinunt. Plagulis tertio alia fasciæ, quas superligamina nominant, induntur, quibus ferule superponuntur, quæ totam deligationem firment ac stabiliant. 3. de iis, quæ in medic. 11.

Planities. Vide Pedion.

Planta. Vide Pedion.

Planum. Vide Pedion.

Platysma, h. e. latius linteum, quod ulceribus extrinsecus superadditur. 4. de comp. med. per gen. 14. Platysma autem myodes, est dilatio musculoſa, sive latus ille musculus, qui curi subnaſcens, buccam, sinè maxilla, movet.

vet. lib. de nervor. dissect. cap. 6. Vide Latus musculus.

Plectrum. Vide Pharynx, & Isthmus.

Plenitudo. Vide Multitudo.

Plenus pulsus, qui arteriam tactui exhibet plenitorem, & humidam. 1. de differ. puls. cap. 6.

Plethora est, ubi equaliter inter se omnes succi sunt adacti; nos plenitudinem, & succorum redundantiam dixerimus: ubi verò vel slavâ bile, vel nigrâ, vel pituitâ, vel serosis humoribus refertum jam corpus fuerit, eum habitum, Cacochymiam, i. e. succorum vitium, non autem Plethoram, dicimus. 3. meth. 6. & 13. meth. 4. Vide Multitudo.

Pleuritis, Pleuresis, & morbus lateralis, est inflammatio illius membrane, quæ costas intus subcingit, 6. aph. 33. & mutuato à costis nomine, Pleura dicitur. Exquisita verò pleuritis fit, ubi subcingens costas membrana, primario affectu laborat, & dolor vel ad jugulum, vel ad præcordia pervenit; ad jugulum quidem, superioribus ejus partibus affectis; ad præcordia verò, ubi inferiores afficiuntur: vehemens quoque febris hanc inflammationem perpetuò sequitur, quia sedes affecta & parùm distat à Corde, & cum ipsius involucri ac septo transversò cognitionem habet. 5. de loc. aff. 3. & lib. de constit. art. cap. 15. Arabibus Solati, Birsen, & Pleuresis, Græcis πλὴνιτις appellatur. Non exquisita verò pleuritis est, in qua dolor externus est, qui contactu loco movetur, exacerbaturque, vel quoddam sine febre, vel sine sputo, vel sine rursu, vel sine spirandi difficultate sit; vel quoddam neque tensionem, neque duritiem ullam pulsus habet, quæ tamen singula exquisitam efficiunt pleuritidem. Pleuritidem verò incoctam appellant, quæ vel celeriter hominem jugulat, vel non nisi lon-

go tempore finitur, nec per sputum expurgatur. 5. de loc. aff. cap. 2.

Plexus choroides. Vide Choroides plexus.

Plexus retiformis, seu reticularis, est involucrum ex multis arteriis complicatis sub dura meningē collocatum, ad retardandum spiritum animale, ne statim effluat: ubi enim Natura voluit diutius morari materiam, ibi transitum ipsis difficilem molita est; quemadmodum in Ventriculo quidem Pylorus, in intestinis involutra, anfractus & gyri, & ante testiculos arterie & vena multipliciter involvuntur; non secus in capite sub dura meningē, plexus arteriarum retiformis, & reticularis, & Choroides, quin & rete mirabile dictus. 4. de usu part. cap. 13. & 9. de usu part. cap. 7. Vide Glandulosi alsi-
scentes.

Plexus variciformis. Vide Flexus variciformis.

Plixada, i.e. gressuram, totum id, quod inter inguina utriusq. cruris est, solet Hippocrates appellare. 4. de art. 45.

Pneumantias, & Pneumatodes, vocat Hippocrates anhelosos, qui densum spiritum, sive crebram & densam respirationem habent. 3. de diffic. respir. cap. 12. Quin etiam Pneumatodes vocat Hippocrates eos, qui ventrem inflatum habent. Ibid.

Pneumaticus, i.e. spiritalis, qui omnia spiritibus attribuit. lib. Introd. cap. 9. vel qui de spiritibus agit. 3. de differ. puls. cap. 6.

Pneumomphalon, umbilici est dilatorio, a flatuoso spiritu. lib. finit. med.

Phigalion morbus, Incubus Latinis dictus, alio nomine Ephialtes. Vide Ephialtes.

Podagra, est Arthritis pedum: ut enim Arthritis, uni-
versis

versi corporis, & articularum omnium, morbus est; ita, si solum pedum sit passio, ab affecta parte Podagra; si manuum, Chiragra nuncupatur. Vide Arthritis.

Pollex, est brevior & major digitus manus, quem Antichara & promanum vocant. lib. de ossib. c. 22. Vide Digni.

Polychresta medicamenta sunt, quae multis affectibus conveniunt. 5. de compos. med. per gen. cap. 1.

Polychronius, aut simpliciter, ὁ πολυχρόνιος, morbus, qui longo tempore durat: cui opponitur Brachichronius, qui brevi tempore finitur. 3. de diet. dact. cap. 13.

Polymorphum. Vide Sphenoris os.

Polypus, tumor est praeter naturam, in naribus genit. polypodis carni juxta substantia proprietatem, asimi-
lis. 3. de comp. med. loc. cap. 3. Hipp. lib. πειρ. παθόν.

Pompholix, bulla, est elevatio in humore facta a flatuoso spiritu, quo intra humorem concluso bulla excitari solet, praesertim si humor tenax viscosusq. est, & calor in eum agat debilis; tunc enim bulla permanet, nec facile solvitur: quales saepe in urinis visuntur, renalem & longum morbum significantes, ut est apud Hippocr. in aph. lib. 1. & Pompholix metallicum medicamentum.

Ponos, nunc laborem proprie dictum, nunc dolorem, seu malam affectionem, quae in acutis morbis acri male tractantur, significat. 2. acut. 47.

Poples, sive Ancyle, est articulus ille, quo os magnum femoris articuletur osi tibiae, in quo pars exterior genu accutur, interna vero, quae crus flectitur, dicitur poples. lib. Introd. cap. 10.

Poroccele, est ramex callosus, sive tophus in testiculo, aut in membrana Erythroide concrevens, insignis, ren-
rens.

tens, durus, & inequalis. His notis ab Hydrocele, & Sarcocoele distinguitur. lib. finit. med.

Poromphalon, est concretio tophi in Umbilico. lib. finit. med.

Poropœia, est exiguorum meatuum apertio. 4. meth. 4.

Porracea bilis. Vide Bilis pallida.

Porrigo, i.e. surfuratio. Vide Furfuratio.

Porta vena. Vide Cava vena.

Portæ hepatis, πύλαι τῆς ἡπατὸς, sunt pars sima hepatis, in qua radicata vena porta, vel vena porta, quæ est ingressus chyli in jecur; sicut ex gibbâ, sanguinis est egressus.

Porta ventriculi, est inferius ventriculi orificium, quod πυλωρός Græcis, Latinis Janitor dicitur. 3. de loc. aff. 7. Vide Pyloros.

Porcinarium, est primum intestinorum, quod duodenū appellatur. l. de anat. viv. Vide Dodecadaetylon.

Porus, in specie est opticus nervus mollis, ex primâ conjugatione nervorum, à Cerebro ad oculos pertinens, quippe qui solus manifestum habet foramen, unde & visificus & meatus absolute dicitur. 3. de loc. aff. 2. Porus deinde dicitur exiguus omnis corporea molis meatus. l. de sanit. tuend. cap. 12. Atqui & porus tophum significat, tum qui in Arthriticis, tum qui in calculosis generatur: cum enim humor crudus lentorem assumfit, & transitus per renes in quibusdam naturis sunt angustæ, id, quod crassissimum est, & maxime lentum, diutius moratur & tophum gignit. l. de alim. facult. cap. 5. Porus denique & Callum significat, ad quem gignendum cogi & concretum aliquid proprii osium alimenti oportet; id quod in fracturis osium cum primis accidit. 6. meth. 5. Vide Meatus, & Oncos.

Post-

Post-apparentia. Vide Absidentia.

Post-brachiale. Vide Brachiale.

Posterius Cerebrum. Vide Cerebellum.

Posthia, sive Crithe dicitur, cum parte internâ palpebrarum, juxta coronam, suppuratum tuberculum oblongum, figurâ hordeo simile, (unde appellatum est) efficitur. lib. introd. cap. 15.

Præcedentes causæ. Vide Antegressa, & Febres putridæ.

Præcognitio, πρόγνωσις, pranotio est futuri decursus & eventus morbi, ut etiam futuri symptomatis ejus, quod necessariam habet generationem, non autem omnium, quæ circa agrotos eveniunt, accidentium; modò nihil aut ab agro, aut ab absidentibus fuerit commissum, quo Medici judicium jurè frustrari possit. Hippocr. ab init. prognost.

Præcordia, aliàs Phrenas, Veteres Diaphragma & Transversum septum appellarunt; infra verò hæc præcordia, tum venter, & intestina, tum jecur ipsum sita sunt. 8. de placit. cap. 9.

Pregmatis ossa duo sunt, capiti desuper incumbentia, parte posteriori os occipitæ, anteriori verò os frontis, utring, ab ossibus temporum, lineis fuerunt distincta, quæ & Bregmatis ossa appellantur. 11. de usu part. cap. 20. Vide Bregmata.

Præcipientes causæ. Vide Antegressa.

Præputium cutis est, quæ glandem pudendi vestit. 1. meth. 15. Vide Glans.

Præsepiola. Vide Phathnia.

Præter naturam. Vide Secundum naturam.

Prætextus, manifestissimas causas, & verissimas vocavit Hippocrates; cum tamen in usu sit, ut falsa causa prætextus

textus appellantur, 2. de fract. 62. Quin & prætextus aliquando non falsas causas, sed veras dicit. 3. de fract. 46.

Priapismus (Latinis Tentigo) est auditio pudendi stabilitis, in longitudinem ac orbem tumefacti, citra rei Venereæ appetentiam, 9. de comp. med. loc. cap. 9. à flatuoso spiritu, 14. meth. 7. nullo presente stimulo ad libidinem, aut desiderio coitus; ut quibusdam accidere consuevit, qui supini decumbunt: ductâ denominatione à Priapo; nam hunc, cui suapte naturâ hujusmodi Coles esset, ita finxerunt, atq; picturâ descripserunt homines. 6. de loc. aff. 6. Affectum hunc etiam Satyriasmum, & Satyriasum Græci vocant, quod Satyri arrigere semper crediti sint. 1. de tumor. cap. 14.

Prima corpora. Vide Homiomerēs.

Prima particula. Vide Similare.

Primæ venæ (quæ & magna vasa appellantur, & vasorum radices, 5. meth. 3.) sunt, quæ circa jecur, & mesenterium, & Cor visenda sese præbent. 12. meth. cap. 3. Vide Radicem vasis.

Primarius affectus. Vide Idiopathia.

Primitiva causa. Vide Antegressa.

Princeps intestinum. Vide Rectum.

Principium morbi triplex dicitur: primum quidem de primo insultu, qui simplex est, & latitudine caret; secundum, de eo, quod ad tertium extenditur diem; & præter hac etiam id, quod tanquam pars accipitur totius morbi, in quod manifesta coctionis signa desiderantur. 1. de crisi. cap. 3. & 19.

Proboscis, sive Pronomæa, est pars quadam pendens angusta, & longa in Elephantæ animali, (quo loco alio est nasus) adeo ut ad terram pertingat. 16. de usu part. 14.

Pro-

Procatastica causa. Vide Antegressa.

Processus anchoralis. Vide Ancyroides.

Processus cornicularis. Vide Ancyroides.

Procidentia oculi est, cum ab ictu aliquo violento, aut strangulatione, cum febre continua, vel capitis dolore, prolapsus oculus fuerit. lib. finit. med.

Procondyli, dicuntur primi digitorum articuli, metacarpio proximi, perinde ut medii digitorum articuli, condyli; extremi verò, metacondyli nuncupantur.

Proëgumena, causa interna est, aliàs antecedens: Celsus vocat abditam, in occulto positam, & morbi continentem causam: quanquam talis in specie dicitur causa morbi conjuncta, quæ posita, ponitur; sublata, tollitur morbus.

Productio. Vide Dodecadaetylon.

Prognostica signa, futura prænunciant; Diagnostica, præsentia declarant; Indicatoria, instantem crisin & curationem indicant. lib. de opt. sec. cap. 6.

Prolapsiones, i.e. osium absolutas & integras alterationes sive dearticulationes. Dimotiones non integras appellat Hippocrates, 3. de fract. 51. & 2. de fract. 39.

Prolepticus morbus. Vide Anticipans, & Cinnamonus.

Promanus. Vide Digiti, & Pollex.

Pronervationes. Vide Tendones, & Aponeurosis.

Pronomæa. Vide Proboscis.

Prophasis. Vide Antegressa.

Prophylace, ea dicitur artis Medicæ pars, quæ morbi causam adimit; Prophylactice verò, quæ à morbo præservat. 11. meth. 2.

Proprius affectus. Vide Idiopathia.

T

Proptosis, *procidencia oculi* appellatur, *abi cum in inflammatione, illi ex sede suâ procidunt.* lib. *Introd. cap. 15.*

Profartesis, h.e. *appensio*, *longiorum membranarum ad vicina loca est applicatio.* lib. *finis. med.*

Prospheromena, i.e. *assumenda*, vocantur, *quæ intra corpus sumuntur, ut quæ eduntur, bibuntur, ipseque inspiratus aer.* 10. *meth. 7.*

Prospophys. Vide **Prosthesis**.

Prosthesis, prior est virtutis nutritiva facultas, *quæ nutrimentum membro nutriendo apponit: unde appositio dicitur, quam subsequitur Prospophys, i.e. agglutinat, sive unio, quæ nutrimentum appositum agglutinat, & unit membro. Tertia est ovisio, quæ unitum nutrimentum eidem assimilât, & dicitur in specie Nutritio.* 3. *de natur. facult. cap. 1. & 13.*

Prosthesis, est pars carnosâ, *quæ in manuum & pedum cavâ parte nascitur.*

Protopathia. Vide **Idiopathia**.

Prurigo, *pruritus, sensus pruriginosus est, cum exigua quadam molestia, qualis puerorum, qui jam dentire incipiunt, gingivis accidit.* 3. *aph. 35.*

Pfallidæ. Vide **Fornices**.

Pfallioides, sive **Pfallioides.** Vide **Camarion**.

Psamismus, *Curationis genus est, quo Hydropici, arenâ calidâ, recto capite, ad aquam ab universo corpore eiendam, & ejiciendam, sepeliebantur, & Soli ardenti exponebantur.* 3. *meth. med. 9.*

Philothra *medicamenta sunt, quæ pilos & capillos aut ex toto auferunt, vel duos, magnos, multos, crassos, & veluti fillos pilos attenuant, & minores reddunt, vel ipsos penitus extirpant, & partes corporis depiles reddunt.* 1. *de*

1. *de comp. med. loc. cap. 4.* Differunt à **Dropace**, quod sine viribus **Dropace** valentiora. Vide **Dropax**.

Ploa, quasi *pulpa*, i.e. *lamborum carnem* dixeris, est magnus musculus, ab undecimâ thoracis costâ incipiens, & per universa ilia, ipsamque pubem progrediens. lib. *de muscul. diss. cap. 31.*

Ploa, *scabies est, cum asperitate summa cutis, pruritu, furfuribus, insigni & corporis assumptione.* lib. *Introd. cap. 13:* quæ omnia etsi illi cum **Leprâ** communia sint, differunt tamen, quod in **Ploa** summa cutis occupatur, in **Leprâ** malum aliis descendit, subjectasque sevit in partes. Insuper, in **Ploa** *furfuracea* fit cutis, in **Leprâ** *squamosa*. Ad hæc, **Ploa** variè figurata est, **Lepra** verò circularibus magis erosionibus curem depascitur. **Ploam** **Avicenna** distinxit in *excorticatam*, & *non-excorticatam*, *sædam*, & *non-sædam*, *humidam*, & *siccam*: quod forte aliud sit **Græcis Ploa**, ac **Arabibus**.

Pforialis, est *scabies, & duritia scroti, cum intensâ prurigne; quandoque verò & ulceratione.* lib. *finis. med.*

Pforica *medicamenta sunt, quæ scabras in palpebris affectiones sanant.* 2. *de comp. med. loc. cap. 3.*

Pforophthalmia, i.e. *pruriginosa scabies, à Sole, & pulvere orta.* lib. *de remed. par. fac. cap. 10.*

Plychrophobus dicitur, qui frigida aqua exhibenda est timidus: sicut & **hæmophobus**, est sanguinis mittendi timidus: & **hydrophobus**, qui à rabido cane morsus, aquam reformidat. 9. *meth. 5.*

Plyctica *medicamenta; sunt refrigeratoria, quæ omnem calorem & lassitudinem mitigant.* lib. *de Dynam. in proem.*

Plydracæ, *sunt parvæ efflorescences, factæ in capite.* 1. *de*

miles vesicis eminentibus in superficie. lib. de med. fac. par. cap. 5. Differunt à Phlyctænis, quod hæc in toto corpore, nec tantum capite, ut Psyltracia, oriuntur. Item, quod Phlyctenæ à calidiori acrioriq; hæc à minus calido & acri humore gignantur.

Perna, calx, os pedis omnium maximum est, parte, quâ ingredimur, leniter rotundum & latiusculum, posteriore, tibia rectitudinem longè excedens, inferiore astragalo, anteriore osse scaphoidi inarticulatum.

Pterygoidea, quæ & alaria ossa dicuntur. Vide Sphenosis os.

Pterygium, dicitur superinnata, oculi membrana, incipiens ab angulis, & procedens usq; ad corneam; quæ magis aucta cooperit & pupillam. lib. de med. fac. par. c. 12. Pterygia etiam vocant alas narium, i. e. fines ejus infernos, qui moventur. 11. de usu part. cap. 12. Insuper, Pterygium etiam Ungula appellatur & Unguis, differens ab Encanthide, quæ est carnis in majore angulo. ex crescentia; Pterygium verò, nervosa caruncula est. 10. de usu part. cap. 11.

Ptilos, glabras, palpebras, qui pilos non habent, Græci vocant. 4. de comp. med. loc. cap. 8.

Ptilosis, est casus palpebra pilorum. lib. de medic. fac. par. cap. 12.

Titiana, nunc pro succo hordei percolato, nunc pro jusculo ex hordeo parato sumitur. 9. de placit. cap. 6.

Prosis, oculi vitium est, quod alio nomine παραρροισις appellatur. Vide Phalangosis.

Pryelos. Vide Choana.

Pubes, pubertas, tempus est ætatis primæ, quo lanugo circa mentum & pudenda oriri incipit: id quod anno decimo.

cimo-quarto fieri solet. 5. aph. 7. Est & Pubes idem quod pecten, postrema pars hypogastrii, sive Aqualiculi, cui pilus innascitur. Vide Aqualiculus. Cujus pubis, seu pectinis ossa, apophyses sunt ossis sacri tenues perforata, & in anteriora protensa.

Publicè grassantes. Vide Communis, & Endemus.

Puerilis morbus. Vide Comitialis.

Pulmo, ex genere est parenchymatum, caro rara, tenera, & spongiosa est, in cujus cavis & fistulis cartilagineis, aer attractus modicè retinetur, & rectificatur à suis pravis qualitatibus, indeq; in cordis transmittitur ventriculum sinistrum, pro spirituum vitalium generatione. l. de anat. viv. Unde respirationis & vocis instrumentum est. 7. de usu part. 1. Est itaq; Pulmo viscus, quemadmodum hepar, vasis quàm plurimis contextum, quorum intervalla carne molli, instar stoebes cujusdam, opplentur, quo omne id, quod inter vasa est inane, repletur, essetq; firmamentum ac propugnaculum imbecillitatis ipsorum. Ibid. cap. 2 & 8. Πνεύμων Græcè dicitur, spongiosus est, quod follis instar, aëre impleri distendiq; circa noxam possit & contrahi, substantiâ suâ spumam sanguinis referens.

Pulmonia. Vide Peripneumonia.

Pulsativus dolor. Vide Dolor pulsativus.

Pulsus, est sensibilis Cordis & arteriarum motus, dilatione & contractione factus. 1. de differ. puls. cap. 2. & 4. de differ. puls. cap. 3. Hoc nomen Pulsus Veteres primum adhibuerunt designandis motibus dolorificis pulsantibus, ex inflammatione concitatis, vehementiq; motu arteriarum. Deinde, Medici eâ voce significant motum secundum naturam in Corde & arteriis factum per systolen, & dia-

folen: in quo Medici tactus ipsa in diastole si evectatur, aut violenter impellatur, ipsaq; arteria cum venixu quodam pulset, vehemens pulsus, *σφοδρὸς σφυγμὸς* dicitur: cui oppositus *αὐωδρὸς*, languidus dictus.

Pulvis pinguis est, in quo nec asperum quippiam, nec acre subest. 5. de sanit. tuend. cap. 3.

Punctio, solutio continuitatis in carne est, ab aliquo acuto incidente, & tenui facta: Græcè *ὥστis*, & *ὥστis* dicitur. Punctio insuper & Compunctio, appellatur incisionis ratio, qua hydropicis ad ciendam aquam debetur, *παπανόττης* Græcis dicta, Arabibus Punctura.

Punctorius dolor. Vide Dolor tristis.

Pupilla, Græcè *χόρη*, foramen medium uveæ tunica oculi est, in quo fit visio. lib. de anat. viv. Estq; media totius Iridis pars. lib. Introd. cap. 10.

Purgatio, evacuatio est vitiosorum & qualitatibus suis peccantium humorum. per propria loca; derivatio per propinquiora; revulsio per contraria. 4. meth. 6. & 5. meth. 3. Vacuationem appello propriè materia, ubi quantitate exuperat; purgationem verò materia, qualitatibus suis infensa. 2. progn. 14. & 1. aph. 2. Vide Evacuatio, Pharmacia.

Purgamenta, *λοχία* Græci, dicuntur ea omnia, quæ à puerperâ, post partum & secundas exeunt per uterum, quæ & Catamenia appellantur; soloq; hoc differunt, quòd hæc ante partum sint, illa post partum.

Purgatorii facultatem non omnes intelligunt; duo enim significat: alterum commune omnium, quæ quovis modo animalis excrementa expurgant; alterum verò per excellentiam de iis tantum dicitur, quæ aut per

vo

vomitum; aut per ventris dejectionem substantia sue familiaria expurgant. 5. de simpl. med. cap. 20. Vide Cathartica.

Purpurea vena. Vide Communis, & Media.

Purulentia, suppuratio est, ubi pus universum constituerit, concocto tumore quopiam præter naturam. 1. progn. 40.

Purulentus, & Suppuratus. Vide Empyus, & Empyus.

Pus, *πύον*, est humor putris sive suppuratus, partium spermaticarum substantia assimilis. Humor dicitur, quòd in humoris modum fluens, suam ex humore habeat originem, qui in partem inflammatione laborantem decumbens, & per inania ejus spatia diffusus, oclusis undiq; meatibus, perspiratione intercepta computrescit; perinde atq; alia omnia, quæ perspiratiu carentia, alieno in loco vehementius incallescunt.

Pustulæ, Græcis Hydatides, & Exanthemata dicuntur. 4. de sanit. tuend. cap. 4. Sunt & Pustulæ, abscessus in nigro oculi, cum phlegmone & humorum affluxu. lib. finit. med. Vide Exanthemata.

Pustulæ latæ, sive tubercula omnia, duplicem habent differentiam: etenim quedam tendunt in acumen, & altum petunt; quedam in majorem & ampliorem extenduntur locum, non tamen in altum attolluntur: unde Pustulæ quedam sublimes, nonnullæ latæ sunt. 6. aph. 9. Latæ quidem, tum ob humoris frigiditatem, lentorem, & crassitudinem; tum propter continentis membrana densitatem: Sublimes verò, tum propter humoris caliditatem, & tunica raritatem; tum propter virtutis robur, foras pellentis pus: unde Coni similitu-

dinem referunt, & in mucronem fastigiantur. 1. progn. 40.

Putredo, Putrefactio, Græcis *σφῆλις*, est mutatio totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelam, à calido externo. 11. meth. 8. Secundum Philosoph. in lib. de gener. & corrupt. est corruptio caloris in unoquoq; calido & humido, ab extraneâ caliditate. Cæteram, non quicquid corrumpitur, revera etiam *σφῆλαι*, i.e. putrescit, sed quibus id cum calore accidit. 5. simpl. 15. Putredinem porro duplicem Galenus facit, 1. de diff. febr. unam, quæ sit superante naturâ; alteram, quæ sit superatâ, Galenum eo loco consule.

Pycnotica, & Pycnosis. Vide Condensantia, & Obstruentia.

Pyelus, Græci vocant parvos alveos, in quibus nationes insitruuntur. 7. meth. 6.

Pyloros, posterius & inferius est ventriculi orificium: sic dictus, quoniam porta modo, ne nutrimentum ex eo confestim dilabatur, prohibet. lib. Introd. cap. 11. Dicitur & **Pyloron**, ad dextram propè jecur situm habens. lib. de ven. & artic. dissect. cap. 1. Latinis Janitor. Vide Porta Ventriculi.

Pylus. Vide Myrmecia, Clavus, Callus.

Pyss. Vide Onyx.

Pyricauton, i.e. igne ambustum. Sic quoq; dicitur affectus ille, quo quis in aqua ferventi ustus fuerit. 1. de comp. med. per gen. cap. 4.

Pytiroides. Vide Hypostasis.

Pyriama, foras, somentum est, quod corpori admoveatur, vel per suffitum, vel validam spongiam humido aliquo decocto imbutam, vel vaporem per arundinem, vel cucurbitulas, &c.

Py-

Pytionides. Vide Dentes.

Pyulcon, instrumentum est, quo mulsâ per ulcus infusâ, jubemus, ut agri, in laborantem partem thoracis decumbentes, tussiant, aliquando etiam mollior thoracem concutiendo, sic pus universum, saniemq; ulceris extrahimus. 5. meth. 6. 8. Quin & Pyulca, i.e. puris attractiva medicamenta nominantur. 2. ad Glauc. 8.

Q V A D R A T U M corpus, Græcis **Eufarcon**, est, quod nec gracile, nec crassum, nec calidum, aut frigidum, aut alio quovis modo intemperatum, 1. de temp. cap. 6. sed inter hæc omnia extrema, medium constituitur. 3. de caus. puls. cap. 11.

Quartana febris, αἰσχροῦ & νεφέλης, est, cujus circuitus est quarto quoq; die, quo unam accessionem facit, ac unam remissionem. lib. de Typis, cap. 4.

Quassatio, est quartus luxationis vertebrarum modus; tria enim vitia ex vertebrarum luxatione contingunt: cum retrò abeunt, gibborositas; cum intrò, repanditas; cum in latus torquentur, obliquitas; præter hæc quartum vertebrarum vitium accedit, cum dimota quidem junctura ac compages sunt, sed vertebra tamen in suâ sede permanent, quassationem hanc appellant. 3. de artic. 2.

Quotidiana febris. Vide Cathemerina.

Quotidianarum febrium typus est, qui quotidie unam & eandem accessionem, & eam quidem longitudine commensuratam, & unam eandemq; remissionem habet: ut, Tertianus circuitus est, qui tertio quoq; die, unam & eandem accessionem longitudine commensuratam, & unam & eandem remissionem facit. lib. de Typis, cap. 4.

T 5

RADENS bilis. *Vide* Ater succus, Atra bilis, & Acida bilis.

Radius. *Vide* Cubitus.

Radicem vasæ, seu venæ, vocant priorem ejus partem, Feciori vel Cordi propriorem: hac in cello ab inferiore est parte, in brachiis & cruribus à superiore. 5. meth. 3.

Ramenta, sunt membranarum in intestinis rasura, aliquando cruentosa. 1. de loc. aff. 4. *Vide* Strigmenta.

Ramex, Hernia, Gracæ Cele, est omnis in Scroto tumor, sive ex delapsu Intestini, sive Omenti, sive Vasorum spermaticorum, varicis, topis, sive lenti humoris, sive aquosæ substantiæ. lib. finit. med. Fit autem & aliquando Ramex in inguine, quoties valdus ille Tendo membranæ, qui ante inguina ortum habet, & pubis osi inferitur, laxescit, ejusq; robur infirmius factum, & cum eo totus inguinum locus laxior redditus, partes quædam corporis subjacentium, veluti sunt intestinorum, vel omenti, in sese recipit. 4. de anat. adm. cap. 6. *Vide* Celas.

Ranula, tumor est phlegmonodes, sub lingua consistens, potissimum in pueris, Gracæ βαταρυον vocant. Dicuntur quoq; Ranæ, sublinguales vena, sanguine copiosiore discenta.

Rarefacientia medicamenta (Aræotica Gracis) sunt, quæ cutis meatus referant. 5. simplic. 14. *Vide* Anæstomatica.

Rarum corpus est, cujus partes multis spatii inatibus, aëre plenis instructa: e contra corpus densum, seu ipsissimum, quod ejusmodi porositate carens, compactum est. 1. simplic. 13. Sive, Rarum corpus est, quod meatum & poros magnos habet. 2. de sanit. tuend. cap. 5.

Rarus

Rarus pulsus. *Vide* Creber pulsus.

Rascetta. *Vide* Brachiale.

Rationalis Medicorum secta est, quæ naturæ rationem & ductum secuta, morborum causas inquirat, & signis ad illarum inventionem utitur, curationem capiens à contrario, prout causa exigunt. lib. Introd. cap. 3.

Raucesdines. *Vide* Branchos.

Recidiva febris est, quam pravorum humorum reliquia putrescentes, de novo accendunt; cum omnis humor alienus à natura corporis, in quo continetur, aptus non sit ad ejus nutritionem, & proin necessarii ad putredinem convertatur. 2. aph. 12.

Reciprocus pulsus. *Vide* Deficiens, & Recurrens.

Reciprocus decurratus. *Vide* Deficiens decurratus.

Recrementum. *Vide* Callosum corpus.

Recrudescencia, ulcera maligna vocat: & Recrudescere, quasi rursus crudum fieri, atq; in pristinam malignitatem quippiam redire, statuunt Medici. 2. de fract. 28.

Recta futura Calvariæ. *Vide* Obelæa.

Rectum Intestinum (quod & extensum, & longum, quin & Intestinum princeps vocatur) est ultimum intestinorum omnium, quod ad sedem usq; porrectum est: 6. de anat. adm. cap. 9. ad cujus finem est Sphincter, i. e. constrictorius musculus; ad cujus distinctionem reliquam intestini recti partem infimam, quæ maxime dilatatur & laxatur, laxam appellamus. lib. de vulve dissect. cap. 1.

Recurrentes nervi. *Vide* Nervi recurrentes.

Recurrens pulsus est, qui in quantum excurret magni-

gnitudinis aut vehementia, in aliis rursus ad tantundem recurrit. lib. finit. med.

Reduvia. Vide Paronychia.

Refectio. Vide Anatriplis.

Regius morbus est, qui amarum bilem in toto corpore redundantem comitatur: sunt perinde ut Erysipelata & ulcera serpentia, cum eadem amara bilis unam quampiam particulam obsidet, nigram vero bilem in toto quidem corpore, Elephantiasis; in una quampiam particula, Cancer subsequitur. Pituitoso excremento, in toto quidem corpore luxuriante, succedit hydrops Leucophlegmatias dictus: cum in unâ insedit particulâ, tumor œdematosus oritur. 3. de sympt. caus. cap. 2. Vide Atquatus, & Icterus.

Relaxantia medicamenta, Græcis Chalastica, familiari omnibus propè recentioribus Medicis vocabulo, inde nimirum dicta, quod tensas laxant particulas; quippè relaxari ac intendi, contraria inter se dicunt. 7. de compos. med. per gen. cap. 9. Vide Chalastica.

Remissio febris, secunda totius circuitus paroxysmi pars minor, ad infestationem properans; in duo siquidem periodus universa divisa est, in accessionem & remissionem. lib. de totius morbi temp. c. 8. Vide Ablatio.

Remissus pulsus. Vide Vehemens.

Renes, νεφροί, corpus sunt densum, ex carne & fibris constitutum, adeoque carnea substantia, non paucas habens involutiones, figura Græca litera C, aut phaseolis similes, habentes in medio cavitatem quandam, quâ ex venis & arteriis serosum excrementum excipiunt: ad Renes enim non majores solum vene, (quarum alie in cavitatem hanc inferuntur, alie in membranam, quæ eos tegit) sed me-

216

tus etiam capillis modò exiles deferuntur. Renes siti, paulò altius quàm ilia, à quibus duo urinarii meatus emergunt, per quos ad vesicam urina deducitur. Renum operatio est, secernere, & percolare serosum excrementum, à sanguine. lib. de ren. aff. dign. cap. 1.

Repanditas. Vide Obstipitas, Quassatio, Cyphosis.

Repercutientia. Vide Attrahens.

Respiratio, & Respiratus. Vide Inspiratio, & Transpiratio.

Resolutio nervorum, est deperditio motus, cum prius in aliqua corporis parte, non autem semper sensus; si enim deperditur sensus, dicitur sensus resolutio. 3. de loc. aff. 10. Licet ejusdem capitis initio, dicat: Ubi omnes partes nervi tum sensum, tum motum amiserint, Apoplexia hac affectio appellatur; ubi verò alteri laterum soli, aut dextro, aut sinistro id accadat, resolutio, ejus scilicet partis, in qua consistit affectio, interdum dextra, interdum sinistra; quòd si in aliquo membrorum idem eveniat, ejusdem membri resolutio, Græcis paralytis esse dicitur. 3. de loc. aff. 16.

Resolutus oculus, qui naturali motu destitutus, neque sursum, neque deorsum moveri potest, verum sensus expers fit: frequenter id mali partibus etiam oculi accidit. l. Introd. c. 15.

Restitutio, est osis vel membri in propriam sedem collocatio, reductio, & repositio. 3. de fract. 38.

Recte. Vide Omentum.

Retentrix facultas. Vide Attraatrix.

Retiforme corpus, est tunica, aut tunica quid simile, humorem vitreum oculi ambiens, ex Cerebri portione, aut verius ex nervo optico supernè descendente atque amplifi-

plificato conflatum, reti simile, quod ipsum corpus, cum à Choroide, i.e. tenui Cerebri tunica, quæ illi supernè demittitur, continetur, proin tunica oculi, choroides, i.e. secundina nominatur. 10. de us. part. c. 2. Vide Choroides.

Retiformis plexus. Vide Flexus variciformis, & Amphiblestroide.

Retina, est panniculus, vitreum humorem oculi circumdans ad instar rete: cui annexitur alius, qui dicitur secundina, quod secundina sit similis, juxta quem tertius est, qui ossa contingit, durus & solidus, undè sclerids dicitur. lib. de ocul. cap. 2.

Reversiva febris nominatur, quæ non est acuta, sed diuturna, & imperfectas habet solutiones, erroneasq; actiones. com. 2. in 6. de morb. vulg. 21.

Revulsio, est evacuatio aliena materia per loca opposita. Vide Purgatio, & Derivatio. Est autem revulsio faciendâ, deorsum quidem; ubi succi ad superiora feruntur; sursum, ubi ad inferiora vergunt: & ubi introsum, ad exteriora; ubi extrosum, ad interiora: ubi dextrorsum inclinant, in sinistrum; si sinistrorsum, ad dextram revulsio faciendâ. Sic ergo fluxiones, quæ retrò inclinant, in priora revellendâ, quæ in priora, in posteriorem regionem abducendâ sunt. lib. de Hyrudin. c. 2. & lib. de Derivat. cap. 19. Motum hunc Græci Antispasin vocant. Vide Antispasis, Derivatio, Purgatio.

Rhabdoides futura, eadem est ac recta capitis sutura. Vide Obelæa.

Rhachitæ, aut Rhachice, sunt dorsales musculi. 4. de anat. adm. c. 6. & 7. aph. 36. Undè Rhachitis medulla, i.e. spinalis medulla, quæ & Rhachis spina dicitur. Vide Dorsum, Medulla.

Rha-

Rhacodes, i.e. lacerosa, dicitur universa cutis, erosa instar lacera vestis, à pure circa abscessum aggregato sufficienter extenuato: idq; accidit, ubi qui ad abscessum perveniunt tumores, tardè secti fuerint, aut ob medicantium imperitiam, aut eorum, quibus medela adhibetur, timiditatem, qui secari non patiuntur, sed expectant, ut longiori tempore cutis à pure rodatur. 2. ad Glauco. 8.

Rhacosis, i.e. detritio, multa scroci extensio est. lib. finit. med.

Rhagas, i.e. scissura, fissuræ, divisio est labia obtinens, callo obdurata, dura. lib. finit. med.

Rhagades, sunt rugæ ani intumescentes, rimæq; ac fissura sedis, i. de comp. med. loc. cap. 8. quæ & rimæ ledis dicuntur, non aliter quàm labra, quandoq; & manus, ex vehementi frigore, fissæ conspiciuntur.

Rhages, dicuntur extremi digitorum fines, qui Græcis nequædæ vocantur.

Rhagois tunica, aliàs cœrulea, uvea, & uviformis dicitur, est oculi panniculus, albugineum humorem tangens, & circumdans, nigri coloris; undè uvea tunica, ab uvarum colore, dicitur: post quem est alius panniculus, cornu similis; undè Ceratoides, i.e. corneus appellatur, juxta quem est tertius circumdans alios, sed eos inter se jungens, quem Conjunctivam vocant, & Adnatam, sive Agnatam. Inter crystallinum autem & albugineum est tela aranea. lib. de ocul. cap. 2. & lib. Intrad. cap. 11. & 10. de usu part. cap. 4.

Rhappe, i.e. sutura, commissura, syntaxis serrata. Vide Commissura.

Rhegma; i.e. ruptum, est solutio continuitatis in vase: ut, Fractura in osse; Convulsio, sem Spasmus in nervo; Apopsa-

Apospasma in ligamentis; *Tblasma* in musculis; ita *Rhegma*, in vasis, ex violento ictu, vel gravi casu, vel alio quopiam valente motu excitata, est unionis solutio. 4. meth. 1.

Rhetidosis, i.e. oculi tabes, & corrugatio. 3. meth. 2. Vide *Tabes oculi*.

Rheuma, i.e. fluxio, & humorum decubitus. 1. de comp. med. per gen. 4. Vide *Fluxio*.

Rheumaticus vocatus affectus provenit, quando toto videlicet corpore infirmo, & cachectico, principibusq; partibus (paulum licet ipsis insit sanguinis) gravari solent, noxios humores, illa, ad carnosas cutis partes protrudunt, potissimumq; ad adenas, excipiendis recrementis idoneas, tum ob substantia laxitatem, tum quia omnium partium minime robustas habent naturales virtutes, sicut & pinguedo; partes enim infirmiores omnium prima excrementitius, magis corripuntur. 1. de cur. rat. per sang. cap. 8. Fluentibus vero humoribus, *Rheuma*, seu *Flyxio* dicitur; cum vero in aliqua parte eidem illi constiterint, is affectus, qui inde generatur, *Rheumaticus* appellatur. 2. ad Glau. cap. 2.

Rhexis, i.e. ruptio, ab ictu, vel alia quâpiam causa violentâ in alto, totas subinde membranas dividens, & persape humores, quibus videndi facultas administratur, effundens. lib. Introd. cap. 13.

Rhodinum. Vide *Oxyrhodinum*.

Rhodomeli, i.e. mel rosaceum, quod aliquando simplex, interdum purgatorium paratur.

Rhoeas, sive *Rhyas*. Vide *Encanthis*.

Rhogme, est osis ruptio sive interruptio, per superficiem rectâ, vel angustâ, vel latâ. lib. finit. med.

Rho-

Rhopalosis, concretio est summorum pilorum indivisibilis, cum inhibito ipsorum incremento. lib. finit. med.

Rhus, πῆς γυναικῶν, fluxus muliebris, seu profusivum fœminarum, propriè apud Medicos significat menses albos decolores, fluentes sanguine assidue penè & inordinate per uterum: longèq; diversa fluxio est ab eâ, quâ fluit sanguis per uterum, menstruis periodis; cum illa præter naturam sit, hæc verò secundum naturam.

Rhyas, est oculorum vitium, quando meatus, qui ab oculis in palatum definit, vel obstructus, vel connivens, excrementa, non ad loca consueta transmittit, sed in oculos regurgitare permittit. com. 2. in 6. de morb. vulg. 32. Vide *Rhoeas*, & *Encanthis*.

Rhypodea medicamenta sunt, quæ à sordium similitudine, quasi strigementosa nominantur. 2. de comp. med. per gen. cap. 1.

Rhyprica sive extergentia medicamenta nominantur, quæ in superficie, sive in cute, sive in ulceribus sordem auferunt; quæ verò altius poros ab excrementis suis repurgant, ea *Ecphrastica*, & *Eccathartica* (quasi expurgantia, & ab infarctu liberantia dicas) appellantur. 5. simplic. 12.

Rhythmus in pulsu, est proportio temporis ictus, ad tempus quietis. 1. de differ. puls. cap. 7.

Rigor, πῆγξ, est insiti caloris exagitatio, cum sensu doloris subita, & universim facta. lib. de tremor. convuls. cap. 6. Nominatur etiam *Rigor*, Nervorum convulsio, & *Tetanos*. 3. de loc. aff. 10. Est autem propriè sic dictus, convulsio & commotio inequalis totius corporis, à tenui & magis acri, copiosioriq; humore, quam qui in horrore pectet. 3. de san. tuend. 5. & 1. de sympt. caus. 8. Vide *Frigus*.

U

Rigor sine febre, nonnullis quidem accedit semel, nonnullis autem per vices interpolatas multorum dierum interjecto spatio, vel à principio usq; ad finem continuatur; aut est ita omnino exiguus, ut neq; adesse videatur, cum se quieti tradiderint, sed cum moveri coeperint, tunc demum eum sentiunt; aut etiam sine motu molestus, accedit pituita humore redundante, sed non putrescente; quando autem hic humor etiam putruerit, non modò rigens, sed etiam febricitans agri. 2. de differ. febr. cap. 5.

Rob. Vide Succum medicatum.

Ros, tertia est humiditatis species, unde partes nostri corporis nutriuntur, quæ continentur in omnibus animalis partibus, seu ros quidam, per earum substantiam sparsus. 7. meth. 6.

Rorula. Vide Patella.

Rubra bilis. Vide Bilis pallida.

Ructus, est flatûs excretio per gulam: cum & alius sit, qui per intestinum rectum secernitur. comm. 5. in 6. de morb. vulg. 4.

Ruptura. Vide Unionis solutio.

S

SACCU S. Vide Cœcum Intestinum.

Sacer morbus (λεπὰ νόσος, i. e. Epilepsia) dicitur, quod ejus magnitudo designetur; sacrum enim apud Antiquos significat magnitudinem. Alii verò sacrum dici putant, quod divinus esset, & à diis in peccatorum vindictam mitteretur: quos Gal. reprehendit, lib. 2. de caus. sympt. cap. 3.

Sacer ignis, i. e. Erysipelas. lib. de purg. med. fac. Licet Celsus, ignem sacrum, prævum ulcus existimat dici.

Sa-

Sacrum os. Vide Dorsum.

Sagittalis sutura. Vide Obelæa.

Salsa pituita est, quæ ab alieno calore computruit, 2. de natur. fac. cap. 9. & salsa redditur, aut propter putredinem, aut propter salsa humiditatis serosa admixtionem. 2. de differ. febr. cap. 6.

Salvus, Palpitatio, & Palmos dicitur. 2. meth. 2. Vide Palpitatio.

Salvarella vena, est ramus vena axillaris, media percurrentes intermedium digitum manûs, & auricularem. 3. de anat. adm. cap. 5. & lib. de anat. viv.

Salubre corpus, simpliciter est, quod ab ipso Naturæ ortu bonam habet temperaturam, in simplicibus & primis particulis, atq; in iis, quæ ex illis componuntur, instrumentis est probe conformatum & commensuratum. lib. artis med. cap. 4.

Sanguificatio, Hæmatosis, est mutatio alimenti in sanguinem. lib. finit. med. Vide Attractrix, & Hepar.

Sanguifluas venas, eas appellat Hippocrates, quæ magna sunt, quibus ruptis, insignes sanguinis eruptiones contingunt: id quod ex parvis evenire non consuevit; nam & paucus ex hujusmodi sanguis effunditur, & citò ad oras ipsas divisas coalescit, nec nocumentum affert. 2. de fract. 24.

Sanguinarium medicamentum (aliàs & glutinatorium, cruentis opitulans, Græcis Εὐαemon dictum) est, quod vulneris oras committere & glutinare molitur. 3. de compos. med. per gen. cap. 2. Vide Glutinatorium.

Sanguineus Cordis Ventrîculus, dexter ipsius est thalampus, per cujus orificium unus sanguis in Cor intro-

mittitur, per alterum autem sanguis ex ipso in pulmonem deducitur: alius Cordis ventriculus sinister, spirituosus nominatur, per cuius prius quidem orificium, Cor ius, quæ in pulmone sunt, arteriis; per posterius autem, omnibus, quæ per totum animal sunt diffusa, arteriis Cor. est continuum. 6. de usu part. 7.

Sanguis, nunc sumitur pro omni in venis concluso succo, (pituita scilicet, uræq, bile, & tenuibus serosisq, liquoribus) nunc pro quarta substantia, è directo reliquis humoribus opposita, quæ propriè sanguis dicitur, & è cuius exuberantiâ tota massa nominatur. comm. 4. in 6. de morb. vulg. 29. & comm. 2. in 6. de morb. vulg. 38. & lib. de multitudine. cap. 10.

Sanies. Vide Sordea.

Sanitas partium simularium, est calidi, frigidi, humididi, & siccissimi symmetria: dissimularium verò, compositio, numerus, magnitudo, figura conveniens. 1. de sanitate. cap. 1. & 4. & comm. 2. in 1. de morb. vulg. 3.

Sapa, aliis Siraon vocatur, est mustum plurimum coctum. Sunt qui & ficuum siccarum decoctum ita nominant. lib. de attenuante diætâ, cap. 12. Vide Apothermus.

Saphatum, Avicenna & Plinio manantia capitis ulcera nominantur, Græcis ἀσφα, & ἡσφα, Halyabbas tineam, sub quo & ficus, & ἡσφα, & ἡσφα, quæ collocavit, nominat.

Sapor. Vide Chymus.

Saphæna vena est, quæ desuper ad partem cruris intimam descendit, quæ descendendo occultatur, donec partem super malleolum interiorem attingere incipiat. lib. de anat. viv. Vide Malleoli vena.

Sarcocele, σαρκώδης, est morbus testiculis induratis con-

veniens: quoddam si aquosus humor in tunicis, quæ circa testiculos sunt, aggregetur, Hydrocele; omentum autem & intestina quoddam si eadem in loca illabantur, Epiplocele, & Enteroccele dicitur. lib. de tumor. cap. 15. Sarcocele verò simpliciter Ramex dicitur, quam aliàs proprio magis nomine Cirlocele nuncupant. 14. meth. med. 17.

Sarcoma, est carnis in naribus aut aliis partibus præter naturam augmentio, differens à Polypo magnitudine & substantiâ. lib. finit. med.

Sarcomphalon, incrementum carnis est præter naturam in Umbilico. lib. finit. med.

Sarcosis in utero, est carnis ibidem prognata & collecta expullulatio, quam, si magna sit, recidere convenit, vellicaram scalpri, quod celerius emoriatur; sin' parva, protinus tollere. lib. finit. med. Videtur proinde aliud nihil esse quàm mola.

Sarcoticum medicamentum est, quod carne ulcus adimplet. 3. meth. 2.

Satyriasis, & Satyriasmus. Vide Priapismus, & Elephas.

Scabies. Vide Psora.

Scabies oculi, est summæ genarum, angulorumq, oculi erosio, cum pruritu, quam acerrima fluxio progignit. lib. finit. medic.

Scalpella. Vide Laminas.

Scalptus, idem quod frictio, motusq, per ungues effectus, quod in prurientibus particulis animalia naturaliter faciunt, idq, in ipsis omnibus reperitur. comm. 5. in 6. de morb. vulg. 4.

Scamnum Hippocraticum. Vide Hippocraticum scamnum.

Scaphoides, i. e. os naviculare, sive naviforme, est os profundo sinu excavatum, Tali caput anterius & oblongum excipiens: dictum à scapha similitudine; cavitatem enim habet oblongam, scapha similem, in quam simile caput Astragali, seu Tali, intra se admittit. Vide Cubiforme.

Scapulæ, alias Omoplatæ, sunt ossa in dorso post thoracem sita, cum osse occipitis, spinâ thoracis, costis, & osse, quod gutturi præjacet, musculorum operâ copulata. lib. de ossib. cap. 14. & lib. Introd. cap. 10. Vide Omoplatæ.

Scarificatio, est cutis incisio. lib. de cucurbit. cap. 4. Vide Encharaxis.

Sceletos, quasi cadaver asiccatum, est osium humani corporis invicem coherentium universarum, universa compactio. lib. de ossib. in præm. & 1. de anat. adm. c. 2.

Scelos, crus, pars est corporis organica, à coxendice ad inum pedem protensa, præcipuum ambulationis instrumentum, cui innitimur: dividitur in femur, tibiâ, & pedem parvum.

Scelotyrbe, quasi cruris turbam, aut perturbatio nem dicas, species est resolutionis, quâ erectus ambulare homo nequies, latus quandoq; sinistrum in dextrum, nonnunquam dextrum in sinistrum circumfert; interdum quoq; pedem non attollit, sed attrahit, velut ii, qui magnos clivos ascendunt. lib. finit. med.

Sceptica, est illorum Medicorum schola, qui nihil sciri posse dicebant, atq; in singulis rebus hærent, atq; hæsitant. libell. de subfig. emp. cap. 1.

Schesis, i. e. dispositio, est adventitius corporis habitus, qui faciliè discutitur, ut calefactum in Sole lignum: oppositus ei affectio, quæ agrè solvitur; lignum E. G. quod igni

ead

catenus excalescendum est, ut jam accendatur, & fumum edat. 8. meth. cap. 1. & 3. de caus. puls. cap. 10. Vide Afectus.

Schetica febris est, quæ faciliè discutitur; econtrâ Hætica, quæ difficulter solvitur. 8. meth. 1.

Schetron, exquisitum victum vocat Hippocrates; Phaulon autem, victum simplicem, vulgarem & exquisitum; medium autem, Hypophaulon, i. e. subvulgarem. 1. de fract. 45.

Schidacedon, est divisio per longitudinem facta, conveniens fractis ossibus, quæ non omnino separantur à se invicem, sed veluti per rectitudinem finduntur: veluti Cauledon, divisio per transversum facta. 6. meth. 5.

Scindapsoa. Vide Pituita.

Scirrholis, est livefcens & crescens caro, ex vehementia inflammationis orta. lib. Introd. cap. 15.

Scirrhus, tumor est durus, qui sine dolore, non tamen omni sine sensu est; talis enim sanabilis non est. Sunt, qui eos duntaxat tumores præter naturam, qui omnino insensibiles sunt, scirrhos appellandos censent, reliquos non scirrhos, sed scirrhosos tumores. 14. meth. 6. Exquisitus verò scirrhus nominatur, qui omnino durus, sensuq; privatus est; qui verò non omnino insensibilis, & difficulter sentit, ex humore lento, & crasso, qui partibus, quæ indurantur, tenaciter infigitur, non-exquisitus. 2. ad Glauc. 4.

Sclerialis, i. e. durities, est tumor palpebra cum rubore & dolore, difficilè tollitur, & durat magis, quàm inflammatio. lib. Introd. cap. 15.

Sclerintica, i. e. indurancia medicamenta, quæ duritiem corpori inducunt: quod tribus auxiliis præ-

statu, congelatione, siccitate, & repletione tensioneq.

Scleroma, durities, tumor est duriusculus, qui in parte vulva aliquā nascitur, sitq. plerumq. ex phlegmonia, quæ diu permansit, induratione. lib. finit. med.

Sclerophthalmia, i.e. dura lippitudo, in quā oculus durior, ad motum pigrior, dolens, rubicundus redditur, palpebraq. similiter duriores solito siccioresq. reddita, post somnum aperiri facile non possunt, ut nec inverti, propter duritiem; differt à Xerophthalmia, solā magnitudine doloris, duritiei, & siccitatis, quod hæc sit illā imbecillior longē.

Scleros tunica. Vide Retina.

Scoliosis. Vide Obstipitas, Cyphosis.

Scopitulæ. Vide Omoplatæ.

Scotodinos, h.e. tenebricosa Vertigo; cum enim caput circumagi videtur, Dinos, sive Vertigo nuncupatur; cum insuper & tenebricosa fuerit visio, Scotodinos, h.e. tenebricosa Vertigo appellatur. Porro, ob inordinatam spiritus flatuosi motionem, qui vel in capite primam suam habet generationem, vel sursum ex inferni fertur partibus. 4. acut. 42. Est ergo Scotodinos, seu tenebricosa Vertigo, quando simul res conspectæ videntur circumvolvi, & sensus visus repente obscuratur, & egrotus, sibi tenebras circumfundi, opinatur. 4. aph. 17. Idem affectus & Scotomia, & Scotoma, & affectus scotomaticus appellatur; ex quā ipsa appellatione, qualis sit, apparet, quippe à parva occasione hebetantur ii, qui sic laborant, adeo, ut interdum cadant, maximè si aliquando in gyrū rotentur, sive aliū quempiam rotari viderint; sive rotā, aut id genus aliud quippiā, ipsosq. adeo, quos vocant, in aquis vortices, circumagi viderint. 3. de loc. aff. 8.

Scot

Scotomia, Scotoma, Scotomaticus affectus. Vide Scotodinos.

Scrofulæ, aliàs Strumæ Charades, Parotides, & Eparmata dicuntur, sunt apostemata secus aures. lib. de med. facil. par. cap. 11.

Scrotum, est tunica crassissima, extrinsecus testiculos ambiens. lib. Introd. cap. 10. Vulgò Bursa testium dicitur.

Scutiformis cartilago. Vide Cricoides.

Scybala excrementa, sicciora, & quasi in nucleum formata, combusta scilicet à visceris phlegmone, sunt nec exīōuā. 4. acut.

Scypho. Vide Choana.

Scyros, i.e. Callus, & Porus.

Scytalides. Vide Digniti.

Sebum, sive sebum, est oleosa & pinguis substantia, adipe siccior, & magis concreta compactaq. ejusdemq. interim cum adipe generis, (utrumq. enim sanguis est coctus, ex nutrimenti bonitate) nisi quod sebum fragile usquequaq. sit, nec igni admodum tam facile liquecat, & cum refrigit, denuo concrecat: pinguedo autem liquidiior sit, minimeq. apta durari, oleo longā verustate in crasso similis, ut equi, & suis.

Secundiformis tunica, Græcè Choroides. Vide Choroides.

Secunda, sive Secundina. Vide Chorion, Retina, Reriforme.

Secundum naturam fieri dicitur, quod primā ratione à natura sit, & quasi finis ab eā inrenditur, non quod ex consequuntione quadam aliis succedere consuevit; talis motus secundum naturam est, cum ex se aliquid insitūq. naturā suā movetur: ut, motus Cordis, qui in pulsibus sit, est

operatio, & ea quidem secundum naturam; qui vero in palpitationibus fit, & à Corde fit, sed p.n. a causis morbidis exagitato; unde etiam palpitationis affectio est, & ea quidem p.n. 6. de placit. c.1. Præter naturam autem omne est, aut affectus, à quo functio laeditur, aut causa horum, aut symptomata: 3. de præag. ex puls. cap.1. differtq; ab eo, quod est non naturaliter se habere, 8. meth. 9.

Sedes. Vide Unionis solutio.

Sedimentum, est id, quod in urina parte infimâ subsidet. lib. de urinis, cap.16. Quod si ad supremam superficiem terminatur, dicitur Nubecula; si ad mediam regionem, Suspensum; si profundiori parte, inferioremq; occupet locum, Hypostasis. Ibid. cap.21.

Semen, ex Aristotele, est quadam pars utilis excrementi, à quo, & ex quo singula feris membra efformantur. 1. de femin. cap.14. Alii Semen nihil aliud esse dicunt, quam sanguinem à venis, quæ ipsum continent, exquisitè confectum. 2. de sem. cap.2. & 1. progn. 42.

Semicoctos humores appello, qui à ventriculi calore alterationem perpeffi, nec tamen perfecte ab eo superati fuerunt. 4. simpl. 15.

Seminarii meatus. Vide Parastata, & Glandulosi assistentes.

Semeiotice, h.e. adnotatrix Medicina pars est, quæ de signis salubribus, insalubribus, & neutris agit, curationi morborum, per victum, summè necessaria, præterita, præsentiaq; symptomata ad morbi causam inveniendam, & ad præagendum, diligenter inspicens. lib. Introd. cap.8.

Semilyderatus homo. Vide Syderatio.

Semitertiana, *intermittens*, febris est, quæ ex quotidiana continua, & tertiana intermittente fit: 2. de diff. febr. cap.7.

cap.7. ubi sequentem in modum de hac febris loquitur: Frequenter febris secundum suam ipsius naturam, ex intermittentium genere est, ut tertiana, complexus autem quotidianæ febris, nullum integritatis tempus, priori circuitui relinquit, dum secunda accessio, antequam prior absolvetur, invadere anticipet; hanc ego febrem, compendiosa claraq; doctrina gratiâ, uno volens appellare vocabulo, imposui ei nomen Semitertianæ. lib. de morb. temp. cap.8. Sanè nonnulli ajunt, Semitertianam ita nominatam fuisse, veluti semicirculum, ipsam tertianæ circuitus dimidio minorem esse asserentes. Alii dicunt, Semitertianam appellatam fuisse idem, quod dimidio tempore tertianam superet: ut, si tertiana accessio ex duodecim horis componatur, semitertiana ipsas duodecim horas tertianæ in sese comprehendat, eiq; dimidium duodecim horarum addat, universaq; simul evadant duo-de-viginti. lib. de Typ. c.4.

Senecta serpentum, est crassissimus quidam lentor, & velut membrana, ex diuturna latitationis mora, hyemis tempore, sub cavernis terra contracta, temporis longitudine potius, quam senescentis ætatis vitio, facta. lib. de Theriac. ad Pison. cap.13.

Senes, à Decrepitis nonnulli distinguunt, nomen seniorum ultima ætatis tribuentes, senes autem in priori ætate statuentes, quæ media est inter juvenes & seniores. Aliquando senes vocat Hippocrates eos, qui extremam agunt ætatem. 3. aph. 31. Estq; id, quod proprie omnes homines senectutem appellant, non aliud, quam siccum, & frigidum corporis temperamentum, annorum multitudinis ratione comparatum. 5. de tuend. sanis. cap.9.

Sensifici nervi. Vide Nervus sensifici.

Sensus indigentia, est sensus tactus exquisitissimus, soli

solī ventriculo, & maximè ori ejus superno per conjugationis sexta nervos molles, conoessus, ad cibum sumendum animal ipsum excitans & stimulans, 4. de usu part. cap. 7. qui fames nuncupatur. lib. 5. cap. 8.

Sensus vitiosus est omnis, qui perperam obitur & oblesus est, quando scilicet proprium sensibile nō aut omnino sentitur, vel cum vitio sentitur, vel diminutè, aut depravate, & sub specie peregrinā percipitur; ut, in auditu surditas, auditus gravitas, obaudire: in visu cecitas, visus obscuritas, & depravationes quadam. lib. de symptom. differ. cap. 3.

Sepedonodes, putredinosos, Græci vocant eos, qui ad putredinem sunt proni & dispositi. 8. meth. 7.

Septa, quæ & Septica medicamenta dicuntur, sunt omnia, quæ tum eliquare, tum colliquare, ac potissimum carnem tenellam consumere ferè absq; dolore possunt: hujusmodi sunt, Arsenicum, Auripigmentum, Sandaracha, Chrysocola, Aconitum; vocantur Septica seu Putrefaciencia cum putredine: symptomatis autem similitudo, ut sic appellemus, efficit; inter hæc autem numerantur & Cathæretica, h. e. detractoria, quæ extrinsecus solummodò superficiem, quam tetigerint, detrahunt & consciunt, neq; in altum subire corporis & scire valent: ut, Alumen, Galla, Ombacium, Aes combustum locum. 5. simpl. 15.

Serapium, vocat Actuarius potionem, quam hodiè Syrupum nominant: sic verdè vocant, quando medicamentosi succi & liquores cum melle vel saccharo, donec concreverint, coquantur. Dividunt Sepiasarii Syrupum in brevem & longum: brevem, quodd parum aquei humoris in se habet, appellant alio nomine communem: vocant longum, quodd humoris aquei multum obineat, nominantq;

nantq; aliàs decoctum; quin & dividunt in communes & magistræles.

Septum transversum. Vide Diaphragma.

Serofum recrementum. Vide Ochima & serofus.

Serpigo. Vide Herpes.

Selamoidea ossa, a sesami leguminis minuti specie sic dicta, quæ multis manuum & pedum articulis, natura ex abundanti, velut auctarium circumponit, securitatis gratia. 2. de usu part. cap. 12.

Sessilis verruca. Vide Formica, & Myrmecia.

Sextans, pendet uncias duas; sestarius, uncias tres. 4. de comp. med. per gen. 14.

Sicca & valida frictio est, quæ corpori foris adhibetur, ad curandam quodammodò lassitudinem, nullo humido, aquâ videlicet, vel oleo, foris corpori circumfuso. 2. simpl. 25.

Siccus hydrops. Vide Hydrops Tympania.

Sief. Vide Collyria.

Sielisimus, est saliva copiosissima in os affluxus, sive ab humidiori capite in glandulas, ad radicem lingue sitas; sive à Ventriculo, multâ pituitâ redundante, quæ ex eo secundum gulam in os prorepit & refluit multaties, etiam absque vomitu. 8. de comp. med. loc. cap. 4.

Sigmoides apophysis, dicitur processus unus Omoplate, quodd instar antiquæ Græcorum literæ C carus sit: aliàs Ancyroides & Coracoides appellatur.

Sigmoides membranæ, seu cartilagine, sunt tres tunica, quæ in vena Cordis arteriosa orificio visuntur, (quæ pulmonem alunt) intus foras spectantes, quas à figura Græcæ literæ S, sigmoides appellarunt. 6. de usu part. cap. 14.

Sigmoides quoq; dicuntur, cartilaginum aspera arteria, extre-

extrema partes, qualiter Σ figuram referunt. 4. de loc. aff. 6. Vide Cricoides.

Signa iudicatoria. Vide Decretotius dies.

Significatio febris. Vide Insultus accessionis.

Signa aliqua mala sunt, cum ut signa, tum ut causa: ut signa quidem, quoties ex difficiliorebus sunt affectionibus; ut causa vero, quoties ipsa rursus alias committunt & concitant pravas affectiones, pessimaque inducunt symptomata. 2. prognost. 49.

Sima Hepatis pars, est concava ipsius pars, qua ex parte prodit vena porta; per cuius furculos, nimirum Mesarae venas, alimentum a ventriculo, primoque, intestinis jecur attrahit: ceterius opposita pars, convexa & gibba nuncupatur. 4. de usu part. cap. 13.

Similare membrum (quoddam & simplex, homogeneum, & prima corporis particula, qua ex primis constat elementis, & ex qua partes organicae conflatae sunt) est, cuius quamcumque partem sensibilem sumpseris, erit illa toti similis in nomine, & definitione, sicut os & caro. lib. de anat. viv. Cuiusmodi sunt etiam arteria, vena, nervi, ossa, cartilago, ligamentum, membrana, caro. lib. de morb. differ. cap. 3. Vide Instrumenta.

Simiolis. Vide Annotatio.

Simplex morbus. Vide Compositus.

Simplem febrem vocat Hippocrates, quae mitis est, & cum signis tuis cumprimis: sic dicitur febris ephemerica. 1. de cris. 16.

Synapismus, est medicamentum vehementer calidum ex synapi compositum, capiti conveniens. 3. de loc. aff. 4.

Sinciput, est anterior capitis pars, supra frontem sita, capilli insecta. lib. Introd. cap. 10. Vide Bregma.

Singul-

Singultus, $\lambda\upsilon\gamma\varsigma$, est convulsiva quadam oris ventriculi affectio, quoties illud ex humorum copia vel gravatur, vel morderetur, vel propter frigiditatem contristatur. com. 1. in 1. prorrh. 23. Accedit etiam ex immoderata inanitione. 4. acut. 69. Non autem Singultus est vera convulsio, ut potest quae in solis musculis accidit; ventriculus autem nec musculus est, nec ejus os. 3. de caus. sympe. cap. 2.

Singultuosa febris est, in qua per singultum, rodens acerrimusque humor vomitum rejicitur, a quo tamen symptomate febrientes sunt liberati: verum febris huiusmodi nequaquam singultuosa dici debet, nisi singultus per totum morbum, simul cum febre, egrum excrucietur. 4. acut. 69.

Sinus, aut Vomica, est solutio continuitatis in carnosae parte: fit cum sanguinis in mediam regionem, partium inanem & porosam, affluxione: id quod abscessui, & sinui commune est; pars affecta, in exteriori summitate occlusa, os nullum habet, & abscessisse ipsa dicitur a subjectis partibus, cum ejusmodi in ipsam quadam sit fluxio: affectio vero abscessus proprie, sive apostema vocatur; at ubi aliqua ex parte aperta est, ut, qui continetur, humor inde excernatur, non amplius abscessus, sed sinus jam appellatur. 2. de his, quae in medic. 27.

Sinus rectus appellatur, cuius os, in inferiore parte fundum, in superiore est: obliquus, cum in latus declinat. Fiant contrario etiam modo sinus, quibus deorsum fundum, sursum vero os vergat; quibus neutriquam fundum, quod facilius saniei exitus pateat, aperimus. 2. de his, quae in medic. 28.

Sinus vulvae. Vide Cornua uteri.

Sirialis, est inflammatio Cerebri, & membranarum ejus, quam consequuntur sincipitis & oculorum cavitas,

tas, febris ardens, pallor, totius corporis siccitas & inappetentia.

Siræon. Vide Apothermus.

Sitis, Græcè *δίψας*, est appetitus frigidi & humidī alimenti. lib. 1. de caus. sympt. c. 3.

Solidas corporis partes, vocant Medici ossa, cartilagineas, ligamenta, tunicas, musculos, membranas, nervos, arterias, quas particulas, elementares, similes, & simplices appellant. 1. de natur. fac. cap. 7.

Solutio morbi, simpliciter est illa, in qua vel virtute, vel morbo sensim emoriente & devicto, vel morbus, vel vita finitur. 3. de cris. 1.

Solutus, est & dicitur Paralyticus, qui laxatos habet articulos. 5. de compos. med. per gen. cap. 2.

Sopientia. Vide Anodyna.

Sopor, alias Coma, propensio delatiove in somnum est, cum vigilare agri nequeunt, non habentes apertos oculos, sed conniventes, alto somno, vel tenui, quin & vigiliis detinentur; idque accidit, vel humectata plus nimis ea parte Cerebri, qua sensus fons est, ut in ebriis, vel ejusdem intensissimum ob solum frigus; aliquando ob utrumque, quin & propter virium imbecillitatem adeo jam emorientium, ut apertas palpebras, moribundi, servare nequeant. comm. 1. in 3. de morb. vulg. 7. Vide Caros, & Coma.

Soporariæ arteriæ, vulgo Carotides dicuntur, sunt dua illæ, quæ ab arteriâ magnâ sursum ascendente, postquam ex Thorace exiens, ac claviculas transgressa, in medium jugulum pervenit, generantur. 1. de placit. c. 7. Vide Carotides.

Sordes, crassius nutritionis excrementum est; in ipsâ enim carnis generatione duplex excrementum provenit, quod

quod omnem qualitatis alimenti mutationem superat: alterum crassius, alterum tenuius: quod tenuius est, ipsa est insensibilis perspiratio; quæ etiam subinde fit visibilis, quoties vel naturalis calor languet, vel nutrimento utitur, quàm justum sit, ampliore, vel motus quispiam vehementior animali contingit; alterum crassius, sunt ipsæ sordes, quæ in summo corpore nostro colliguntur. Quin etiam in ulceribus, tenue excrementum, sanies, Græcè *Ichor* appellatur; quod crassum est, sordes: ex priori excremento, ulcus humidum redditur; ex crasso, sordidum. 3. meth. 3. Vide Ichor.

Sorici cauda, sive Soricinus. Vide Myurus.

Sparganosis est, dum ob lactis redundantiam, mamillæ tumefactæ sic distenduntur, ut copiam hanc vix ferre queant. lib. 2. ad Glauco. cap. 2.

Spasma. Vide Rhegma.

Spasmus, i. e. Convulsio, musculi est ad suum principium contractio. Vide Convulsio. Inde Spasmosus affectus, i. e. Convulsivus, qui in suo principio, aut non multo post, quàm fieri cœperit, convulsionem accersit. comm. 3. in 1. prorrh. Sic convulsivum affectum appellant, qui ante mortem necessariò, convulsionis aliquod periculum inducit. 1. de prasag. ex puls. Spasmosus autem pulsus, sive convulsivus pulsus, est inequalis in unâ pulsatione, & diversis arteriæ partibus, & ejusmodi quidem, in quo utringue, ab extremis retrahi, tendi, convelli, arteria videtur, in modum chordæ tensæ.

Spasmus oculi. Vide Mollities.

Spata, vulgo Spatula, instrumentum est, quo Pharmacopola, confecturas in cacabo, seu mortario movens. 1. de comp. med. per gen. c. 4.

Spathomela. *Vide Laminas.*

Sperma, Spermaticæ arteriæ, Spermaticæ venæ, Spermatici pori. *Vide Semen, Glandulosi assistentes, & Parastatæ.*

Sphacelare, Hippocr. in lib. de fract. & artic. idem est quod corrumpere: Sphacelus autem est corruptio substantiæ uniuscujusq; partis, quæ sphacelari dicitur. Partis carnosæ autē interitum, ex magnitudine inflammationis, propriè Medici Gangrenam nominant. 7. aph. 50. Sphacelon, in specie etiam vocant ossis cariem. 14. meth. 17. Sphacelos vocem sunt qui dicunt, vehementem dolorem declarare; alii inflammationis excessum tantum, qui partem ad corruptionis periculum deducit. 2. de loc. aff. 7.

Sphacelodes Hemicrania, i.e. alterius capitis partis convulsorius dolor. 2. de loc. aff. 7.

Sphacelon. *Vide Sphacelare, & Syderatio.*

Sphæromata. *Vide Narem.*

Sphage. *Vide Anticardion.*

Sphagitide, i.e. venæ jugulares. 5. meth. 4.

Sphenois os (quod & Polymorphum appellatur, lib. Introd. cap. 12.) est, quod ad cunei similitudinem, ex utroq; latere Calvaria, ad palatum tendit, superiorem maxillam constituens, cujus ossis apophyses utringq; concavæ, ab alarum similitudine, Pterygodes nuncupantur. lib. de ossib. cap. 1.

Sphincter, quasi constrictor, seu constrictorius, musculus constringens orificium recti intestini, & vesicæ urinariæ. 6. de anat. adm. cap. 4. *Vide Rectum Intestinum.*

Spicilla. *Vide Laminas.*

Spina, est omnium vertebrarum, quas spondylos vocant, basis, compages & structura: sumitur etiam aliquan-

quando pro medulla spinali. 3. de loc. aff. 10. *Vide Dorsum, Myelon, & Medulla spinalis.*

Spirationem naturalem, appellat Hippocrates spirationis facilitatem, quæ neg. Thoracem, neg. Cor, aut Pulmonem, neg. Præcordia p. n. affecta, aut dolore aliquo infestata, quin neg. partes adjunctas, Ventriculorum, Lienem. Jecur, egrotare significat. 1. progn. 25.

Spiritus, avdūa, præcipuum est natura simul & anima instrumentum, quo omnes functiones muniāg, exequitur: substantia aërea, calida, levissima, tenuissima, omnes in corpore motus naturales ciens; est enim tertia substantia corporis nostri constitutiva, contradistincta aliis duabus solidis, & humoribus, ejusdem planè cum calore nativo originis, & temperiei, cujus calor est perpetuus comes; nam cum ad vitæ munia oporteret calidum innatum per omnia diffundi, is verò singulis solidis partibus insitus & fixus, & immobilis sit; ei Natura, spiritum socium ascrivit, qui ipsum, suo celeri motu, quod necesse erat, deduceret. Estq; tanta spiritui cum calore nativo, substantia communio, & operis societas, ut par sit ejusdem essentia, natura, & proprietas; ut non immerito Hippocrates spiritus vocarit, impetum facientia, à sui motus celeritate. Aliquando Hippocrates absolute ipsam respirationem, vocat spiritum. com. 4. in 6. de morb. vulg. 4. Unde & densum & rarum spiritum, i.e. respirationem tardam, & raram vocabat. 1. de diffic. respir. c. 2. Interdum, ab eodem, aer inspiratu attractus, qui respirationis, vocisq; materia est, spiritus appellatur. 1. acut. & in prognost. Aliquando flatus ipse, quo nervosa & musculosa corpora distenduntur, spiritus appellatur.

Spirituōsos, appellat Hippocrates eos duntaxat, qui

copiosum aëre inspirant, & aëre multo indigent. 4. acut. 115.

Spirituosus. Vide Sanguineus.

Spiritus flatuosus, sive flatus, crassus & vaporosus flatus est, secundum substantiam aëris, tenuis. Cogita verò ejus naturam ex circumstante nos aëre, in memoriam revocans, qualis in Austrinis constitutionibus, & qualis in Aquilonaribus fiat: ei enim, qui in Australibus, assimilatur flatuosus; alteri verò, qui in Aquilonaribus, is, qui in nobis secundum naturam est, spiritus comparatur. 2. ad Glauco. 6. Vide Flatus.

Spiritus animalis, est primum animæ instrumentum, in Cerebri ventriculis contentus, ad sensificam & motricem vim in universas corporis partes transmittendam, procreatus. 4. de loc. affect. 2. Spiritus equidem, qui in arteriis continetur, vitalis & est, & dicitur; qui in Cerebro, animalis, non quod de substantia animæ sit, sed quod primum ejus illic habitantis sit instrumentum, qualiscumque substantia ejusdem fuerit, qui ex vitali perfectius concoctus, & in Cerebri anfractibus elaborato, conficitur; qui animalis spiritus, nequaquam animæ domicilium, sed primum tantum ejus instrumentum est, eo quod, cum ex vulnere fuerit evacuatus, illico animal quasi mortuum collabatur; cum iterum colligitur, reviviscit. 7. de placit. cap. 3. Spiritus animalis, exhalatio quadam est sanguinis benigni. 6. de usu part. 17.

Spiritus detentio, est Respirationis ad plurimum tempus voluntaria cohibitio, per quam & singultus, & oscitationes sanantur. 3. de diff. respir. cap. 10.

Spiritus densus, est brevis spiratio, sive motus respiratoriorum organorum, per breve tempus, factus. 3. de diff. respir. cap. 10. Vide Inspiratio densa.

Spiri-

Spiritus inter exeundum offendens. Vide Expiratus.

Spiritus asper, à quibusdam appellatur is spiritus, qui cum sono & sterore ducitur, sive ob angustiam loci, quo ille redditur, sive ab humoris copiâ. 3. de artic.

Spiritus vitalis à Cordis facultate naturali genitus, in arteriis continetur, & nutritur per respirationem, attracto aëre & sanguine; quod si naturalis quoque spiritus est, utique is quoque in jecinore, & venis continebitur. 12. meth. 5.

Spiritus naturalis. Vide Spiritus vitalis.

Spiritus sublimis est, qui sublimioribus thoracis partibus inspiratur. 4. de loc. aff. 7.

Spirituum interceptio. Vide Interceptiones spirituum.

Spissum corpus. Vide Rarum.

Splen, sive Lien, corpus est rarum admodum, ac laxum, instar spongiae, ut succos crassos, & melancholicos facile attrahat, excipiat, hepar ab illis expurget, eosdemque conficiat. Unde ipsum Parenchyma, i. e. affusionem nominant, 4. de usu part. cap. 15. cujus limæ partes, seu concavæ Jecur, & ventriculum spectant: gibbæ his opponuntur. cap. 16. Ejusdem Lienis corpus tantum est rarius hepate, quantum est crassius pulmone. cap. 15.

Splenica vena, est ramus sinister superior & minor venæ portæ, qui totus per lienem spargitur; nam cum venæ portæ in duos præcipuos ramos, mesentericum videlicet & splenicum, distincta sit, hic in lienem abit, ille in mesenterium diffunditur.

Splenici, dicuntur ii propriè, qui induratum splenis habent scirrhosamque substantiam; non autem, quibus in-

flammatum visus est. 9. de comp. med. loc. cap. 2. Evadunt autem lienosi, à copia melancholici humoris, lieni inserti, quam defluxiones, & fœdus corporis color subsequitur.

Splendentem urinam vocavit Galenus, quæ & flava est, & peculiari ac propriâ mitione constat, ita ut gemini coloris esse videatur, & rufi, & rubei, splendorem à rufo, nitorem autem à rubeo accipiens. lib. de urin. cap. 4.

Splenia. Vide Plagulæ.

Spondylus, Sphondylus, Spondylon, & Vertebra, sunt viginti-quatuor ossa, quibus Rhachis, i.e. spina constituitur; tot enim sunt in homine, secundum naturam se habente: aliquando verò plura, aliquando pauciora visa sunt, omnia cava & forata, spinam habent, & apophyses obliquas, & transversas descendentes, & ascendentes. Vide Dorsum.

Spongoidea ossa. Vide Ossa Ithmoidea, & Cavernosa ossa.

Spontanea vocantur ulcera, quæ oriuntur ex mordente humore, qui sistitur in exitu, ac tardat, extremamq; cuticulam solam, propterea quod ab eâ remoratur, tum eroditur, tum exedit; quam nec ipsam, si eandem quoq; sudoris vice transirent, ulcerarent. 12. meth. 17.

Spontaneum, apud Medicos dicitur, non quod sine causa sit, sed quod nostrâ causâ non sit: item quod sit absq; operâ Medici, solius Naturæ vi. 6. aph. 14.

Sponte evacuari ex corpore dicimus, quæcumq; sine Medici operâ excernuntur; ea scilicet, quæ nostrum regit corpus potentia ipsum expurgante, aut quæ ex irritamento aliquo, aut quia à vasis nō continentur, rejiciuntur. 4. aph. 2.

Sporades morbi, sive sporadici sunt, qui sparsim privatumq;prehendunt, egros discrepante fatigantes, neq;

secun-

secundum communem modum constantes. 1. acut. 9. Vide Endemus, Communis.

Sporades venæ, sunt propagines quedam venæ maxima, cava, trunci, in totum crus, ab interiore ipsius parte per inguina procurrentis, inordinata, ad cutem permeantes, modicis intervallis dispersæ. 3. de anat. adm. cap. 12.

Spuriæ costæ. Vide Illegitimæ.

Sputamen, est sputum, cui aliquid alieni humoris est admistum: ut, bilis, sanguinis, saniei. 1. de cris. 5. Sputum autem, quod secundum naturam se habet, est, cui flavum aliquid admistum est. Ibid.

Sputum appellatur, non quod sanguineum, biliosum, atq; spumosum est; tale enim propriè sputamen nominamus: sed quod neq; sanguini, neq; bili pallida, vel nigra commistum, spuendo rejectum fuerit. 1. de cris. 5.

Spiratus, (ἐν τῇ ἀπορροῇ καὶ ἐν τῇ πύλω) vocant Caprarum dejectiones: sunt autem hæ sicca, atq; id, quod excernitur, propriâ circumscriptione rotundum circumductumq; existit: cum igitur quis hoc pacto, sicca & circumducta dejecerit excrementa, talia Spyratode, i.e. in spyras voluta appellantur; fiunt & quod plusculo tempore retinentur, & propter copiam igneæ caliditatis: com. 1. in 1. prorrh. 6. quæ & Scybala excrementa vocantur. Vide Scybala excrementa.

Squamosæ agglutinationes, quæ aliàs & mendoas commissuræ, & temporales dicuntur. Vide Lepidoides.

Staltica medicamēta, quæ carnes vulneribus æquant. lib. de Dynam. in proam.

Straphyle, est carnosâ quadam particula, quæ in summo ore apparet pendula, si quis, aperto plurimum ore oro,

linguam deprimat; hac ipsa caruncula duobus nominibus appellatur, à veteribus Græcis Gargareon, & Cion, h.e. Gurgulio & Columna. Caterum, posteriores Medici ferè omnes non ita, sed Cyonidem, i.e. Columellam vocant; nam qui Staphylen, i.e. uvam & acinum ipsam appellant, eorum neq. meminisse præstat. Propriè enim non particulam illam, sed unam aliquam ejus affectionem, Staphylen, sive Uvam nominamus: raro autem hac affectio circa Columellam contingit, tamen si sæpè inflammetur gravissimè. 6. de comp. med. loc. cap. 3. & lib. de anat. viv. Est igitur Staphyle, non illius partis inflammatio, ut quidam putant, sed quadam illius passio, in qua tota Columella laxata, extremâ sui parte major est & livida; superna verò tenuis, ut similitudinem fructus uvæ, unde nomen accepit, præ se ferat. Latini Uvam & Uvulam nominant. Galibid.

Staphyloma, est oculi morbus, cum in summâ tunica quiddam acino simile evenit. 2. meth. 2.

Status morbi, est vehementissima totius morbi pars. 1. de cris. 8. Vel, Status morbi aliud non est, quàm morbi, quantum ad casus, & ad symptomata attinet, maximum. 1. aph. 7. Vide Consistentia.

Steatocèle, affectio est scroti, succrescente in eo quopiam sævo simili corpore. lib. Introd.

Steatoma. Vide Atheromata.

Stegnosis, stipatio, cutis virium, quo per occultos meatus prohibetur transmitti, quod superfium est, excrementum fuliginosum, obstructis sive densatis meatibus, quam densitatem uñon, i.e. conniventiam vocant. 3. de san. tuend. cap. 10.

Stegnorica medicamenta, adstringentia, qua sensibiles

sibiles excretiones cohibent; quod quid enim claudit, & continet in se, nec quicquam sensibile ex sese emittit, Græcè στέγνον, sive Stegnoticum nuncupatur. 5. simpl. 14. Vide Obstruentia.

Stelechiæa, vena est superficialis, & caudicis more sita, unde omnes alia vena, sanguineis ac pedestribus animalibus procedunt. 6. de anat. adm. cap. 8. Estq. vena magna, ad portas jecoris sita, aliarum omnium caudex. libid. cap. 10.

Stephanos, Corona, & Iris, sunt locus ille communis, in quo universæ oculi tunica simul committuntur. 14. meth. 19.

Stephaniæa, sive coronaria vena, futura, & os. Vide Coronale os.

Sternon, est anterius Thoracis os, sive os Pectoris. 7. de anat. adm. cap. 2. Sedes enim omnibus costis duplex est, prior sternon, i.e. pectoris os, posterior verrebrea, quæ totidem numero omnino sunt, quot & costæ habentur, duodecim inquam: enimverò pectoris os, unum quidem os apparet, membranâ autem detractis, quod & plura ossa sint, & numero totidem, quot cum eo costæ dearticulantur, palam innoscit. 8. de anat. adm. cap. 1.

Sternutatio, maximum remedium capitis halitibus repleti est, quâ uno impulsu tum à pulmone, tum à capite spiritus emittitur copiosissimus, ad expurganda ea, quæ in anterioribus Cerebri ventriculis, & in naribus offendunt. 2. de caus. sympt. cap. 4. Sternutatoria verò medicamenta sunt, quæ naribus admota, vapore ad Cerebrum sublato, crassitudinem humoris attenuant, & per nates seu palatum Cerebrum expurgant. 13. meth. 21.

Stigmata, inter cutis vitia numerantur, & dicuntur

non puncta, sed macula punctorum, magnitudine suâ & formâ hominis cutem & superficiem deformantes ac variantes. Vermicatam vulgè nominant.

Stomachi paralysis, symptoma est virtutis stomachi attractricis, cum alimentum aut omnino non trahere potest, aut quam trahit debilissimè. 3. de sympt. caus. 2.

Stomachicos eos appellant, qui appetentiam perdidērunt, & quibus post sumptum cibum, ventris os gravatur atq; opprimitur, agros intolerabilis anxietas habet. Appellantur quoq; Stomachici, illi, quibus nausea conringit, & maxime si ad vomitum impellantur, & iudem simul cibi corrumpantur, quandoq; acidi, quandoq; nidore fœcti, quandoq; aliam vitiatam qualitatem adepti. Ad-hac, eos Stomachicos appellant, quibus ructus huiusmodi cum molestia quadam, anxietate, & subversione contingunt, sæpè cum nondum cibum acceperunt. Quin etiam, quibus per plurimum tempus, cibi in ore ventris morantur, gravantes & vix descendentes, tales etiam Stomachicos appellant. Alios item appetitum caninum habentes, ut & plurima edant, & maxime gravati, paulò post revomant, vocant Stomachicos. Alios rursus, qui fortiter exolvuntur, ubi diutius inediam pertulerint, & si non citius cibum accipiant, in ore ventris morsus percipiunt, quorum aliqui etiam nauseosi sunt, nisi citius potum ac cibum acceperint, Stomachicos etiam vocant. 8. de comp. med. loc. cap. 2.

Stomachum, os ventris appellant Medici superius sive sinistrum. Sic Stomachica animi deliquia appellant, & quosdam stomachicos esse dicunt: sic in eo loco oborto ab affectu p.n. appellantes, velut Hepaticos ab hepate, Colicos à Colo, Nephriticos à renibus, Spleni-

cos

cos à splene affecto, 2. de comp. med. loc. cap. 1 & 4. de caus. puls. 23. licet Stomachi nomine, etiam collum, omni ventri præpositum, instar Isthmi cujusdam angustum, intelligatur. 4. de usu part. cap. 1. Quin & Oesophagus, Stomachus dicitur. Vide Oesophagus. Est igitur Stomachus, os ventriculi, i.e. meatus superior ventriculi, per quem cibi in ipsum ventriculum intromittuntur. Aliud habet & Ventriculus os infernum, quod Græci πύλωρον, per quod chylus descendit, vocitant; duobus enim nominibus, Veteres, Os ventriculi nominabant, Stomachum & Cardiam, i.e. Cor. 8. de comp. med. loc.

Stomatica medicamenta sunt, quæ modicè siccant: sic vocata, quod in assiduo sint usu; cuiusmodi sunt, quod ex Moris conficitur, & quod ex Rubi fructu, & quod ex succo corticis juglandium viridis, atq; etiam his magis, quod ex musto, & cupressi spherulis componitur. 5. meth. 10.

Strabilismus, sive Strabismus, est musculorum oculi, non omnium, sed aliquorum resolutio, ob quam causam vel sursum, vel deorsum, vel in latera nuunt oculi. lib. finit. med. Vide Illosis.

Stranguria, est vesicæ affectus, quo urina non retinetur, sed guttatim destillat, lib. finit. med. unde etiam Urinæ stillicidium appellatur. 8. de placit. 6. Fit autem vel imbecillitate vesicæ, vel urinae acrimonia. 3. de caus. sympt. cap. 2. Vide Ischuria, & Coeliaca.

Strangulatio, est internecio, ob respirationis defectum facta; vel propter angustiam, & coarctationem alicujus spiritalium, i.e. respirationi servientium organorum; vel propter virtutis thoracem moventis imbecillitatem; vel propter vitalis principii vehementem refrigerationem: Angustia autem fit, vel repleta eâ regione, quæ inter tho-

racem

raceni & pulmonem est intermedia, vel pulmonis cavernis & fistulis obstructis, vel inflammatione quâdam totum viscus habente, vel aspera arteriâ, vel ejus arteria caput, quod Græci Laryngem & Bronchon nominant, Latini Guttur; vel illâ gutturi præjacente capacitate, quam Græci Pharynga, Latini Fauces nominant, affectum quempiam perpetiente. 4.aph.34.

Strangulatio uteri, & apnœæ, i.e. spiritus interceptiones, quæ mulieribus quidem assidue, & præsertim viduis accidunt, sunt innatâ caliditate, à multitudine materie frigida aggravatâ, ad similitudinem flamma, quæ præmultis humidis lignis suffocatur. 3.de diffc.respir.c.10. & 6.de loc.aff.5. Affectus hic Græcis ὄστρα, ὄστρεον, quibusdam ἄνοια ὄστρεον dicitur: Latinis autem Uteri strangulatus, Uterina suffocatio, vel Spiracionis ob uterum privatio, tum à parte affecta, tum à superveniente symptomate appellatur.

Strangulator. Vide Lycoides, & Lupus.

Strictor. Vide Anulus, Rectum, Sphincter.

Strigmenta, sunt particula quedam intestinorum, quæ in excretionibus biliosis simul dejiciuntur, summâ intestinorum tunicâ, humoris acrimoniam derafa. 4.de art.31. Vide Rhypodea.

Struma. Vide Chæras, Parotides, Scrofulæ.

Stryphna. Vide Halituofo.

Stulticia, est rationis deperditio, cum lesione memoria, & phantasia. 3.de loc.aff.5.

Sruefacientia. Vide Anodyna.

Stupor, insignis est refrigeratio, idcirco corporibus ista dispositis, & sensus, & motus difficultatem inducit; quem admodum completa refrigeratio & sensum & motum omnino

omnino tollit, & paralyfin inducit. Equidem novi quosdam aded refrigeratis pedibus, ut primis quidem diebus sensus periret, sequentibus deinde diebus emortui pedes putrescerent. 2.de loc.aff.2. Est insuper Stupor symptoma, quale dentibus evenit post esum malorum immaturorum, & aliorum acerborum & acidorum, proprio nomine appellatur αἰσωδία. 3.de aliment.facult.cap.16. Est denique Stupor, cum nervus aliquis obstruitur, vel adstringitur, aded, ut spiritus animalis ad membrum transmitti nequeat, hinc membra sensu & motu privantur. lib.de ren.aff.dign. cap.3.

Stryloides. Vide Graphoides, & Lithoides.

Strymmata, spissamenta sunt, quæ oleis adduntur, aut odoris gratiâ, aut ut compositiones diutius ab injuriis immunis permaneant. 2.de comp.med.per gen.2.

Stryptica medicamenta sunt, quæ stringunt partes relaxatas. lib.de Dynam.in præm.

Subalaris vena. Vide Axillaris.

Subclaviûm. Vide Cataclida.

Subcartilaginea. Vide Hypochondria.

Subcinctura. Vide Diaphragma.

Subcingentes membranæ. Vide Hypezochotes.

Subductione, Hippocrates appellat per alvum excrementa. 7.aph.64. Dicitur autem subductio de ea tantum excretionem, quæ per alvum fit; nequaquam autem de eâ, quæ fit per universum corpus. 2.aph.18.

Subfasciationes, & Subligamina. Vide Epidesmus, & Plagulæ.

Subligamentum, Enæorema, & Nubecula, Hippocrati est, quod in urina, neque in summitate, neque in fundo vasis, sed in media sede sublime & exquisitè medium

dium existit; Nubecula autem id, quod supernatat in urina desuper, dicitur. 1. progn. 26.

Sublimis spiritus; est externus aer, qui ob suffocationis periculum, toto thorace, in suspensis cynanchicis, suppuratis, peripneumonicis magnâ vi attrahitur; nam nobis inculpatè degentibus, solis inferniis, quæ ad seprum transversum sunt, partibus inspiramus; sin ampliorem spirationem requirimus, etiam partes inferniis vicinas unâ movemus. Ubi plurimâ indigemus respiratione, tùm partes etiam ad opera scopula agitamus, totius thoracis validâ operâ urentes. comm. 2. in 3. de morb. vulg. 4.

Submissio. Vide Ablatio.

Substitutæ medicinas appello, quæ in alterius locum subrogari queunt. lib. de substit. med.

Subsultus. Vide Palpitatio.

Subversio stomachi, est aut appetitus deperditio, aut nauseosa affectio, ab accepto cibo facta. 8. de comp. med. loc. 3.

Subversio volvulosa stomachi, appellatur fortis & contentiosus vomitus; nam quemadmodum in Volvulis, subversiones fiunt, cum magna contentione & violentiâ, aded ut stercus etiam evomant; sic etiam alios vomitus violentiores concitatos, quis appellare Volvulos possit. 8. de comp. med. loc. cap. 3.

Subvola, manus pars est exterior: ut enim supina pars manus, juxta pollicem assurgens, Thenar, & Vola dicitur; ita huic opposita, Hypothenar, i. e. Subvola nominatur. lib. Introd. cap. 10.

Succus. Vide Humor.

Succum medicatum vocant eum, qui primum defacatur, exinde verò Solis aut Ignis calore sic densatur, ut lon-

longiore tempore citra corruptionem asservari queat: Arabes Rob vocant. Ex hoc genere est, quod ab iisdem Miva dicitur: sic enim appellant succum fructuum, ed usq; defacatum & decoctum; ut sapa aut mellis consistentiam acquirat.

Sudamina, (Græcè ἰδρώματα) è genere sunt pustularum in summâ harentium corporis parte, quæ ad instar ulcerum cutem exasperant, proveniunt autem, veluti & ipsum ostendit nomen, propter multos sudores biliosiores, & mordaciores; mordent enim hi cutem, & pruriginosam efficiunt, & per modum ulcerum exasperant. 3. aph. 21.

Sudor; Græcè ἰδρῶς, est humidum tertie concoctionis excrementum, per cutem aqua specie erumpens, cujus materia est humor tenuis, & serosus, alimento permixtus, quod id facilius exiguas & capillorum modo tenues venas subeat, atq; ab his in partes, quæ eo ali debent, sese insinuet; est quin imò ejusdem cum urina generis, in eo tantum ab illâ differens, quod hæc ad vesicam, ille longius in corporis habitum deferatur; cujus humoris excretio secundum naturam est, non minus quam urina & aliorum excrementorum.

Sudor bonus est in febribus, qui evenit die judicatorio, ex toto promanat corpore, calidus, insuper integrè febrem finit, vel morbum tolerabiliorem efficit, idq; in acutis morbis. 1. progn. 26.

Suffocatio. Vide Strangulatio.

Suffusio. Vide Hypochyma.

Suffumigium. Vide Thymiaia.

Sugillatio. Vide Contusio, Hypophagma, Hæmalopa, Exuccatio.

Sumen. Vide Ephebaon.

Sum-

Summum humerum. Vide Acromion.

Supercilia, sunt ea pars faciei, ubi frons definit, ceteri termini hujus eminentes, & pilis confiti. lib. Introd. cap. 10.

Superexcretionem, aut Superpurgationem, recentiores Medici vocant eas evacuationes, in quibus Natura, adjudicatorium auxilium concitata, modum excessit. 3. de comp. med. loc. cap. 3.

Supergeminalis. Vide Epididymis.

Supergenualis. Vide Parella.

Supergumeralis, quæ & Epomis dicitur. Vide Humerus.

Superimprægnatio. Vide Epicyema.

Superligamina. Vide Epidesmus, & Plagulæ.

Superligula. Vide Epiglottis.

Superpurgatio, & Supervacuatio. Vide Hypercatharsis.

Supinitas, stomachi affectio est, quæ in quamprimum assumpto cibo, si paulo fortiori motu corpus moveatur, statim vomunt. Vulgo Supinitas stomachi appellatur, contingit juxta intemperiem quamcumque, citra vitiatos humores. Aliquando sequitur ad solam oris ventriculi debilitatem, quod cibos amplecti, eumque obvolvi non potest, veluti tota ventris amplitudo solet. Fit etiam propter humiditatem multam quidem, non tamen maligna qualitatis. Irregularis enim stomachus per largam humectationem, similiter ut ligamenta nervorum, laxatur; quandoque, verò cum vitata alicujus, modica tamen humiditatis complexu; etenim sicuti multa, ita & valde vitata peritromata, citra cibum, nauseam efficiunt. 8. de compos. med. loc. c. 3.

Suppuratio. Vide Purulentia.

Suppuratus est, qui multum puris inter thoracem & pul-

pulmonem collectum habet; communiter verò omnes, quibus inflammatum viscus aliquod suppuratum est, Suppuratos, Empyos & Empyicos vocant. 4. de caus. sympe. cap. 6. Suppurari autem, aliquando idem est quod corrumpi; sic enim sanguis, cum è suo loco exciderit, & per minimas partes ad eas, quæ in musculis sunt, cavitates, aut per inania spatia, quæ vas circumjacent, fuerit effusus, suppuratur, aliquando nigrescit, aliquando in grumos verritur, præsertim quando in magnam cavitatem præter naturam exciderit. 6. aph. 20. Vide Empyus, & Purulentus.

Sura, est Tibia venter, Græci γαστρονύχιον vocant. 3. de usu part. c. 10. Est posterior tibie pars carnosa. 16. de usu part. 8. Veluti anteriorem carnis expertem, Anticnemion, & Ocream nominant. 2. de anat. ad. cap. 4. Vide Tibia.

Surditas, νύφασις, est actio auditus abolita, à causa aliqua præter naturam, videlicet à lesa audiendi facultate, ejusve primario instrumento, quod est animalis spiritus, p. n. affecto, aut lesis organis reliquis, quæ Natura ad audiendum comparavit.

Suspensum. Vide Sedimentum, & Hypostasis.

Suspiriosus, i. e. Asthmaticus. lib. de remed. par. fac.

Sutura. Vide Commissura, & Compages.

Sycosis, Marisca, Ficus, Ficatio, est tumor, à fici similitudine sic dictus, ulcerosus, rotundus, subdurus, rubicundus, dolorificus; ex quo aliquando exiguum & glutinosum quid, inaequale & graveolens, egreditur, in barba maxime exoriens; aliquando & cumprimis in capillo proveniens, quod semper fici similitudinem fert, & carnis excrescentiam. Interdum in mento fit, ab humore non so-

lūm crasso, sed etiam partice serosa & tenuis humiditas, quā exulceratur: eoq; differt ab Iontho. Nasitur & in ano, solā magnitudine à Thymo differens. Latini Mariscam appellant, quam aliqui dicunt esse ficum præ pinguedine hiantem. 2. meth. 2. & 10. simpl. Appellatur etiam Sycolis, interioris palpebra dura & asperior scisura. com. 2. in 6. de morb. vulg. 4. & lib. de ocul. cap. 9.

Syderatio, (Græcis σφάκτις) est corruptio solidorum corporum omnium, ipsiq; adeo osibus etiam inexistens, ne dum carnibus, aut vasis solis; quo differt à Gangræna, quæ est mortificatio solidorum corporum, non osium. lib. de tumor. cap. 11. & 7. de anat. adm. cap. 13. Totam substantia uniuscujusq; pars corruptionem, Syderationem (i.e. Sphacelon) Veteres appellant: sed in partibus carnosiss, aliis quoq; nominibus, videlicet putridam carnem, marcidam, & viciatam, aliisq; hujusmodi, eandem nuncupare consueverunt; de osse verò, quod in tota substantia viciatur, syderatum seu sphacelatum tale inquirunt. Tale autem vitium osibus contingit, quando adjacens caro prava sanies producit, quibus ipsa madefaciendo corrumpit. 2. de fract. 20. Unde Sphacelare, i.e. corrumpere; & Sphacelon, i.e. Caries. 5. de loc. aff. 3. Semisyderatus autem dicitur, qui alterā tantum parte, dextrā aut sinistrā, computruit. lib. de aqua, aëre, & loc. cap. 6. & 4. de artic. 17.

Symmetria, est temperies, & contemperatura, temperata sive debita convenientia, & proportio inter se tūm similiarium partium, in calido, frigido, humido, & sicco; tūm instrumentalium, in compositione, numero, magnitudine, figurā. 1. de sanit. tuend. cap. 1.

Symmetrum absolute est, quod nulli collatum, medium

dium est, & mediocre, adeoq; omnis temperiei, tūm activarum, tūm passivarum qualitarum, norma constituitur: tale & Ensarcon, & Quadratum est. Non absolute verò symmetrum, quod in aliqua specie vel genere tale est, ut ad ipsius comparationem, aliquid temperatum, vel intemperatum dicatur. 1. de temp. cap. 6. Symmetrum verò medicamentum est, quod & similis temperamenti est cum eo, cui admoveatur, & mediū temperamenti est omnium primarum qualitarum. 5. simplic. 25.

Συναγωγή, est per consensum, seu per viciniam affici, quoties pars aliqua non proprio affectu, sed alieno afficitur. 1. de loc. aff. cap. 6.

Sympathia, est affectio compatiens alteri cui-dam primò patienti partium, idq; vel propter earum vicinitatem, vel propter societatem, quæ in ea sunt. com. 1. in 1. prorrhet. 20. Vide Idiopathia.

Sympepsis (Græcis πένανσις) est concoctio, quā Natura crassis & crudis humoribus, & concoctu difficilioribus, per abscessum providet, veluti calidioribus & tenuioribus per excretionem. 3. progn. 23.

Symphylis, est naturalis osium unio, per quam duo ossa sibi invicem aut immediate coalescunt, (veluti fungosiora, mollioraq;) aut aliorum interveniu conascuntur, (ut sunt sicciora, & densiora) nempe mediā cartilagine, & dicitur Synchondrosis; vel mediū nervis, & dicitur Synneurosis; vel mediā carne, & dicitur Sympsarcolis. lib. de osib. in proem.

Symptoma (alias Palsio, πάσις, & πάθμα, & Epigenema, quasi supergenium, vel supergenitum dixerit,) generatim nominatur, quicquid animali præter naturam accidit; ut sunt tūm morbi ipsi, tūm morborum

causæ, intra corpus subsistentes. Alterâ verò significatione, ac magis propriâ, reliqua omnia, quæ (morbis, horumq; causis exceptis) præter naturam sunt, Symptomata nominantur. lib. de sympt. diff. cap. 1. & cap. 2.

Symptomatis, affectus est, quo meatus, qui oculo videndi facultatem tribuit, ex atrophîâ, vel resolutione fit ætior, & concidit. lib. Introd. cap. 15.

Symbebcos, (Græci συμβηκος) i.e. accidens; apud Philosophos id est, quod substantia opponitur; sed à Medicis, tum maxime Gal. 1. meth. contrâ distinguitur symptomaticus: Quæ enim, inquit, constitutionem parit, undè actio nascitur, necessariò sequuntur, sanis quidem nobis symbebcota, i.e. accidentia egrotantibus symptomata nuncupantur. Accidentium autem differentias, 2. meth. tres constituit; sunt enim vel ut affectus, vel ut actiones, vel ut passionēs: quorum hæc exempla ponit, inambulare, uri, cædi, album aut nigrum esse. Præterea, id ex accidenti dicitur fieri, quod nec primùm, nec per se fit; id quod exemplo calculorum mororum declarat Gal. lib. de differ. sympt.

Synanche. Vide Cynanche.

Synarthrosis. Vide Articulus.

Synætia. Vide Continentes causæ.

Synceras dejectiones, vocat Hippocrates impermixtas aquosæ humiditati, quibus solus humor aliquis dejectur, sive sit biliosus, sive melancholicus, sive porri colorem præ se ferens, sive bilis, quæ æruginosa nominatur; cuiusmodi dejectiones omnes, exustam esse omnem nativam humiditatem à calore febrili, demonstrant. 7. aph. 6.

Synchondrosis. Vide Symphyllis.

Synchisis, est oculi vitium, in quo confusi sunt ejus humo-

humores: id quod accidit ut plurimum ex vehementi plaga, interdum verò & ex Uvæ tunica inflammatione, ruptis ejus vasīs, & effuso humore eorundem.

Syncomistos panis. Vide Autopyrus.

Syncope, est præceps virium lapsus, 12. meth. 5. quem virium lapsus duo præcipua symptomata consequuntur, ex soluto quidem nativo calore, frigiditas totius corporis; colliquatâ verò solidorum corporum substantiâ, sudor, quem Medici Syncopicon, & diaphoreticum appellant; ex quibus pulsus defectio, & sensus motusq; privatio consequuntur. Differt à Lipopsychia & Liporhythmia, quod, licet utraq; affectio hæc affatim & consertim fiat, in syncope tamen plurimus subsequutus sudor diaphoreticus, languidiores vires reddit; sudor autem aut nullus, aut modicus est in exolutione, lipopsychia, & liporhythmia, minoremq; noxam viribus infert.

Syncretica, h.e. relaxantia medicamenta. 2. de anat. adm. cap. 1.

Syncrimata, vocant corporum simplicium & elementorum compositiones, seu concreciones. lib. de differ. morb. cap. 5.

Syncretis, i.e. concretis & contemperatio. lib. de max. core, cap. 4.

Syndesmi, sunt ligamenta, sensus expertia, quæ ex osse ortum ducentia, (non ex Cerebro aut spinali medullâ) rotunda sunt, alba & exanguia, cavitare carentia, in fibras divisa. 6. meth. 4. Vide Ligamentum.

Syndrome, concursus est & congressus symptomatum. lib. finit. med. Plethorica autem syndrome, est omnium humorum concursus; Syndrome verò pathognomonica, est concursus symptomatum, morbum, hujus scilicet

speciem, sedem & causam conjunctam indicantium. lib. de cur. rat. per sang. cap. 9.

Synneurosis. Vide Symphyosis.

Synocha, h.e. continens febris est, cujus universum tempus una accessio est, & quae vel semper in eodem vigore consistit, vel minuitur, vel augetur, donec judicetur; quaecumque enim, per circuitus certos, egritudinis accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent, quae scilicet membra vel mittunt, vel suscipiunt, vel generant, vel attrahunt, superfluitates; sed quae circuitum non habent, in his nulla est corporis pars, quae praecipue sit laesa; sed qui in venis & arteriis omnibus continentur humores, atque, si praefertim, qui in maximis atque plurimo calore abundantibus vasibus sunt, aut ob aliam quamvis causam, ut in Ephemeris, aut ob putrefactionem ferventes, febrem accendunt, Synocham appellatam, quae à principio usque ad finem nullam habet intermissionem, ac tamdiu perseverat, hominemque deurit, donec, qui eam causantur, humores aut ex roto absumantur, aut coquantur, aut utrumque patiantur. 2. de diff. feb. Febris haec & Synochus putrida, deurens, ardens, Causon, succensa appellatur. 2. de cris. c. 6. Vide Continua & Febrem Synochon.

Synochus, i.e. continens febris, quartum febrium genus numeratur, quod quia ex sui natura ultra tertium diem extenditur, nec humorem putrescentem habeat, nec febrilem calorem ut habitum possideat, propterea nec diaria, nec putrida, nec haetica dici potest; sed vel diaria plurium dierum, vel Synochus non putrida, vel Synochus conclusa merito appellari potest; quam febrem vel conviventia meatuum, vel recens corporum densatio & stipatio excitat. 9. meth. 1.

Sy-

Synodontes. Vide Hiatali.

Synonyma, i.e. Univoca, quae inter se communicantia, & in aliquo tertio convenientia, ab uno factam denominationem habent. 4. acut. 13.

Synopsis, i.e. compendium. lib. de nervor. diff. cap. 17.

Syntrasis, distentio, opposita est laxitati: utraque & in cute, & in articulis contingit, aut resiccatis, aut perfrigeratis, aut inflammatis, aut induratis iisdem; in cute vero, non his tantum modis, sed etiam quoties musculi intra ipsam quovis modo augeantur, tum maxime ex carnis copia & abundantia, ut in utero pleno aqua, & Tympania, quod Galenus in pluribus libris Methodi testatur.

Syntaxis, i.e. mutua compositio, & connexio. 1. de usu part. 14.

Syntexis, Colliquatio. Vide Febris colliquativa.

Synthesis, est osium compositio, qualiscumque demum; est enim universi generis nomen: alius nominibus vocatur Galeno, Syntaxis, & Homilia. lib. de osib.

Synulotica medicamina sunt, quae ulceribus cicatricem inducunt. 13. meth. 5.

Syphon. Vide Metrenchyrae.

Syringotomata, instrumenta sunt, quae ad fistulas incidendas sunt comparata. 6. meth. 4.

Syræon. Vide Sapa.

Syrinx, i.e. fistula, rubutus est callosus, angustus, oblongus, interdum etiam obliquus, os habens, cui cicatrix obduci nequit, per quod humor stasis temporibus excernitur ichorosus, acris. Porro, fistularum alia coecae nominantur, quae osculum in profundo, sinum ad superfi-

Y 4

ciem habent; alia occultæ, quæ & os, & sinum obtinent in profundo. lib. finit. med. Vide Fistula.

Syllarcolis. Vide Symphytis.

Systematica inæqualitas, est congregatio multarum inæqualitatum, & pulsus ex congerie multarum pulsationum inæqualium consurgens. 4. de loc. aff. 8.

Syttole, est submissio pulsus, i. de diff. febr. cap. 7. (dicitur etiam Syttole & Diastole, i. e. constrictio, & dilatatio, de moribus thoracis & pulmonis, lib. de vocal. instr. diff. cap. 2.) quo motu facultas fuliginosa excrementa expellit & repurgat, atq; ita refrigerii calori nativo molitur.

Systrophe, Phyma, & Schleria, h. e. tuberculum durum, ut exponit Gal. in linguis. Hipp. 4. agut.

T

TABES, (Græcis cōmuniter Phthisis appellata) est ulceratio pulmonis, thoracis, & faucium, tussicula, quam debiles comitantur febres, & corporis universi consumptio. lib. finit. med. Nominatur etiam Tabes, alicujus corporis particula præter naturam diminutio, sive ea in prima formatione hujusmodi appareat, sive post. lib. de diff. morb. c. 9. Vide Ex ægritudine senectus, & Phthisis.

Tabes oculi, (alias Rheridosis dicitur) est solius imminuta pupilla corrugatio, incidentibus aliis super alias rugis, quod spiritus parcius à Cerebro, quam pro natura deberet, affluat. Differt à Tabe oculi senum, quæ est corrugatio corneæ tunice, & pupilla angustia, ab imbecillitate senectutis, cum ex defectu humoris tenuis, quo repletur, cum ex spiritus supernè affluentis inopia. 10. de usu part. & 3. aph. 16.

Tabida febris. Vide Ex ægritudine senectus, & Marasmus.

Tabi-

Tabidos appellant veteres Medici, qui morbo tabifico, quem Phthoën vocant, sunt obnoxii. Tales propriissime sunt, qui aded sunt angusto thorace & restricto, ut à tergo in morem alarum promineant, apertâ scopulâ; unde hos etiam Pterigodes, i. e. alatos vocant. Præterea, quibus caput facile impletur, & spiritus organis multas destillationes demittit, ii facile tabescunt. com. 1. in 1. de morb. vulg. 18.

Talpa, & Testudo, sunt affectus, cutis capitis proprii, nomina à recentioribus correcti, cum apud antiquos hi affectus non fuerint descripti. Testudo autem Guidoni, abscessus est magnus, mollis, humoralis, latiore formâ, in modum testudinis, unde nomen accepit: quæ, si in capite nascatur, Talparia, vel Talpa dicitur; in collo, Bocium; in testiculis, Hernia: interdum autem cum pure squamis, vel fistulis reperitur, reponitur sub abscessuum genere, & sub meliceride potius, quam atheromate. Talpa verò, cum albam materiam contineat, ad atheromata potius, quam meliceridem refertur. Bocium verò, vulgus vocat mollem & laxum tumorem in exteriori gutturis parte, quem Græci Bronchocelen, nostri Herniam gutturis, & eo affectos, gutturosos vocant. Est autem colli tumor grandis, & rotundus inter cutem & asperam arteriam, in quo modò caro hebes, modò humor aliquis, melli, adipi, pultri, aut aquæ similis, includitur. Huic similis affectus est, quem Guido vocat Natam, seu Napram, quæ est excrecentia magna, carnosâ, veluti caro Natium, vel anchorum, diversarum quidem formarum & magnitudinum, cujusmodi sunt Melopepon & Cucurbita.

Talus, non idem est ac malleolus, sed dicitur os sub malleolis contentum, unde quæq; contextum, quod ne tangere quidem possit. lib. de osib. cap. 22.

Y 5

Taraxis (seu Conturbatio) est, cum oculus, leviter ac mediocriter commotus, rubicundior evadit, ac obscure videt. lib. Introd. cap. 15. Paulus definit, esse humiditatem & caliditatem oculi cum rubore præter naturam, à causa externa inductam; ut Sole, fumo, pulvere, oleo. Differt ergo ab Ophthalmia, quæ causam tantum internam agnoscit. Paul. lib. 3. cap. 22.

Tardus pulsus est, cum longo tempore arteria distenditur. 1. de diff. puls. cap. 7.

Tarson. Vide Pedion.

Tarsus oculi, est substantia quedam membranæ, durior, ac tensa, quâ parte Periostris sive conjunctiva oculi tunica remeare ad corneam incipit, tenuibus pertusa foraminibus, ex quibus palpebrarum pili emicant propter suam duritiem, palpebram in rectitudinem extendens. 10. de usu part. Vide Cilia.

Taurus, dicitur quoque inter cetera, inferior Coli pars, in longitudinem ejus usque, ad sedem porrecta. lib. Introd. cap. 10.

Tela aranea. Vide Rhagois.

Telephia, & **Chironia**, ulcera dicuntur inveterata, & quæ vix curam recipiunt, cicatricemque, difficilime contrahunt: sic dicta, quod Chirone, Medicina peritissimo, ad sanationem indigeant. Vide Chironia.

Telma, est solidum, & tensum, durum, ac pilis etiam nudum pedis vestigium. lib. de musc. diss. cap. 33.

Temperies, (Græci νεῖκος) miscibilium est concentus & harmonia s. vel c. s. h. selementi mixtio, ad mixti actiones obeundas necessaria. lib. 1. de temper. c. 2. 3.

Tempora, νεῖκος, appellantur partes, ab utroque, syn-
cipitis latere supra aures sita. lib. Introd. cap. 10.

Tem-

Tempora morborum, tale quid sunt in morbis, quale quid in animalibus sunt differentia secundum ætates; neque enim tempus simpliciter hoc vocabulo significatur; neque conveniens illud tempus, in quo præsidia etiam usurpari debent: sed tantum morborum ætas, quæ temporum vicissitudine immutatur; ut animal ætatibus. lib. de morb. temp. cap. 1.

Temporales futurae. Vide Lepidoides.

Temporales musculi. Vide Croraphitæ, & Mandibularii.

Tendones, fines sunt musculorum, pronervationes, seu aponeurotas vocant Anatomici, qui mediis partibus sunt nervosiores; inter se tamen in eo differunt, quod aliquando minus vel carnosæ, vel nervosæ substantiæ in se habent: quando carnis substantia inest amplior, carnosam pronervationem; quando parcius, nervosam appellant. 2. de artic. 5.

Tenesinus, est continua & implacabilis desidendi cupiditas, quâ tamen nihil, præter cruenta pauca & mucosa, egeritur; quare præsens affectio etiam Tentio, & Tensio appellatur, quoniam in ea fit in recto intestino tentio, cum dejicere vehementer homines expetentes, continuo exurgunt. 7. aph. 27. & lib. finit. med.

Tenor, apud Hippocratem est idem quod nervus intentus. 1. de placit. 9. & 1. de artic. 47.

Tensio. Vide Tenesmus.

Tensivus dolor est, qui tensionis sensum inducit agris particulis. 3. de loc. affect. 9. Unde tensiva lassitudo, quæ & phlegmonosa est. 7. de comp. med. loc. cap. 1. Vide Dolor tristis.

Tentigo. Vide Priapismus.

Tenue

Tenuē intestinum, (aliā Ileon, & Involucrum) est tertium in ordine, jejuno intestino substantiā simile: differt autem, quod neq. vacuum reperiatur, neq. tot vas-
is & involutis scatet. 6. de anat. adm. cap. 9. & lib. de anat. viv.

Tenuia appellantur medicamenta, quae facile in te-
nues comminui partes possunt, Leptomeri Gracis: Craf-
sa, quae contrā, Parimeri appellata. 1. simpl. 3.

Tenuis pulsus. Vide Gracilis.

Terebella. Vide Abaptista.

Teredo, Teredon, sive Terdo, est caries in osse.
3. meth. 1.

Teretes, lumbrici sunt, palmi longitudine, vel etiam
majore, ad stomachū usq. proserpentes vermes. lib. Introd.
cap. 13.

Tergum, Noton Gracē, sunt posteriores corporis par-
tes, quae collo subjacent, E. G. scapula, dorsum, spina, &
lumbi. lib. Introd. cap. 10.

Terra Argyrite. Vide Argyrite terra.

Terra medicaminosa, quod aquā irrigatā, faciliē in
lutum solvitur, appellatur: quia verō eā utimur velut aliis
medicamentis, idcirco non injuriā Pharnatitidis, i. e. me-
dicaminosa vocatur; nempe, quia sola est ejusmodi, ut
evidentiorē vim medicaminosā possideat. 9. simplic.

Terrae intestina, γαστέριον Gracis, sunt Lumbrici ter-
restres. 11. simplic.

Tertiana simpliciter, est Tertiana intermittens:
contingit enim, hanc ipsam, sine aliqua adjectione, Tertia-
nam simpliciter nominari; quemadmodum & Quotidia-
na intermittens, Quotidiana simpliciter appellatur. 2. de
diff. feb. cap. 7. Earum febrium intermittentium, quae certā
quoq.

quoq. die accessionem faciunt, quae quidem breve habent
accessionis tempus (quod duodecim horarum equinoctia-
lium spatio ad summum finitur, 2. de differ. febr. cap. 3.) ac-
cum rigore invadunt, & per sudores, & bilis vomitum, &
biliosa excrementa finiuntur, his Tertianae exquisitae no-
men impositum est; quibus verō aliquid horum deficit, ha-
non exquisitae, sed simpliciter Tertianae appellantur:
quod si intermissionem minorem habuerint, accessione vi-
delicet in longius tempus protractā, ha Tertianae ex-
tentivae vocantur. 2. de differ. febr. cap. 8. Exquisita verō
Tertiana est, quae sui ipsius naturam puram & sinceram
servat, i. e. flavam bilem redundantem, & motam, tempus
aestivum, locum calidum & siccum, hominis aetatem, &
temperiem similem. 4. aph. 59.

Tertianus circuitus. Vide Quotidianus.

Testes, testiculi, ὀρχαῖ, sunt corpora duo glandulosa,
alba, mollia, rara, laxa, cavernosa, rotunda, seminis & ge-
nerationis principium, Gracis, quod duo sint, Abdomen ap-
pellantur, quos ipsos Gal. 3. de aliment. facit. glandibus
annumeravit: in maribus extra abdomen sunt, & pro-
pendent musculis, quos aquagregas vocant, suffulti; mu-
lieribus intus latent à lateribus ureri, frigidiore, mino-
res, & imperfectiores longē quā marium. 14. de usu
part. cap. 10.

Testudo. Vide Camarion, Fornices, Talpa.

Tenatos, rigor, distentio nervorum, est convulsio
perpetua totius corporis rigidi, & in neutram partem se in-
clinare queuntis, contractis ad suum principium nervis &
musculis, quibus caput annuit, renuit, circumagitur, aequa-
liter videlicet in antē & retrō tensis. Gal. lib. de muscul. diff.
Vide Distentio.

Terra-

Tetrapharmacum medicamentum est, quod ex cera, adipe, resina, pice, aqua omnium portione constat. lib. adversus Lycum, cap. 7.

Thele, papilla, mamma capitulum est, unde infans lac sugit, medium in mamma protuberans, quam ambit circulus quidam subniger, qui oas appellatur.

Thenara, proprie vocant prominentes vola manus partes, a verbo *deinuo*, quod est verberare, ut nonnulli volunt; quippe cum his prominentibus partibus percutere soleamus ea, quae percutimus; alii non omnes partes prominentes palmas, sed solas eas, quae sub pollicibus extant, sic appellant. 1. de fract. 20.

Therapeutice, i. e. Medendi methodus: 7. de compos. med. per gen. cap. 1. quae & Curatoria dicitur.

Theriacam appellantur Crito, & eum sequuti, quod vipera carnes acciperet; Andromachus vero, qui primus illam composuit, Galenem, h. e. tranquillam. lib. de usu Theriac. ad Pamph. prope finem.

Therisma, terribilissimum ulcus est, tum ex se nascent, tum alteri superveniens, ut refert Celsus, colore lividum, nigrum, odore foetum, multo mucoso humore repletum; quod inflammatio, febris, prurigo & dolor comitantur, a quo sanguis interdum fluit, serpit id ipsum & exedit partes finitimas; ac ob id aliqui Herpetem exedentem vocant; alii dicunt idem esse cum Carcinomate, quod Gal. com. 2. in 6. Epid. dicit in solo pulmone generari; alii in quacunque corporis parte carnosam provenire id ipsum statuunt.

Thermantica, calefactoria medicamenta sunt, quae suo calore, omnem partem calefaciunt. lib. de Dynamid. in proem.

Ther-

Therminthi nomen, nigras quasdam pustulas, in cruribus maxime orientes, significat; a figura coloris, magnitudinisque similitudine, quam cum Therminthorum, i. e. cinerum fructu habent, derivatum. com. 3. in 6. de morb. vulg. 37.

Thlasma, aut Thlasis. Vide Rhegma, & Unionis solutio.

Thlypsis. Vide Epiparoxineste.

Thoracem, consueverunt appellare Veteres totum illud spatium, quod duodecim costis, utrinque circumscribitur; pertinet anteriore quidem parte ad pectorale os, ac seprum transversum; declinat vero posteriore ad spinam, duodecim vertebrae circumscriptum. lib. de ossib. c. 13. & 6. de usu part. cap. 2.

Thorexin, nominare consuevit Hippocrates vini portionem. 2. aph. 21.

Thrombos, sanguinis grumus est, aut sanguis concretus. 5. meth. 8.

Thrombosis, affectus est, in quo lac grumescit in mammis, & in casei formam transit; Grumescentiam lactis Interpretes nonnulli vocant.

Thymiama, Larinis suffumigium, ex moderate adstringentibus, resiccantibus, ac disculantibus viscosos & serosos humores, & corrigentibus humorum malitiam, & iis, quae contraria vi pollent adversus putrefactiones, cujusmodi sunt aromata, constat. 8. de comp. med. loc. cap. 7.

Thymus, aspera carnis extuberatio est, circa genitalia, ac sedem oriri solita. lib. finit. med. & 14. meth. 3. Est & tumor praeter naturam. Vide Epulides. Est & Thymus idem quod Glandium, seu Aden, seu Glandula. Vide Aden, Glandula. Vel, ut alii, Thymos carnosus est excre-

crescentia, nunc in glande, nunc in præputio, nunc in ipsa sede consistens: sic dictus, quod Corymbis Thymi sit similis. Thymorum autem alii mites, alii maligni. Mites, sunt exigui, scabri, candidi, dolore carentes; feri autem, ampliores, scabiores, lividi, dolorifici.

Thyreoides cartilago. Vide Scutiformis, & Crioides.

Thyroides, est os pubis foramen, ab ostii similitudine sic appellatum. 3. de anat. adm. cap. 13.

Tibia, est tota cruris pars, intervalum & genu, in interiori parte sita; cuius tibia pars anterior, tenuis, & carnis experta, Ocrea appellatur. lib. de osib. cap. 22. Eademq; infra genu, Anticnemion, (Latini Ocrea:) 2. de anat. adm. cap. 4. Posterior carnosissima pars, Sura, & Gastrocnemion dicitur. 16. de usu part. cap. 8.

Tilmata, sunt divisiones, facta in fibris musculorum, dum scilicet illa nimis distenta, interdum rumpuntur. 4. de iis, quæ in medic.

Titillatio oculorum. Vide Mollities.

Toma, pro Phlebotomia usurpatum legimus, lib. 2. de nat. hum. cap. 9.

Tomi, dentes, aliàs Incisorii, dicuntur quatuor primi anteriores, ad cultri similitudinem, ad eos cibos incidendos, qui molliem in se habent; sicuti ad dura confringenda, alii utrinq; proximi constituuntur. Cæteri ferè omnes dentes, molares, sive maxillares, Græci Mylvi, & Molæ appellantur. lib. de osib. c. 4. & 11. de usu part. cap. 8.

Tonica, sive Tonorica medicamenta sunt, quæ extrinsecus illiniuntur partibus nervosis, ad robur hisce conciliandum. 13. meth. 22.

Toni-

Tonicus motus, est inprimis in Terano, duabus contrariis virtutibus, oppositorum musculorum, inter se quasi pugnantibus. 1. de motu musc. cap. 8.

Tonos, nervus, nuncupatur ab ipsis operationibus: uti enim Nervus ἀπό τῆ νόσεως, i. e. à flectendo; ita Tonos ἀπό τῆ τέσεως, i. e. à tendendo deductum est. 1. de motu musc. cap. 1. Vide Nervus.

Tonillæ. Vide Isthmus, Uvæ, Paristhmia.

Tophus. Vide Callus.

Topica remedia, i. e. localia, 13. meth. 22. quæ loco affecto non prius applicari debent, quàm totum prius corpus purgatum sit; ne huic irritato affectu, affluxus ad membrum læsum viriosi succi promoveatur. lib. de remed. par. fac. cap. 6.

Torcular, sive Linon, est locus quidam vacuus, quasi cisterna in vertice capitis, in quem meningis duplicationes sanguinem redundantem deducunt, undè rursum velut ab arce quædam, omnibus subjectis partibus, sanguinis rivus mittuntur. 9. de usu part. cap. 6. & 9. de anat. adm. cap. 1.

Tormina, Dysenteria, propriè non pro ulceratione intestinorum, ut pleriq; Medici solent, sed pro cruenta ex intestinis proluvie sumit Hippocrates: ut etiam, quando ex Jecoris imbecillitate cruenta deiciuntur, affectio talis quoq; Torminum nomine appellatur: id quod & feri, & dici à Medicis quoq; videtur. 4. de art. 4. Fiunt autem tormina, & propter morsum vehementem, & propter spiritum flatuosum, qui non habet exitum, sed in intestinorū involucris est interceptus & p. n. detentus. 4. apb. 11. Vide Dysenteria.

Torpor, est motus & sensus difficultas, diminutio in toto corpore, & maxime in artubus à frigore, & compres-

sione nervosorum corporum, concitata. 1. de caus. sympt. c. 5. Aliquando Torpor significat, ventriculi in concoquendis cibis imbecillitatem. com. 3. in 6. de morb. vulg. 1.

Tortio est, cum articulus quidem est illæsus, sed nervosa circa ipsum partes tortæ & p. n. contractæ sunt: id quod maxime in iis contingit, quorum in vacuum gressus dilabitur. 3. de iis, quæ in med. 31.

Toxica, h. e. venena, quæ mortem inferunt. lib. de Dynamid.

Trachea, sunt medicamenta aspera, quæ suffocata loca ulcerant, & exasperant. lib. de Dynamid. in proem.

Trachea arteria. Vide Aspera arteria.

Trachoma, altera est species scabiei palpebrarum, dolore, & gravitatem in oculis, humiditatemq; nimiam ingenerans. lib. de ocul. par. 4. cap. 9. Inde Trachomatæ appellantur, quæ hanc asperitatem detergunt. 14. meth. 19. Hinc quoq; τραχύς, alperitas, dicta est vitiosa conformatio, parti, cui accidit, inæqualitatem inducens; opposita affectio lævitati: quæ sunt duo prima morborum genera in formatione sita.

Transductio, est diducti ossis in naturalem statum reductio. lib. finit. med.

Tragemata, sunt ea, quæ post cœnam, voluptatis inter bibendum excitanda gratiâ, assumuntur. 1. de alim. fac. 34.

Transpiratio, seu Perspiratio, est insensibilis per poros diffusus excrementorum fuliginosorum. 1. de sanit. tuend. cap. 12. Vide Inspiratio.

Translativus motus. Vide Metalepticus,

Transumptivus motus, sive Metalepticus, est, quo per machinas utuntur plurimi, cum Archirecti, tum Medici, qualem motum Natura musculis conciliavit, quoniam
nervo-

nervorum principio existens, Cerebrum & ratio, ibidem radicata, per nervos, tanquam habenas, musculos laryngis & g. intendit; sic etiam nervus, qui à cerebro proficiscitur, à superiori loco per totum collum fertur deorsum, ad multam usq; thoracis partem, indeq; rursus redit usq; ad laryngem, ubi nervus in laryngis musculos insertus, quasi à manibus quibusdam, singuli musculi deorsum trahuntur. 7. de usu part. 14.

Traulotes, Latinis Blæfitas: quâ passione correpti, τραυλολο Græcis, Blæsi verò Latinis dicuntur, qui certas alphabeti literas exprimere nequeunt.

Tremor. Vide Palpitatio.

Tremor oculorum. Vide Mollities.

Trichiasis, i. e. capillitium, morbus est, in quo cum crassâ urina, veluti capilli unâ exeunt. 4. aph. 76. Ad hæc, Trichiasis est affectio, in qua pili inutiles & pungentes palpebris innascuntur. 4. de comp. med. loc. cap. 8.

Triens, h. e. uncia quatuor. 4. de compos. med. loc. c. 14.

Triglochina, sive Trisulca figura est, qualis & g. inest quinq; membranis Cordis, tribus in dexterâ parte, duabus in sinistrâ consistentibus. similis figura triangulari, & telorum cuspidibus. 7. de anat. adm. cap. 9.

Trigona medicamenta, sunt ex seminibus composita, quæ sicut ad torporem inducendum miriora, ita in futurum minis sunt tuta: quibus omnibus utilis anodyna (ωδωδύου) sumuntur. 12. meth. 1.

Trismos, sive Trysmos, Latinis Stridor, est convulsio musculorum mandibularium, ex qua fit dentium invicem concussio. 2. de caus. sympt. cap. 2.

Trisulca. Vide Triglochina.

Tritæophyes (quæ & Tritæus) febris, est Tertia

na naturam sapiens, quæ tertio die exasperatur, & ferme in integritatem remittit; sed si quæ febris tertio quoque die exacerbatur, neque, per minimum intervallum ita mitescat, ut in eo febricitans propè sinceram in febricitatem assequi videatur, hanc si quis triæophyes nominare velit, forsan & ipse non sine ratione loquetur. comm. 2. in 6. de morb. vulg. 23.

Tritæus. Vide **Tritæophyes**.

Trivus, (Græcè τριβῶ) apud Hippocratem significat eam corporis partem, cui sive stantes sive ambulantes sive sedentes, sive jacentes, immitimur; ut stantibus nobis atque ambulantes, planta pedum; nates sedentibus; spina supinis; cubito immitentibus, cubitus. 2. de his, quæ in medic.

Trochantera, Latinis **Tuberculum**, magni ossis femoris processum in specie sic vocant. 2. de anat. adm. cap. 6. & lib. de ossib. cap. 21. Vide **Femur**.

Trochlea brachii. Vide **Bathmides**.

Trochiscos. Vide **Pastillos**.

Tromata, Latinis **ictus**, nominat Hippocrates magnas noxas, ab aliquo extrinseco, etiam sine vulnere illatas. com. 5. in 6. de morb. vulg. 12.

Tromos, i. e. tremor. 2. meth. 2.

Trypsin. Vide **Anatrypsin**.

Trylmos. Vide **Trifmos**.

Tubercula, sunt quadam spontè nascentes, & celerrimè factæ inflammationes, quæ celerrimè in altum attolluntur acumen, & celerrimè suppurantur, & plurima horum in inguinibus & alus est generatio, quoniam in his partibus plena sunt adenes, qui apti naturâ sunt ad universi corporis superfuitates promptè excipiedas. 3. aph. 26.

Tuberculum insuper **Phyma** nominat Hippocrates, quod

quod in aliis ipse solitus est vocare suppurationem, Græcè **Empyema**. 7. aph. 8. & lib. de tumor. cap. 15.

Tumor. Vide **Oncos**.

Tunicarum nomine, quidam sola composita operimenta designant; alii autem crassa; alii composita simul & crassa. Ad eundem autem modum & de membranis litigant: quibusdam enim simplicitas sufficit; aliis autem tenuitas; alii ambobus opus esse arbitrantur, ut ita nominentur, quasi tenuia fuerint simul, & simplicia operimenta. At antiqui cerè, tunicas, membranas, meningas, præter hæc omnia alia operimenta sic vocant; quos nos quoque sequentes, à vana quidem in nominibus garrulitate discemus. 4. de usu part. cap. 9.

Tunicæ cordis, sunt corpora regentia extrinsecus utrumque cordis ventriculum. 6. de usu part. cap. 8.

Turgere, verbum est translaturum ab animalibus concubitum appetentibus, ad humores: nam sicuti illa stare loco non possunt, quadam titillatione impulsæ, eoque affectu concitata motu feruntur turbulento; sic & humores plerumque in motu vehementiore, atque transfluxu à partibus ad partes, in morbi principio, moventes, titillantes, & quiescere non permittentes, cum & ipsi pariter moveantur, & transfluant, & perenni hac suâ latione egrum molestant, turgere dicuntur. Tales ergo humores turgentes dicuntur, qui sunt in motu, latione, & fluxu. 1. aph. 22.

Turgidus dolor est, qui à parte primariâ affectâ, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adjacentes transfertur. 2. de loc. aff. 7.

Turgidus pulsus. Vide **Gracilis**.

Tusis, est vehementissima quadam efflatio, quâ plurimus simul, celerrimèque, foras ætus spiritus, attrahit, pro-

pellitq̃, unà secum suo impetu, quæ vias suas obstruunt. 2. de sympt. caus. 4. Cum enim externus aer in asperas arterias trahatur, quæ cartilagineæ duræq̃, sunt, nec contrahi circa id, quod continent, possunt, concitatum hunc excogitavit spiritus exitum, quem vocant tulsim, quo spiritus sibi ipsi violenter & cum impetu delatus, vias expurget, non aliter, quàm tubos, & fistulas, expurgant harum opifices. 4. de caus. sympt. cap. 3.

Tulsis sicca, in qua nihil expuitur. 4. aph. 54.

Tylosis, i. e. callus: sic autem nuncupatur, cum in palpebris aspritudines ex senectute crassiores, albidiores, & parùm sensiles extiterint, eòq̃, minùs deleri possunt. lib. Entrod. cap. 15.

Tympanias, sive Tympanites, Hydropis est species, in quo spiritus flatùsve crassi, frigidi, totam thoracis superiorem & inferiorem regionem, tumentes facit. 4. acut. 111. Vide Ascites.

Tynismus, qui & Tinesmus, & Tenismus appellatur, est recti intestini vehemens tensio, & assidua deiectionis cupiditas, paucis admodum sequentibus excrementis, quæ quidem ab initio pituitosa & pingua, progressu verò temporis, etiam abrasionis specie deiciuntur, & his, quæ à supernis descendunt, haudquaquam misceri videntur. 6. de loc. aff. 2. Tinesmus (alibi dicit Gal.) ulcus est in recto intestino factum, quod quidem infert symptomata Dysenteria similia, nixus tamen multò vehementiores, quàm sunt dysentericorum. 3. de sympt. caus. 2.

Typhodes febres, i. e. succedentes, ut Causodes incendentes sunt, quarum mediæ est Semitertiana. 1. aph. 12. Vide Febris Typhodes.

Typhomania, (quam & Typhoniam vocant) est deli-

delirus Lethargus, vel lethargicum delirium. lib. finit. med. Typhoimia, appellatur commistus affectus ex Lethargo & Phrenitide. lib. de Comat. cap. 2. Ego verò, quoties ad finem usque cum desipientia, cum Coma persistunt, affectionem hanc ex Phrenitide, & Lethargo mistam appello, quidam Typhomaniam vocaverunt. 1. prorrh. 1.

Typus, est ordo intentionum & remissionum; Periodus sive circuitus, est tempus intentionum ac remissionum in morbis factum. lib. de Typis, c. 2. Sive, est formula quadam accessionis, cum vel subsequitur, vel anticipat. Desinitur quoq̃, quod sit reditus ab eodem, ad idem. 1. de eris. 3.

Tyria, apud Arabes, idem est ac Ophiasis: Tyri enim voce, omnes serpentes, & potissimum viperas intelligunt.

V

VACUATIO, Grecis νεκρωσις. Vide Purgatio. Vacuus pulsus est, qui arteria elevationem facit bullosam, ut digitorum impressioni egressus, per vacua occurrat. 1. de diff. puls. cap. 6.

Vaginalis tunica. Vide Elythroide.

Vaginæ. Vide Membrana dura.

Valga, appellantur crura, in exteriorem partem vergentia; quæ verò in interiorem, vara & manca. 3. de his, quæ in med. 31.

Vapor, humor est extenuatus, qui plurimus est in spiramentorum raritate, corporis mollitie, substantia fusione. 1. simpl. 8.

Varices, sive Cirrus, Antiqui venas omnes dilatatas appellabant. lib. de tumor. 16. Varices, sunt vena latiores in coxis, testiculis & cruribus, quæ ex crasso & melancholico

lico sanguine turgent, aded ut pellente natura, ad partes ignobiliores, humores crassos, & melancholicos, dictarum passionum generatio sequatur. 6. apb. 21.

Variciformis flexus. *Vide* Flexus variciformis.

Varicosum parastata. *Vide* Glandulosi assistentes.

Varicosus assitens. *Vide* Genitalis, Glandulosi assistentes, & Meatus genitalis.

Varicosus meatus. *Vide* Genitalis.

Varus, exiguus durusq; tumor est, in faciei cute obortus, Græcis Ionthos, differt à ficosis tumoribus in mento provenientes, non solum quod ex crasso humore consistat, verum etiam quod parripet renui quâdam sanie, cuius ratione facile ulceratur, non rectè nec ex arte curatus. lib. de remed. par. fac. cap. 11. *Vide* Ionthos, & Ficosus tumor.

Vasa deferentia. *Vide* Glandulosi assistentes.

Vasa spermatica, Seminaria, quæ vulgò preparantia appellantur. *Vide* Glandulosi assistentes. ●

Vehemens pulsus (sive Validus, & Fortis) est, qui violenter tactum impellit, & quasi ferit: Remissus sive Languidus, qui debiliter. lib. de puls. ad Tyron. cap. 3. & lib. 3. de diff. puls. cap. 5.

Vehementia morbi, est ea, quam magnitudinem vocant; & mos morbi, quem modum sive naturam morbi appellant. 1. de cris. 3.

Vellicationes, seu discriptiones, junioribus Medicis appellantur convulsionones, quæ in fibris musculorum contingunt, dum nimis intentæ, interdum rumpuntur. 3. de his, quæ in medic. 30.

Vena, φλέψ, est vas spermaticum, unâ constans tunicâ, fibris triplicibus contextum, sanguini deferendo destinatum.

tum. Venæ etiam nomine, arterias comprehenderunt Veteres: quo sensu Plato in Timæo, venas à Corde ortiri, asserit, ut testatur Gal. 6. de placit. *Vide* Arteria.

Vena arteriosa. *Vide* Arteria venosa.

Vena axillaris. *Vide* Axillaris vena.

Vena azygos, quasi conjugio carens, vulgò Vena sinè pari, ea est, quæ in quibusdam animantibus juxta Cor adnascitur; in quibusdam verò, ut in hominibus, ex ea emergit parte, quâ Cordis aurem dextram vena Cava tangit; hinc siquidem emergens, humiliter depressiusq; per Cor defertur, atq; in spinam contorquetur. 2. acut. 10.

Vena Basilica. *Vide* Axillaris.

Vena capillaris. *Vide* Apanthismos.

Vena capitis. *Vide* Humeraria.

Vena cava. *Vide* Cava vena.

Vena Cephalica. *Vide* Cephalica vena.

Vena communis. *Vide* Communis vena, & Media vena.

Vena conjugio carens. *Vide* Vena azygos.

Vena coronalis, sive Stephanianæ. *Vide* Vena Peristephanianæ.

Vena crassa. *Vide* Crassa vena.

Vena cubiti externa. *Vide* Humeraria.

Vena cubiti interna. *Vide* Axillaris.

Venæ emulgentes. *Vide* Emulgentes venæ.

Vena funis brachii. *Vide* Funis brachii.

Venæ guidez. *Vide* Apoplecticæ.

Venæ Hæmorrhoidales. *Vide* Hæmorrhagia.

Vena Hepatica. *Vide* Axillaris.

Vena Humeralis. *Vide* Humeraria.

Vena Jecoraria. *Vide* Cava vena.

Vena Ischiadica. *Vide* Ischiadica vena.

Venæ Jugulares. *Vide* Apoplethicae.

Vena lata & magna, ipsa dicitur humeralis vena. *1. de artic. 53.* Licet communiter Medici, & Anatomici Magnam vocent venam Porta, sicut Cavam, maximam appellant.

Vena manifesta. *Vide* Manifesta vena.

Vena media. *Vide* Communis.

Venæ mesaraicae. *Vide* Mesenterium.

Vena nigra. *Vide* Media Cubiti vena.

Vena Peristephaniæ (Latinis Coronaria) est, quæ Cor ipsum coronat, principiumq; sui ortus extra membranas habet. *6. de usu part. cap. 14.*

Vena Poplicis, est ramus medius venæ Cava, qui deorsum ad poplitem fertur, & per profundum Sura procedens, non modicam in musculos ejus ramorum sobolem spargit, atq; ob id hæc vena (quemadmodum etiam in manu) communis, seu media dicitur. *lib. de dissect. ven.*

Vena porta. *Vide* Cava vena.

Vena purpurea. *Vide* Communis vena, Media vena.

Vena salvatella. *Vide* Salvatella vena.

Vena saphena. *Vide* Saphena vena.

Vena sine pari. *Vide* Vena azygos.

Vena splenitica. *Vide* Salvatella vena.

Venæ, & arteriæ umbilicales sunt, quæ uteri ac tabulis adhaerescunt, quibus fœtus in utero alligatur, & per quas alimentum trahit. *1. de semin.*

Veneticos oculos appellant eos, qui suffusione affecti sunt; sunt autem Venetici oculi duobus modis; vel propter aquam, si nimium fuerit coagulata; vel propter sicci-

siccitatem, quam patitur crystallinus humor. *lib. de ocul. part. 4. cap. 12.*

Ventrem superiorem, Veteres appellant thoracem; alimenti autem receptaculum sive abdomen, omneq; id, quod à septo transverso est, ventrem inferiorem. Interdum autem ventrem inferiorem nominabant, in quem cibi assumuntur; & quæ ab eo sunt omnia, ventrem superiorem. Sic nominant etiam sola crassiora intestina. Deniq; sunt, qui Colon duntaxat, ventrem inferiorem vocant. *4. acut. 112. & 7. aph. 38.*

Ventriculus est, in quem primo animalia cibum pertrahunt. *6. de anat. adm. cap. 2.* Aliquando Ventriculi os superius pro stomacho sumitur. *lib. de cur. rat. per sang. cap. 1.*

Vermiculans pulsus est, cum nobis tangentibus, quasi perreptanti arteriam vermis, undarum in modum insurgentis, sensus exhibetur, idem ille parvus est, languidus, & creber; sin autem non parvitati, sed magnitudini sit adjunctus, dicitur Undosus; si ad extremam deveniat remissionem, crebritatem, & parvitatem, formicans dicitur. *lib. de puls. ad Tyron. cap. 8. & 1. de differ. puls. cap. 26. & 27.*

Vermiformis excrescentia, sive Epiphyfis. *Vide* Vermis Cerebri.

Vermis Cerebri, est obstaculum quoddam, quod habet pars ea, quæ à medio Cerebri ventriculo, ad posteriorem itur, cujus forma est sicut pinea. *lib. de ocul. part. 2. c. 2.* Quin particula quadam Cerebri incumbit meatui, qui est à Cerebro ad Cerebellum, quæ circumscriptionem obinet, figurâ vermi, in lignis enascenti, similem. Hinc etiam Anatomici excrescentiam & processum vermi-

for-

formem, corpus hoc, quod totum meatum contegit, vocant. 9. de anat. adm. 5. & 8. de usu part. cap. 14.

Vernaculus morbus. Vide Endemius, Epidemius, & Communis.

Verricularis. Vide Amphiblestroide.

Verrucosa. Vide Dulcia ulcera.

Vertex Capitis, (Γράς νωποῦ) in media capitis regione, synciput superante, est collocatus: undè velut à centro, circulus, capillorum proventus, incipere videtur. lib. Introduct. cap. 10.

Vertex, apex, aut mucro Cordis, est inferior visceris terminus, figurâ turbinatus, qui infernè pectoris ossi regioni cohaerescit, ubi etiam mucronata cartilago constituitur. 7. de anat. adm. cap. 3.

Vertebra. Vide Dorsum.

Vertigo, est affectio, quâ caput absq; externis causis in gyru circumagi videtur. 4. acut. 42. Vide Scotodinos.

Vesica fellis. Vide Cystis Choledochos.

Vestigium, vocatur inferior pars pedis. 2. de fract. 10.

Veternus, est gravis sopor, de caus. morb. cap. 3. sive ignavia & stoliditas cum somnolentiâ. 1. prorrh. 31. & 2. aph. 3. Dicitur autem Veternus, quasi veteranus morbus, qui Lethargus vocatur, in quo ægri veteranorum, i.e. senum more, inexpergiscibili somno derinentur. Terentius in Eunuch.

Vibratio, sive Agitatio, est violentus corporis motus, huiusq; partium motus, ut conquiescere non liceat, etiamsi strenuè admodum renitatur: differens à Tremore, qui, nisi partem movere velis, non accidit. lib. de trem. palp. c. 6.

Vibratus pulsus, (Γράς νωπόδης.) Vide Convulsivus.

Victum

Victum appello, non tantum qui cibo & potione constat, verum etiam qui omnibus aliis, ut ocio, exercitatione, balneo, Venere, somno, vigiliis, & omnibus, quæ quovis modo fiunt in humanis corporibus, ipsamq; adeo vivendi rationem. comm. 3. in 3. de morb. vulg. 9.

Villi. Vide Fibræ.

Vinaciæ, sunt solidae uvarum reliquiae, cum in torculari succus ipsarum omnis expressus fuerit. 2. de alim. fac. 9.

Vinum aparachyton, i.e. originale, cui marina aqua non est addita. 4. de comp. med. loc. cap. 7. Cui proinde opponitur Vinum rethalaßomenon. 4. acut. 2.

Vinum vinosum. Vide Hydatodes, & Oenodes.

Virtus naturalis. Vide Virtutes.

Virtus ratiocinatrix. Vide Virtutes.

Virtus vitalis. Vide Virtutes.

Virtutes, (Medici facultates, Plato vocat Animas) sunt tres illæ, quæ toti corpori, ex principiis, suo veluti fonte distributa, animal gubernant. Prima, naturalis, alatrix, appetitrix, alterans, & concoquens appellatur, 2. progn. 26. ad nutriendum animal necessaria, stirpibus communis, quæ fecur pro fonte habet; canales verò, ab hoc in totum corpus sparsos, obtinet ipsas venas. Altera, facultas seu anima vitalis, & animosa appellatur virtus, quæ non modo ut stirpibus, aut vitâ pradiis, sed etiam ut animalibus, Anima est insita, sedem habet in Corde, ejusdemq; canales arteria sunt. Postrema, Ratiocinatrix; in Cerebro domicilium habens, voluntariis actionibus, unâ cum sensibus præsidens, cujus canales sunt nervi, sensum motumq; in totum animal deferentes. 9. meth. 10.

Vitalis motus. Vide Motuum species.

Vitel-

Vitellina sive lutea bilis. Vide Bilis pallida.

Vitiliginum, quas Alphos vocant, generatio, similis est cum eo affectu, quem Leuce sive albam Vitiliginem, Arabes Alboras appellant, non tamen sub iis tota caro vitatur, ut in Leuce, sed in summo corpore, veluti squama quapiam, Vitilignes consistunt; alba quidem, ex pituitoso, nigra, ex melancholico succo exorta. 3. de sympt. caus. cap. 2. In Vitilagine autem alba, fit nutrimenti apostitio, non assimilatio. 1. de natur. fac. cap. 11.

Vitreus oculi humor. Vide Hyeloides, & Crystallinus.

Vitreus humor, à Praxagorâ appellatur vitrea Pituita, pituita species est frigidissima; quippe vitro fusso, tum colore, tum substantiâ, haud absimilis. 2. de loc. affect. 5.

Ulcerâ dulcia. Vide Ochthode, & Dulcia ulcera.

Ulceratio oculi, est ruptio circa corneam tunicam, vel ex ictu, vel ex phlegmone proveniens. lib. finit. med.

Ulcus, Græcis Elcos. Vide Unionis solutio.

Ulcus depascens. Vide Phagedænas.

Ulna. Vide Cubitus.

Ullomelia, i. e. solimembra, est totius corporis, ex membris compago. 1. de usu part. 8.

Umbilicus, nihil aliud est, quam multitudo magnorum vasorum, quæ ex multis parvis venis, & arteriis, & propagibus earundem per totum Chorion dispersis, conflata, eo loci unitur, per quæ ipsissima vasa, & sanguis, & spiritus ad fœtum derivatur, in medio urina culum habentium. lib. de dissect. vulv. cap. 10.

Uncia habet drachmas octo, quæ drachma etiam Holce dicuntur. Drachma habet siliquas duo-de-vigin-

ti;

ti; alii dicunt scrupulos tres. Scrupulus habet obolos duos. Obolus siliquas tres. lib. de pond. & mens. cap. 3.

Undosus pulsus. Vide Vermiculans.

Unguis, sive Ungula. Vide Pterygium.

Unio. Vide Prosthefis.

Unionis solutio, sive Continuitatis solutio, est morbus, in quo partes, quæ secundum naturam unitæ debebant esse, à sese invicem solvuntur, lib. de const. art. c. 6. quæ quidem unionis solutio, si in osse fiat, dicitur Fractura, seu Catagma; in nervosis musculorum partibus ex distensione, Ruptura; in fibris, Convulsio, seu Spasma; in carne ex vulnere, Incisio; ex aliquo acuto, Punctura, seu Punctio; ex aliquo gravi, Contusio; ex erosionem in osse, Tereodon; in carnosiss partibus, Ulcus; in instrumentalibus & ligamentis, Avulsio, sive Apophagma: Ibid. in vasis, musculisq; ex violento ictu, vel gravi casu, vel alio quopiam valente motu excitata, Rhegma & Thlasma; cum contusione & ruptione, Ecchymosis, 4. meth. 1. ab aliquo acuto occurrente, atq; abscedente, Incisio, Dissectio, & Sedes. lib. de caus. morb. cap. 11.

Universalis morbus. Vide Communis.

Univoca. Vide Æquivoca.

Vocis organa voco, per quæ spiritus redditus, vox efficitur; hæc sunt, aspera arteria, guttur, fauces, veluti spiritus plectrum, per ipsas transcurrentis; nam hæc vocis Instrumentum sunt, ut locutionis Lingua.

Volamânus, nominatur supina pars manûs, juxta pollicem assurgens, Græcè Thenar: cui pars opposita, Hypothenar, & Subvola vocatur. 1. de usu part. cap. 17.

Voluntarius motus. Vide Motuum species.

Vol-

Volvulus. Vide Ileos, & Chordapsus.

Volvulosa stomachi subversio. Vide Subversio.

Vomica. Vide Sinus, Fistula, &c.

Vomitus & Nausea, expultricis facultatis ventriculi depravati motus sunt, ad ea, quæ huius in cavitate continentur, noxia quàm citissimè per stomachum vacuanda. Neg, idem est vomituum & singultuentium motus; quippe in vomitionibus ea, quæ in capacitare sunt ventris, rejiciuntur; in singultu, quæ in ipsa ventriculi sunt substantiâ & fibrosis nexubus, simili scilicet tum affectu, tum motu, qualis est iis, qui ex intemperie tussunt, omnibus nimirum ventriculi partibus, quod sibi molestum est, expellentibus. 3. de sympr. caus. cap. 2.

Vrachichronius (βραχυχρόν) morbus est, qui brevi tempore finitur. **Polychronius** verò, qui longo tempore perdurat. 3. de dieb. decr. cap. 13.

Urachdōs, appellatur meatus, & Ligamentum, quod infantis Umbilico inferitur, ex quo etiam enascitur ille, & suspensus est, qui ipse meatus mutuo concursu quinq, vasorum umbilicalium absolvitur; nam à venis, quæ secundas implent, bina prodeunt venæ, ab arteriis ibidem sitis, itidem bina arteriæ, & à nervis unus nervus, qui complicati mutuo, Umbilicum absolvunt. lib. Introd. c. ii. Vide Umbilicus, & Urinaculum.

Uraniscus, i.e. parvum cælum, quod Latine palatum dicitur, pars est oris superior, à cæli similitudine sic dictum. lib. finit. med.

Urentia. Vide Caustica.

Ureteres, (pori Urinarii) sunt meatus oblongi & fortes, qui renes vesicæ committunt, & ducunt per colatoria, urinas à sanguine segregatas, ad vesicam. 5. de usu part. c. 5.

Qui

Qui Urinarii meatus nec arteriæ sunt; cum nec pulsant, nec duplici consent tunicâ; neg, venæ, quia sanguinem in se nullum continent, nec similem omnino venæ habent tunicam; à nervis autem plus distant, quàm à jam dictis. 1. de nat. fac. cap. 6.

Urethra, sive Urithra, est meatus penis, urina reddenda accommodatus, quem & fistulam urinariam appellant: 4. aph. 82. oritur à cervice vesicæ. 1. de loc. aff. c. i. Vide Fistula urinaria.

Uretica. Vide Diuretica.

Urina, quam Græci ὕδωρ vocant, est excrementum tenue & aquosum sanguinis. 5. de usu part. cap. 5. Vide Lotium.

Urina optima, cuius sedimen album, & leve, & aquale exitit omni tempore, usq, dum judicatus fuerit morbus. lib. de atrâ bil. cap. 8.

Urinaculum, (quod Græci ὑρακίον, alii ὑρακίον vocant) est & dicitur illud, quod ex venis duabus toridemq, arteriis, & uno nervo simul in χεῖρ sive muliebribus locis quandam quasi caudam conficit: hoc meatu, qui à supremâ fœtus vesicæ fundi regione, per umbilicum in cavitatem pertinet, quæ inter secundum & tertium consistit involutum, lotium in alantoidea tunicam derivatur. Hunc solers Natura excogitavit atq, fabrefecit, ut fœtus urinam, longius à corpore summo veret ipsius, & ne per vesicæ cervice urinam reddita, admotaq, tenera cuti, ipsam suâ exulceraret acrimoniâ. Apud Hippocratem lib. vii. c. 1. nascipias, ita legitur: Οὐδὲ τὰς nascipias νέμισαι τὴν ἰσχυρίαν, ἀλλ' ἐκματᾶν τὸν ὑρακίον καὶ στεγνόν ἔστω. ubi pro mucrone cordis sumitur. Vel brevius: Urinaculum est meatus, qui ex fundo vesicæ exortus, lotium in tunicam Alan-

Aa

roidem in pregnantibus derivat: sic dictus à similitudine, quam habet cum intestinis. 15. de usu part. cap. 15. Vide Urachòs; & Umbilicus.

Urinarii. Vide Ureteres.

Urinarius meatus, Græcè ὑραχὸς, ὑρῆθρα. Vide Ureteres.

Urinæ difficultas & suppressio. Vide Ischuria.

Urinæ profluvium. Vide Diabetes.

Urinæ stillicidium. Vide Ischuria. 3. aph. 16.

Urinæ substantia. Vide Consistentia.

Uron. Vide Urina.

Uteraria. Vide Hysterica.

Uteri suffocatio, est respirationis ob uterum p. n. affectum ablatio: Apnoea etiam vocatur: item Uterina suffocatio, & strangulatio: 5. aph. 35. denig, Hystericus morbus. 4. de caus. puls. cap. 22.

Uteri Rheuma. Vide Menfes.

Uterus, ὕστερ, Vulva, & Matrix, est ea corporis pars, quæ mulieribus ad concipiendum & pariendum, à Natura est concessa. 6. de loc. aff. cap. 5.

Utricularii. Vide Hyderici, & Ascites.

Uva. Vide Gargareon, & Staphyle.

Uvæ, Paristhmia, & Tonsillæ, nihil aliud sunt, quam inflammationes; Uvæ quidem, Gargareonis; Tonsillæ vero, adenum eorum, qui in principio faucium, inter se oppositi sunt; quemadmodum Paristhmia, corporum eorum, quæ in faucibus sunt. Videtur autem Hippocrates non omnem Gargareonis inflammationem, Uvam nominare, sed eam solam, quæ Gargareonis figura similis acino uvæ est. lib. de tumorib. cap. 17. Vide Staphylè, & Gargareon.

Uvæ

Uvæ vinosæ, quæ nullam vehementem qualitatem habent. 2. de aliment. fac. cap. 9.

Ulvea oculi tunica. Vide Rhagois, & Cœrulea.

Uviformis. Vide Rhagois, & Cœrulea.

Vulgaris morbus. Vide Communis morbus.

Vullio (aut potius Divullio) est, cum fibra musculorum nimis distent & rumpuntur. Aliàs Discerptio appellatur. 3. de iis, quæ in med. 30.

Vulva. Vide Hyftera, & Uterus.

Uvula. Vide Staphyle.

X

XEROPHTHALMIA (i.e. arida lippitudo) est & dicitur, cum angulorū, qui in oculis sunt, ulcera & asperitudinem, & pruritum contraxerunt, palpebrae insuper rubent, & lacryma salsa & nitrosa ab oculis profluit. lib. Introd. cap. 15. Vide Sclerophthalmia.

Xerotribia, i.e. sicca frictio. 8. meth. 2.

Xiphoides. Vide Pectorale os, & Cartilago ensiformis.

Xyster. Vide Aures.

Z

ZOOGOMIA, i.e. animalium perfectorum univoca generatio. lib. de constit. art. cap. 13.

Zulapium, Actuarius, & alii recentiores Græci barbarâ voce appellant id, quod Officina iridem barbaro vocabulo Julepum nuncupant: fit ex stillatitio liquore, aut etiam ex succis cum saccharo decoctis, ad justam consistentiam, ut ex Mesue constat.

Zygoma os (sive Jugale os) est, quod temporis musculo præpositum, transversam in medio suturam habet, cujus posterior pars cum capitis osse, quod juxta aures est,

Aa 2

372 LEXIC. MED.

anterior cum parte supercilii extrema, ad parvum oculi
angulum, continuatur, lib. de osib. cap. 2. quod duplex
est, ad utramq; aurem, super foramina, per qua facultas
audiendi est, emergit. lib. Introd. cap. 11. Vulgo Os

paris vocant: alii Jugamentum: Græcis

σύνωμον, sive *συνωμόδες*, quasi con-

jugale, & ex duobus con-

jugatum, voca-

tur.

F I N I S.

Pag. 344. lin. 16. legatur: & faucium: quam
muscula, debiles &c. Pag. 349. lin. 21. propendens:
musculis, quos &c. Reliqua, levia forsan, errata.
Lector benevolus ipse corrigere non gravabitur.



